

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

1. Der Erndteausfall im Jahre 1874

[urn:nbn:de:bsz:31-220718](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220718)

Statistische Mittheilungen

über das Großherzogthum Baden.

Band II.

Nr. 1.

1875.

Inhalt: 1. Der Erndteausfall im Jahr 1874. — 2. Getreidepreise in den Jahren 1866 bis 1874.

1. Der Erndteausfall im Jahre 1874.

Die November-Berichte der Großh. Bezirksämter bestätigen die im Allgemeinen gemachte Wahrnehmung, daß die Erndte des Jahres 1874 im Großherzogthum Baden im Ganzen eine günstige gewesen ist. Die nachfolgenden Tabellen, welche auf jenen Berichten beruhen, bringen dieses Ergebnis im Näheren zur Anschauung. Dieselben schließen sich den in Nr. 21 dieser Mittheilungen für das Jahr 1873 veröffentlichten Darstellungen an. Wie üblich ist auch hier mit den Ziffern 1 bis 9 der Erndteausfall nach neun Stufen (sehr gut 1, gut 2, ziemlich gut 3, wenig über Durchschnitt 4, Durchschnitt 5, wenig unter Durchschnitt 6, ziemlich schlecht 7, schlecht 8, sehr schlecht 9) bezeichnet. Gegen die Darstellung in Nr. 21 ist der Tabelle III die Angabe des Erndteausfalls in den Kreisen eingefügt und sind durchgängig die Durchschnittsberechnungen nicht nach dem arithmetischen Mittel der Bezirksangaben, sondern unter Berücksichtigung der Bedeutung des Anbaues in den einzelnen Bezirken, Kreisen und geographischen Gruppen erfolgt. Durch letzteren Umstand erklärt sich, daß in Tabelle III der Landesdurchschnitt für 1874 nicht mit dem arithmetischen Mittel aus den Ziffern der Kreise oder Gruppen übereinstimmt.

Die nachstehende Uebersicht

Erndteausfall.	Fruchtarten.
Sehr gut (1 — 1,5).	—
gut (1,5 — 2,5).	Weizen, Speltz, Gerste, Mißfrucht, Kartoffeln, Runkelrüben, Wein nach Güte. — Getreide, Stroh, Gesamtterndte.
ziemlich gut (2,5 — 3,5).	Roggen, Hafer, Sparsette, Stoppelrüben, Hanf, Tabak, Hopfen, Cichorien, Zuckerrüben. — Futterbackfrüchte, Handelsgewächse, Wein.
wenig über Durchschnitt (3,5 — 4,5).	Klee, Luzerne, Wohn, Heu, Lehm, Wein nach Menge, Zwetschgen, Pfäumen, Kastanien. — Futter.
Durchschnitt (4,5 — 5,5).	Reps, Kraut, Kirichen, Kepsel. — Obst.
wenig unter Durchschnitt (5,5 — 6,5).	Flachs, Birnen.
ziemlich schlecht (6,5 — 7,5).	Rüße.
schlecht (7,5 — 8,5).	—
sehr schlecht (8,5 — 9).	—

sowie die Tabellen zeigen, daß nur sehr wenige ins Gewicht fallende Fruchtarten einen geringen, von den wichtigeren Kulturgruppen nur Obst und Futter (Wiesen- und Ackerfutterkräuter) einen mittelmäßigen, die übrigen wichtigeren Früchte und Kulturgruppen einen ziemlichen oder ganz guten Ertrag geliefert haben. Dieses günstige Ergebnis ist dem Umstande zuzuschreiben, daß das landwirtschaftliche Jahr 1873/74 ohne erhebliche allgemeine Anomalien von schädlichem Einfluß auf die Vegetations- und Erndteverhältnisse verlaufen ist und der Sommer 1874 im Ganzen eine hohe Temperatur gehabt hat. Nachtheilig haben vielfach allerdings Spätfröste und Dürre im Vorfrömmern gewirkt, jedoch nicht in solchem Grade und Umfange, daß die meisten Fruchtarten darunter besonders gelitten oder sich nicht von dem Schaden erholt hätten. Bemerklich macht sich

Tabelle I. Der Grundteanzfall in den Amtsbezirken 1874.

Amtsbezirke	Getreide	Kartoffeln	Futter	Gesamternde	Amtsbezirke	Getreide	Kartoffeln	Futter	Gesamternde
Constanz	3	2	6	4,5	Achern	2	5	2	1,5
Engen	4	6	7	6	Baden	2	2	4	2
Messkirch	2	2	3	3	Bühl	2	2,5	3	2
Pfullendorf	2	2	6	2	Rastatt	1	1	4	1
Stodach	2	2	3	2	Kreis Baden	1,6	2,0	3,2	1,5
Ueberlingen	3	5	7	6	Bretten	2	1	2	2
Kreis Constanz	2,8	3,5	5,5	4,3	Bruchsal	2	2	6	2
Donauschingen	1	2	5	2	Carlsruhe	2	2	3	2
Friberg	1	2	6	2	Durlach	2	2	7	3
Willingen	1	2	1,5	2	Ettlingen	2	1	5	2
Kreis Willingen	1,0	2,0	4,0	2,0	Pforzheim	2	2	5	3
Bonndorf	2	2	3	2	Kreis Carlsruhe	2,0	1,7	4,3	2,3
Säckingen	2	1	5	2	Mannheim	2	1	6	3
St. Blasien	2	2	2	2	Schwezingen	2	2	6	2
Waldbshut	2	2	4	2	Weinheim	2	2	5	2
Kreis Waldbshut	2,0	1,9	3,7	2,0	Kreis Mannheim	2,0	1,7	5,7	2,3
Lörrach	2	3	5	3	Eppingen	2	1	2	2
Müllheim	1,5	1,5	7	2	Heidelberg	2	2	6	3
Schönau	3	3	7	3	Sinsheim	2	1	2	2
Schopfheim	2	2	5	3	Wiesloch	2	2	3	2
Kreis Lörrach	1,9	2,3	5,6	2,6	Kreis Heidelberg	2,0	1,5	3,3	2,3
Breisach	2	2	5	3	Abelsheim	1	4	2	2
Emmendingen	2	2,5	3	2	Buchen	1	1,5	3	2
Ettenheim	2	2,5	3	3	Oberbach	1	1	2	2
Freiburg	2	1	2	2	Rosbach	2	2	2	2
Neustadt	5	3	6	6	Tauberbischofsheim	2	2	2	2
Staufen	2	2	7	3	Wertheim	2	5	2	2
Waldkirch	2	2,5	3	2	Kreis Rosbach	1,7	2,7	2,2	2,0
Kreis Freiburg	2,3	2,2	3,9	2,7	Großherzogthum	2,0	2,1	4,0	2,5
Kork	1	1,5	2	2	Korb	1	1,5	2	2
Lahr	1,5	2	6	15	Lahr	1,5	2	6	15
Oberkirch	1	1,5	2	1	Oberkirch	1	1,5	2	1
Offenburg	2	2	4	2	Offenburg	2	2	4	2
Wolschach	4	4	6	4	Wolschach	4	4	6	4
Kreis Offenburg	1,9	2,2	3,8	2,0					

Tabelle II. Der Erndteaustfall in den Landesgegenden 1874,
verglichen mit demjenigen der Vorjahre.

Landesgegenden nach geographischen Gruppen der Amtsbezirke	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	Durchschnitt	Amtsbezirke
I. See- und Donaugegend und Klettgau.												
Getreide	2,3	5,4	3,9	4,6	4,2	3,1	1,5	4,9	6,5	4,1	4,0	I. Ueberlingen, Bfulken- dorf, Weßkirch, Stedach, Gen- stanz, Engen, Bonndorf, Do- naueschingen, Bilingen. 9.
Kartoffeln	2,9	2,5	6,9	6,2	1,1	4,8	1,1	3,0	4,4	1,3	3,4	
Futter	4,8	2,2	2,0	3,5	5,3	2,5	3,7	2,2	3,1	4,5	3,4	
Gesamterndte	3,5	4,5	3,6	4,6	4,7	3,1	1,9	4,4	6,2	4,4	4,1	
II. Hoher Schwarzwald und Schwarzwaldthäler.												
Getreide	2,5	5,3	3,4	4,6	3,9	3,5	2,5	5,6	5,9	3,9	4,1	II. Baldehut, St. Blasien, Säckingen, Schönau, Schopf- heim, Neustadt, Triberg, Waldkirch, Wolfach, Ober- kirch. 10.
Kartoffeln	2,3	3,3	6,7	6,1	2,2	3,5	1,2	5,5	3,9	1,2	3,6	
Futter	4,5	2,7	2,3	3,4	4,3	3,5	3,8	2,1	3,4	6,2	3,6	
Gesamterndte	2,6	4,9	4,0	4,3	4,0	3,0	2,4	4,8	5,3	4,1	3,9	
III. Obere Rheinebene und gebirgige Thelle der betr. Bezirke.												
Getreide	1,8	6,3	3,3	4,2	3,2	3,5	2,0	7,0	6,5	3,2	4,1	III. Lörrach, Müllheim, Staufen, Breisach, Freiburg, Emmendingen, Eitzenheim, Lahr, Offenburg, Achern, Rort, Bühl. 12.
Kartoffeln	2,3	2,1	7,7	6,0	2,1	5,0	1,7	5,9	4,7	1,3	3,9	
Futter	3,9	2,1	1,8	2,2	5,8	2,4	5,3	1,7	2,9	7,8	3,6	
Gesamterndte	2,2	5,3	4,6	4,1	4,6	3,8	2,4	5,5	5,3	4,8	4,3	
IV. Untere Rheinebene und begleitendes Hügeland.												
Getreide	1,9	6,3	2,9	4,4	4,5	2,3	2,2	6,4	5,4	3,7	4,0	IV. Baden, Raftatt, Eit- lingen, Pforzheim, Carls- ruhe, Durlach, Bruchsal, Bretten, Eppingen, Wies- loch, Schwetzingen, Mann- heim, Weinheim. 13.
Kartoffeln	1,6	2,2	5,5	5,5	3,9	3,7	1,6	3,5	4,2	2,7	3,4	
Futter	4,3	2,6	2,2	2,4	6,2	2,7	3,5	1,9	2,3	6,4	3,5	
Gesamterndte	2,1	4,9	2,4	4,7	5,1	3,1	2,2	5,2	4,6	4,1	3,8	
V. Oberrhein, Neckar- und Tauber- gegend.												
Getreide	1,8	4,4	2,0	4,2	5,7	2,0	2,6	5,7	6,7	4,4	4,0	V. Heitelsberg, Oberbach, Sinsheim, Mosbach, Adels- heim, Buchen, Tauberbischofs- heim, Wertheim. 8.
Kartoffeln	2,1	3,7	5,1	6,8	3,6	2,9	1,6	4,6	7,4	1,7	4,0	
Futter	2,6	1,9	1,6	2,0	4,9	3,2	4,6	2,2	1,8	5,9	3,1	
Gesamterndte	2,1	4,0	2,3	4,2	5,5	2,4	2,5	5,3	6,0	4,5	3,9	
Großherzogthum.												
Getreide	2,0	5,8	3,0	4,4	4,3	2,9	2,2	5,9	6,1	3,8	4,0	
Kartoffeln	2,1	2,7	6,5	6,1	2,6	4,1	1,5	4,4	4,8	1,5	3,6	
Futter	4,0	2,3	2,0	2,6	5,4	2,8	4,2	2,0	2,7	6,4	3,4	
Gesamterndte	2,5	4,8	3,5	4,7	4,8	3,1	2,3	5,0	5,4	4,3	4,0	
Futterhadfrüchte	2,7	2,0	3,2	3,3	5,2	3,2	3,6	3,2	3,0	4,5	3,4	
Handelsgewächse	3,3	2,5	3,0	4,4	3,8	4,0	3,3	4,3	3,7	4,0	3,6	
Wein	3,5	6,0	6,4	6,1	4,6	4,8	1,8	5,1	4,4	3,8	4,7	
Obst	4,9	7,9	5,2	6,7	4,7	5,5	3,7	3,8	5,6	5,1	5,3	

Tabelle III. Der Ernteausfall nach den einzelnen

Fruchtar ten.	K r e i f e.															
	Konstanz		Biltingen		Waldshut		Lörrach		Freiburg		Offen- burg		Baden		Karlsruhe	
	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh
Weizen	2,1	2,3	1,3	1,0	1,0	1,2	1,6	1,7	1,5	2,7	1,7	1,6	1,3	1,3	2,0	1,8
Erbsen	2,9	1,8	1,4	1,0	1,7	1,7	2,3	2,3	5,0	2,0	—	—	1,4	1,1	1,8	2,0
Roggen	4,0	2,1	1,4	1,0	5,2	1,6	3,0	2,5	3,7	3,2	2,8	2,1	1,3	1,3	1,9	1,9
Gerste	3,4	3,8	2,2	1,2	3,3	3,3	1,6	1,1	1,5	2,1	1,0	1,5	1,2	1,2	2,0	2,2
Safer	2,8	3,2	1,6	1,6	1,5	1,5	1,8	2,2	1,6	2,2	2,5	3,1	2,7	2,7	2,2	2,8
Mischfrucht	3,0	3,2	2,0	2,0	2,0	3,3	2,0	2,0	2,2	2,5	2,5	1,6	1,5	1,7	2,9	3,1
Kartoffeln	3,5	—	2,0	—	1,9	—	2,3	—	2,1	—	2,2	—	2,0	—	1,7	—
Klee	5,2	—	4,0	—	4,7	—	5,5	—	5,7	—	4,1	—	2,0	—	5,2	—
Erbsen	5,2	—	4,1	—	4,2	—	5,3	—	6,3	—	3,9	—	2,0	—	5,3	—
Seppelfette	3,4	—	3,7	—	2,5	—	5,6	—	5,7	—	5,0	—	—	—	3,9	—
Runkelrüben	3,0	—	—	—	2,3	—	2,1	—	1,8	—	2,3	—	1,2	—	2,5	—
Stoppelrüben	3,3	—	—	—	2,0	—	3,3	—	2,5	—	3,0	—	1,0	—	3,5	—
Reps	6,5	—	—	—	—	—	5,6	—	6,8	—	2,2	—	4,6	—	4,4	—
Mohn	6,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—
Hanf	4,9	—	6,0	—	3,1	—	2,9	—	1,8	—	3,4	—	4,0	—	3,0	—
Flachs	6,0	—	—	—	—	—	5,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—
Tabak	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	1,4	—	2,7	—
Hopfen	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—
Sichorien	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	1,0	—	5,1	—
Zuckerrüben	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	5,0	—
Kraut und Gemüse	3,1	—	5,9	—	4,5	—	6,5	—	6,4	—	2,0	—	3,5	—	5,7	—
Wiesen: Heu	6,1	—	4,3	—	3,8	—	5,5	—	4,6	—	3,8	—	3,7	—	4,6	—
Stroh	3,9	—	4,2	—	4,1	—	5,1	—	3,2	—	3,8	—	2,9	—	5,9	—
Wein: Menge	5,6	—	—	—	3,0	—	5,9	—	4,5	—	2,3	—	2,1	—	2,6	—
Güte	3,6	—	—	—	2,9	—	1,5	—	1,6	—	2,0	—	1,1	—	2,2	—
Obst: Kirschen	3,3	—	8,0	—	4,7	—	7,2	—	6,3	—	4,7	—	4,6	—	4,9	—
Äpfel	2,0	—	2,7	—	1,5	—	6,1	—	6,2	—	5,1	—	4,4	—	4,2	—
Birnen	8,5	—	—	—	4,2	—	6,6	—	6,7	—	4,4	—	1,9	—	5,3	—
Zwetschgen u. Pflaumen	7,1	—	2,7	—	3,3	—	3,5	—	4,0	—	3,0	—	1,3	—	2,4	—
Rübe	7,7	—	8,0	—	5,0	—	6,2	—	6,7	—	6,7	—	8,1	—	7,4	—
Kastanien	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	1,9	—	3,6	—	5,0	—
Getreide	2,8	—	1,0	—	2,0	—	1,9	—	2,3	—	1,9	—	1,6	—	2,0	—
Kartoffeln	3,5	—	2,0	—	1,9	—	2,3	—	2,1	—	2,2	—	2,0	—	1,7	—
Futter und Heu	5,5	—	4,0	—	3,7	—	5,6	—	3,9	—	3,9	—	3,2	—	4,3	—
Futterackfrüchte	3,2	—	—	—	2,1	—	2,7	—	2,3	—	2,7	—	1,1	—	3,0	—
Handelsgewächse	5,2	—	6,0	—	4,0	—	2,5	—	2,5	—	2,6	—	3,1	—	2,9	—
Wein	4,9	—	—	—	2,7	—	4,9	—	3,6	—	2,2	—	1,8	—	2,5	—
Obst	5,7	—	4,5	—	3,4	—	5,6	—	5,7	—	4,2	—	3,3	—	4,5	—
Gesamternte	4,3	—	2,0	—	2,0	—	2,6	—	2,7	—	2,0	—	1,6	—	2,3	—

Fencharten, nach Kreisen und Landesgegenden 1874.

Kreise.						Geographische Gruppen.										Land.			
Mannheim		Heidelberg		Mosbad		I.		II.		III.		IV.		V.		1874		Durchschnitt 1865/74	
Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh
2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,1	2,0	2,1	1,2	1,6	1,6	2,1	1,6	1,5	1,6	1,1	1,6	1,9	3,9	3,0
2,0	1,5	2,0	1,8	1,0	1,0	2,5	1,7	2,0	1,5	3,2	1,6	1,8	1,9	1,4	1,2	2,0	1,6	3,9	3,7
2,4	1,8	2,1	2,1	2,3	1,2	3,7	1,9	3,4	2,2	3,3	2,4	1,7	1,6	2,1	1,2	2,8	2,0	3,7	3,4
2,6	1,8	2,3	2,3	2,3	2,2	3,3	3,3	3,3	4,5	1,4	1,6	2,2	2,1	2,5	2,1	2,4	2,3	3,6	3,7
4,0	2,6	2,3	2,9	2,7	3,6	2,2	2,5	2,3	2,7	1,6	1,9	2,5	2,7	3,5	3,3	2,6	2,7	3,4	3,5
2,0	1,0	2,0	2,0	2,1	1,6	2,3	2,3	2,3	2,8	2,2	1,9	1,5	1,7	2,1	1,6	2,2	2,0	3,6	3,4
	1,7		1,5		2,7		2,9		2,3		2,3		1,6		2,1		2,1		3,6
	6,4		3,3		2,0		4,8		5,0		4,6		4,2		3,2		4,2		4,0
	6,8		3,0		2,6		4,4		5,1		5,5		5,3		2,7		4,1		3,1
	5,0		3,3		2,0		3,2		3,2		5,6		3,8		2,3		3,3		3,2
	4,0		2,2		2,4		3,0		3,7		1,9		2,7		2,4		2,5		3,0
	4,4		3,5		3,0		3,1		2,0		2,7		3,1		3,9		3,0		3,7
	6,7		3,1		3,1		6,4		5,0		5,4		4,8		3,0		5,3		4,7
	—		4,5		2,0		6,1		2,0		—		3,9		2,8		3,9		4,1
	—		3,4		2,5		4,1		3,0		2,5		3,0		2,6		3,0		4,1
	—		—		6,4		6,0		—		6,0		—		6,4		6,3		4,4
	4,2		4,4		3,8		—		—		1,7		3,6		5,0		3,4		3,0
	2,2		4,3		5,0		2,0		—		—		2,3		5,8		2,7		3,6
	—		4,4		—		—		1,0		2,2		4,8		2,0		2,7		3,4
	3,7		2,3		1,2		—		—		2,5		4,2		1,1		3,2		3,3
	6,0		8,2		6,9		3,5		4,5		5,0		5,3		7,2		5,4		4,2
	3,8		3,1		3,2		5,1		4,5		4,5		4,0		3,3		4,4		3,3
	6,5		2,9		2,8		3,8		4,4		3,4		5,3		3,0		4,0		3,6
	1,2		2,1		6,3		5,6		2,0		4,2		2,4		5,6		4,2		5,0
	4,4		2,2		2,2		3,6		1,9		1,6		2,4		2,1		2,0		4,0
	5,6		3,0		8,0		4,7		4,2		6,1		4,9		5,3		5,3		4,9
	4,7		5,0		5,5		2,0		4,4		5,5		4,3		5,5		4,7		5,9
	3,7		6,4		7,5		8,4		5,9		4,8		3,8		7,0		6,0		5,8
	1,6		2,7		6,8		6,9		3,1		3,2		2,3		5,0		3,6		5,6
	6,4		7,2		8,8		7,3		5,1		7,0		7,4		8,1		7,1		5,1
	6,0		5,0		5,0		—		1,5		3,5		4,9		5,0		3,6		4,6
	2,0		2,0		1,7		2,3		2,5		1,8		1,9		1,8		2,0		4,0
	1,7		1,5		2,7		2,9		2,3		2,3		1,5		2,1		2,1		3,6
	5,7		3,3		2,2		4,8		4,5		3,9		4,3		2,6		4,0		3,4
	4,1		2,9		2,7		3,2		2,8		2,3		2,9		3,2		2,7		3,4
	3,4		4,1		3,4		5,2		2,5		2,4		3,5		3,5		3,3		3,6
	2,3		2,1		4,9		4,9		2,0		3,3		2,4		4,4		3,5		4,7
	4,3		4,6		7,0		5,5		4,3		4,9		4,2		5,8		4,9		5,3
	2,3		2,3		2,0		3,5		2,6		2,2		2,1		2,1		2,5		4,0

derselbe immerhin namentlich beim Obst und beim Futter (wie schon bemerkt), so wie beim Wein (Menge), Hanf, Flachs und in geringerem Maße beim Sommergetreide. Aus einigen Gegenden wird auch über Trockenheit im Spätsommer geklagt, in deren Folge besonders der Ertrag an Stopfrüchten, Tabak, Hopfen und Leindotter geschmälert worden ist, während die sonnige Witterung des September anderen Früchten vornehmlich dem Wein (Güte) noch zu gut gekommen ist.

Die Werthzahlen für die Hauptkulturarten sind, verglichen mit denjenigen der Vorjahre, folgende: Getreide 2,0 (gegen 4,0 des zehnjährigen Durchschnitts von 1865 bis 1874 und gegen 5,8 im Jahre 1873), Stroh 2,0 (gegen 3,6 bzw. 3,7), Kartoffeln 2,1 (gegen 3,6 bzw. 2,7), Futter 4,0 (gegen 3,4 bzw. 2,3), Futterhackfrüchte 2,7 (gegen 3,4 bzw. 2,0), Handelsgewächse 3,3 (gegen 3,6 bzw. 2,5), Wein 3,5 (gegen 4,7 bzw. 6,0), Obst 4,9 (gegen 5,3 bzw. 7,9). — Gesamterndte 2,5 (gegen 4,0 bzw. 4,9); und für die einzelnen Handelsgewächse: Raps 5,3 (gegen 4,7 bzw. 3,2), Mohn 3,9 (gegen 4,1 bzw. 3,4), Hanf 3,0 (gegen 4,1 bzw. 4,2), Flachs 6,3 (gegen 4,4 bzw. 4,4), Tabak 3,4 (gegen 3,0 bzw. 1,5), Hopfen 2,7 (gegen 3,6 bzw. 1,7), Siquorien 2,7 (gegen 3,4 bzw. 2,2), Zuckerrüben 3,2 (gegen 3,3 bzw. 3,3).

Während die Erndte von 1873 nach den allgemeinen Werthzahlen eine sehr ungünstige war, (nach den näheren Gemeindeberichten die ungünstigste der 10jährigen Erhebungsperiode), nimmt die Erndte von 1874 in dieser Periode eine der höchsten Stellen ein. Die Gesamterndte wurde allein im Jahre 1868 höher angeschlagen (mit 2,3), das Getreide nur einmal annähernd hoch im Jahre 1868 mit (2,2), die Kartoffeln zweimal höher (1865 mit 1,3, 1868 mit 1,5), der Wein nur einmal (1868 mit 1,8), das Obst dreimal (1867 mit 3,8, 1868 mit 3,7, 1870 mit 4,7), die Futterhackfrüchte einmal (1873 mit 2,0), die Handelsgewächse zweimal 1873 mit 2,5 und 1872 mit 3,0). Nur beim Futter und Heu nimmt das 1874er Ergebnis erst die siebente Stelle ein, indem allein die Jahre 1865, 1868 und 1870 eine geringere Note dafür erhielten. Es mag hiezu hervorgehoben werden, daß die zwei im Allgemeinen best charakterisirten Jahrgänge 1868 und 1874 geringe Futtererträge geliefert haben, während umgekehrt einige der im Ganzen schlechteren Jahrgänge (1867, 1871, 1873) reichliches Futter ergaben. Es bestätigt sich hierin die bekannte Thatsache, daß die Voraussetzungen für ein Gedeihen der Gräser und Futterkräuter andere sind als diejenigen für das Gedeihen der meisten übrigen landwirthschaftlichen Produkte, ohne daß sie natürlich gegenseitig sich auszuschließen brauchen.

Was die einzelnen Landesgegenden betrifft, so nimmt im Ganzen und im Großen, die Gunst der Erndte von Nord nach Süd ab. Während für die Gruppen von Amtsbezirken IV. und V. (von der Tauber bis zur Dos) die Gesamterndte mit 2,1 bezeichnet ist, fällt sie für die Gruppe III. (Rheinthal von der Dos bis Basel) auf 2,2, für II. (Schwarzwald) auf 2,6 und für I. (Seegegend) auf 3,5. Entscheidend sind hierbei hauptsächlich die Zahlen für Getreide, Kartoffeln und Futter, welche ein Fallen in der gleichen Richtung zeigen, während sich im Ganzen bei den Futterhackfrüchten, den Handelsgewächsen (für welche übrigens nur Gruppe III. und IV. in wesentlichen Betracht kommen), beim Wein und Obst ein etwas verschiedenes Verhältniß zeigt. Auch für diese Kulturen stellt sich die Seegegend am ungünstigsten, dagegen die Neckar- und Taubergegend weniger günstig, als für die erstgenannten Kulturen. Was insbesondere den Wein angeht, so ist derselbe in Folge der späten Fröste in einzelnen Gegenden und Bezirken, selbst in denselben Gemeinden, nach höherer oder tieferer, mehr oder weniger geschützten Lage an Menge sehr verschieden ausgefallen. Die Güte wird fast allgemein als eine gute und sehr gute bezeichnet, (nur die Seegruppe tritt auch hier zurück); im Ganzen aber hat die untere Rheinebene eine gute Weinerndte (2,4), die obere Rheinebene eine ziemlich gute (3,3), die Taubergegend und die Seegegend eine etwa durchschnittliche (4,4 und 4,9) Weinerndte gehabt; die für den Wein als gut (2,0) angegebene Schwarzwaldgruppe kommt wegen verhältnißmäßig geringen Weinbaues (im oberen Rheinthal, Kinzig- und Renschtal) nicht in entscheidenden Betracht; ihre günstige Zahl weist darauf hin, daß die Rebberge der Gebirgsthäler gegen die Fröste am besten geschützt waren.

Es darf schließlich bemerkt werden, daß die hier gelieferten Zahlen auf allgemeinen und zum Theil vorläufigen Schätzungen beruhen, durch die Berichte der Gemeinden über den Erndteausschlag eine gewisse Berichtigung erfahren und einen Anspruch auf absolute Genauigkeit, der nicht einmal für die letzteren erhoben werden darf, nicht machen können. Nichtsdestoweniger ist anzunehmen, daß das allgemeine Bild der vorjährigen Erndte der Wirklichkeit um so mehr sich annähern wird, als, wie erwähnt, allen Angaben eine dem relativen Anbauverhältniß entsprechende Bedeutung beigelegt wurde.