Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

11. Der Hauptoolith oder Hauotrogenstein

urn:nbn:de:bsz:31-217914

Visual Library

lichen Deutschlands (Württemb. Jahreshefte §. 88), stellen diese Thonablagerungen, auf Grund beinahe völliger paläontologischer Uebereinstimmung derselben mit Marcou's „Argovien" des Juradepartements, zu den mittleren Schichten der Oxfordgruppe (Kalke mit chailles und Spongiten, in Schwaben Oberregion des Ornatenthons und unterer weißer Jura), deren obere durch die plumpen Kalke des Cidaris florigemma gebildet werden.

b. Der braune Jura oder Dogger.

10. Cornbrash. Das Liegende der vorigen Ablagerung besteht in der Section aus mehreren älteren Jurabildungen und zwar immer mit Auslassung der obersten derselben, des Macrocephalenooliths, welcher am Schönberg ganz zu mangeln scheint. So liegt der Oxfordthon am Schneckenberge in einer Mächtigkeit von 8—10' über ockergelben, zersetzten, von Kalkspathschnüren durchzogenen, in Thon übergehenden Kalkbänken und diese werden von harten, oft sehr eisenschüssigen, braunrothen und gelbbraunen unvollkommenen Rogensteinen unterteuft, welche von dem zur Bergmasse entwickelten Hauptrogensteine durch eine Thonlage getrennt sind. Obgleich es mir nicht möglich wurde, in dieser Ablagerung auch nur Ein bezeichnendes Petrefakt zu finden, so mögen diese Kalke dennoch dem Cornbrash angehören. Am Högibuck bei Uffhausen bedeckt der Oxfordthon zum Theil den außergewöhnlich gehobenen Hauptrogenstein und dann unmittelbar oberhalb der Brunnenstube eine zu völliger Zerrüttung aufgerichtete, mit Thon bedeckte, nur 3' dicke Kalkbank des Cornbrash mit den bezeichnenden Versteinerungen.

Nach dem Vorkommen loser Kalksteine mit Petrefakten, scheint eine Cornbrashablagerung an der Ostseite unmittelbar unterhalb der tertiären Kuppe des Schönbergs sich zu befinden und zwar so versteckt, daß deren Verhalten zu den übrigen Ablagerungen nicht ohne größere Nachgrabungen ermittelt werden kann. Nahe der Südgrenze der Section wurde einst im Walde oberhalb dem Kukuksbade und an der Ostseite des Hochfirst Cornbrash durch das Aufwerfen einer Waldgrenze über dem Hauptrogenstein aufgedeckt. So mangelhaft alle diese Aufschlüsse sind, so haben sie dennoch auf das Klarste durch ihre organischen Reste die Anwesenheit des Cornbrash am Schönberggebirge dargethan. Letztere wurden zum Theile durch Fromherz, zum Theile durch mich zu Tage gefördert und bestehen in folgenden Arten:

Belemnites canaliculatus *Schlth.* Högibuck, Hochfirst.
Rhynchonella varians *Schlth* sp. „ „
„ Badensis *Oppel.* Schönbergkuppe.
Rhynchonella decorata *d'Orb.* Högibuck bei der Brunnenstube von Uffhausen.
Gresslya peregrina *d'Orb*, ebendaselbst und Hochfirst.
Modiola gibbosa *Sow.* Högibuck und Hochfirst.

Von der sonst im oberen Breisgau so häufigen Ostrea Knorri *Ziet.* kamen mir nur am Hochfirst einige Exemplare vor; ferner fand ich dort einen Ammoniten aus der Familie der Planulaten mit großer Neigung zum Charakter der Macrocephalen; vielleicht gehört er der neuen Art Am. Morrisi an, welche Oppel im Großoolith von Gloucestershire und im Cornbrash von der Egg bei Aarau fand und so benannte.

Dem Cornbrash des ganzen südwestlichen Deutschlands völlig neu ist Rhynchonella decorata, welche Fromherz am Högibuck in Begleitung der Rhynchonella varians fand. Das gut erhaltene Exemplar zeigt eine unzweideutige Uebereinstimmung mit derselben Muschel von Poix in den Ardennen. An diesem Orte und anderen in der Normandie hat diese Rhynchonella ein tieferes Lager (Parkinsonoolith, obere Schichte des Oolithe de Bayeux), soll sich aber im Aisne-Departement auch im Cornbrash finden, welcher an anderen Orten des Breisgau's das Lager des Ammonites Parkinsoni ist.

11. Der Hauptoolith oder Hauptrogenstein (Fromherz) bildet die mächtigste Flözablagerung der Section. Derselbe tritt bei Staufen zu beiden Seiten der Ausmündung des Münsterthales nur in kleinen, stark aufgerichteten, isolirten Massen auf, erscheint aber an der Ostseite des Schönberges wieder in großen Ablagerungen, welche von Ebringen bis Uffhausen einen bewaldeten Steilrand darstellen, der durch den Einschnitt des Thales von Thalhausen nach Wittnau unterbrochen wird. Man ist gewöhnt, hiernach das Gebirge des Schönberges in einen hinteren südlichen und vorderen nördlichen Schönberg einzutheilen und zu benennen. Die größte Mächtigkeit des Oolithes mag in diesem Zuge 450' betragen; das Hauptstreichen des ersteren geht aus Südwest nach Nordost, also in Stunde 4 unter allgemeinem westlichen Einfallen, welches in den Steingruben der Dachslöcher bei Uffhausen 20° beträgt. An der Südspitze des vorderen Schönbergs erreicht der Oolith die Höhe von 2000' über dem Meere, welche demselben im Markgrafenlande nicht mehr zukommt. Unterhalb dieser Höhe erscheint auch die Basis der Ablagerung am allerhöchsten am Schönberge und mag 1500' Meereshöhe betragen. Hier haben zugleich ungewöhnliche Hebungen stattgefunden, denen nach

Unterspülung des Steilrandes große Abtrennungen desselben und des auf ihm ruhenden tertiären Conglomerates folgten. So ruht am Kapuzinerbuck bei Wittau in überstürzten Schichten Hauptoolith über dem Muschelkalke und ebenso das Tertiär in dem Weinberge dieses Dorfes auf älteren jurassischen und triassischen Formationen (vergl. Profil Nro. 4 und 5).

Die ganze Südspitze des Schönbergs und ihre östlichen und westlichen steilen Abfälle sind von Gebirgsschutt und Blöcken des Oolithes bedeckt und ebenso der Fuß des felsigen Steilrandes oberhalb Au. An weniger geneigten Stellen, wo die Bildung von Erden zulässig war, ist das Gestein gelblich und unter Abrundung aller Kanten zerfressen und durchlöchert; es entstehen hieraus seltsame Gesteinsformen, welche, wie die löcherigen Kalktuffe, zu landschaftlichen Verzierungen und Einfassungen in den Gärten gebraucht werden. Diese Erden selbst haben eine umbrabraune Farbe, werden in der Sonnenwärme rissig und sind, wie die Erden der Mulden des oberen weißen Juras der württembergischen Alp, kalkfreie Thonboden, aber zum Unterschiede von diesen, sehr reich an Phosphorsäure. Außer den besagten Erden erscheinen auf den großen Klustflächen des Gesteines bolartige, eisenrothe Thone und in den tieferen Regionen (Steinbruch der Ziegelhütte bei Uffhausen) große Kalkspathskalenoëder, auch fand man hier in den Kalkspathdrusen Zinkblende. Alle diese Produkte verdanken unzweifelhaft ihre Entstehung einem lange andauernden Auslaugungsprozesse des Kalksteines.

Bei der Untersuchung des Tieflandes fand ich am Hunnenbuck im Opfinger Mooswalde an einer Quelle des Landwassergrabens Hauptoolith anstehend; derselbe ist mit Löß bedeckt und zeigt eine kaum merkbare Entblößung durch den Straßeneinschnitt und eine Quelle unterhalb desselben, welche auf beinahe gleichem Niveau wie der Landwassergraben liegt. Das Gestein bei der Quelle ist so zerfressen, wie dies nur in einem sehr langen Zeitraume geschehen konnte, womit wir uns gegen den Vorwand schützen wollen, als sei dasselbe durch die Hunnen hierher verbracht worden.

Der nachbarliche Oolith von Mördingen an der Westgrenze der Section ist durch seinen Versteinerungsreichthum bekannt; dies Gestein nimmt Antheil an der Bildung der Tuniberghügel, welche sich von Süden (Munzingen) nach Norden (Gottenheim) vorherrschend als ein Lößland erstrecken und in ihren festen Schichten ein östliches Einfallen zeigen. Wir können mit Recht die Hügel von Lehen und von Hugstetten nach Nimburg als deren Fortsetzung betrachten, da auch an ihnen bald jüngere, bald ältere Jurabildungen aus dem Tieflande auftauchen. Südwestlich Nimburg steht nahe dem vormaligen Kloster der Hauptoolith in diesen Hügeln unter starker Schichtenneigung wieder an und zwar, wie dies aus der horizontalen Verbreitung und Neigung der Schichten (= 42 — 44° unter Streichen in Stunde 1) hervorgeht, in einer Mächtigkeit wie am Schönberge. In einem Steinbruche in der Neuburg, südlich dem Kloster, ist zwischen eine mehr als 12′ breite Spalte der unter 44° westlich einfallenden Oolithbänke ein merkwürdiges Conglomerat eingebettet; dasselbe wird von einem rothgelben, mageren Thone mit eckigen Oolithstücken und Lößknauern vertikal, vielleicht becherförmig, umschlossen. Das Conglomerat besteht aus Thoneisensteingeoden und Geröllen tiefer liegenden Eisenoliths und Sandsteins, und das Bindemittel aus kalkreichem magerem Thone. Die Bildung zeigt eine Schichtung, wie ein Wechsel von Sand und Geröllen am Strande bewegten Wassers; über demselben folgt Löß und Dammerde. Wir treffen an dem gleichen Hügel über den Triasschichten ähnliche Conglomerate und werden die Entstehung dieses bei jenen erklären. — Unterhalb der Bahlinger Eck, etwa 60′ höher als die Straße von Bahlingen nach Riegel, wurden Schichten eines Kalksteines angebrochen, welche zum Hauptoolithe gehören und im Besonderen mit dessen Auftreten am Fuße des Michelsberges bei Riegel im Zusammenhange stehen möchten.

Die Gesteinsbeschaffenheit des Hauptooliths erleidet von der im Oberlande herrschenden einige Abweichungen: so entbehren die unteren Lagen der Formation im Steinbruch bei der oberen Ziegelhütte von Uffhausen und das Gestein von Riegel, die gewöhnliche Schichtung, sie sind vielmehr fast massig und zeigen nur im Großen eine parallele horizontale Absonderung neben starker vertikaler Zerklüftung. Das gelbbraune Gestein im Steinbruch von Uffhausen ist feinkrystallinisch, enthält nur selten Rogenkörner, keine Muscheltrümmer und von Versteinerungen höchstens zu Zöpfen verschlungene Serpulen. In der übrigen geschichteten Hauptmasse der Ablagerung zeigt sich vollkommene Rogensteinstruktur, die Körner enthalten einen Kern von eisenschüssigem oder auch reinem Kalkspath, welchen eine dichte Kalkmasse concentrisch-schalig umlagert, und erreichen gewöhnlich die Größe des Mohnsaamens; sie sind durch farblosen Kalkspath cementirt, oder dieser ist durch Eisenoxydhydrat hell gelbbraun gefärbt. In den höheren Lagen der Ablagerung sind Muscheltrümmer, besonders von Ostreen und Mytilusarten und Crinoidenstiele oft so sehr angehäuft, daß sich die Rogensteinstructur verliert und das Gestein einer Breccie gleichsieht (Oelberg bei Ehrenstetten, Steilrand oberhalb

Wittnau, Hunnenbuck und Nimburg). Der normale Rogenstein besitzt eine Eigenschwere von 2,65 — 2,70, also keine größere als gewöhnliche Kalksteine (demnach eine geringere als Arragonit und Erbsenstein). Oft enthält der Oolith in Drusenräumen Kalkspath, in welche sich nicht selten Stylolithen verlaufen.

An organischen Resten ist unser Gestein im Vergleich zu seiner Mächtigkeit nicht reich und dieselben sind in ihm ohne bestimmte Folge vertheilt. Die Erhaltung der Petrefakte im Hauptoolith ist meist sehr mangelhaft und sie erscheinen oft lagenweise als Trümmer. Unter den vorhandenen Versteinerungen ist Ostrea acuminata durch ihr Vorkommen in Trümmern, und Pentacrinus Nicoleti bezeichnend. Wir kennen aus der Section folgende Arten:

Bruchstücke von Belemnites giganteus.
Steinkerne von Nerineen (Oelberg bei Ehrenstetten und Uffhausen).
Terebratula, der ornithocephala *Sow.* ähnlich. Uffhausen.
Rhynchonella acuticostata nova spec. Uffhausen.
Pholadomya costata *Fromherz* (P. bucardium *Ag.*). Uffhausen.
Trigonia costata *Park.* Uffhausen.
„ undulata *Ag.* (*Fromherz*). Uffhausen.
Astarte detrita *Goldf.* (A. modiolaris *Desh.*). Uffhausen.
Avicula echinata *Sow.* (A. tegulata *Goldf.*),
„ decorata, beide bei Uffhausen, Riegel und Nimburg.
Mytilus. Fromherz nannte ihn Mytilus acutus *Römer*, eine Art der Kimmeridge-Gruppe, welche bei uns die Länge von 1½" erreicht.
Lima fimbriata *Fromh.* Uffhausen.
„ tumescens *Fromh.* „
„ pectiniformis *Schlth.* Uffhausen, Nimburg.
„ gibbosa *Sow.* Uffhausen.
Pecten lens *Sow.* „
Ostrea Marshii *Sow.* „
„ acuminata *Sow.*, nicht so häufig wie anderwärts in dem Gebilde und meist in Bruchstücken.
Clypeus patella *Ag.* (Nucleolites sinuatus *Bronn*). Uffhausen.
Pentacrinus Nicoleti *Desor.* in den oberen Schichten zu wirklichem Trümmerconglomerat angehäuft.
Apiocrinus rotundus *Desor* (Ap. Parkinsoni *d'Orb.*). Nimburg.
Serpula socialis *Goldf.*, gemein.
Astreen, meist in Kalkspath umgewandelt. Fromherz führt eine Astr. helianthoides, A. concinna *Goldf.* und A. pentagonalis *Mstr.* von Uffhausen an.

In der Lettengrube des Högibucks bei Uffhausen findet man beim Durchsuchen der Grenze zwischen dem Oxfordthon und dem Hauptoolith, an den Kanten zugerundete lose, faustgroße Steine eines unreinen, dichten, licht gelbbraunen und grauen Kalksteines, welche von Lithodomen angebohrt sind und durch Herrn Professor Fr. Sandberger im Markgrafenlande über dem Hauptoolith und unter Cornbrash getroffen wurden, folglich eine oberste Etage des Hauptooliths wie im Aargau bilden möchten.

Der Hauptoolith hat nach sämmtlichen in ihm seither entdeckten Versteinerungen trotz seines überwiegenden mächtigen Auftretens und besonderen Gesteinscharakters wenig Eigenthümliches, denn die Bildung enthält, will man nicht etwa Gewicht auf einige Limen und die Trigonia undulata legen, keine für sie ausschließlich charakteristische Thierschöpfung. Man fand im Hauptoolith des Breisgaus, außer Belemnites giganteus, auch Ammonites coronatus (A. Blagdeni der Franzosen und Engländer), beide wichtige Fossile aus der unteren Zone des Am. Humphriesianus oder des braunen Jura δ Schwabens. Am. Humphriesianus hat man zwar noch nicht in dem Oolith selbst gefunden, dagegen in der nächstfolgenden unteren Bildung. In dem über dem Hauptrogenstein liegenden Cornbrash wurde Am. Parkinsoni nachgewiesen (ich citire die geologische Beschreibung der Section Müllheim durch Herrn Professor Sandberger S. 8, und die Sammlung der Universität Freiburg), somit wäre die Bildung zwischen die Zone der beiden Ammoniten oder in die untere Bathgruppe einzureihen. Wir können diese Folgerung aber nicht als abgemachten Schluß betrachten, da man im Aargau selbst in den unteren Schichten des Rogensteins Am. Parkinsoni nachgewiesen hat.

Der Hauptrogenstein giebt durch das Brennen sehr guten fetten Kalk; die oberen Bänke liefern brauchbaren Baustein. Die Römer sägten dieselben in Platten und belegten damit in Badenweiler ihre warmen Bäder. Noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts gewann man zur Steinschleiferei beim Kloster Nimburg „gelbfahlen Marmor mit schwarzen Punkten".

12. Der Eisenoolith beginnt oben mit sandigen Kalkmergeln und Kalksteinen, dem Vor-