

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1897

[urn:nbn:de:bsz:31-220876](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220876)

Statistische Mittheilungen

über das Großherzogthum Baden.

Band XV.

Jahrgang 1898.

Nr. 5.

Inhalt: 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1897. — 2. Die geburtsärztliche Statistik für das Jahr 1897.

1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1897.

(Vergl. Band XIV, Jahrgang 1897, Nr. 5, S. 81 ff.)

In üblicher Weise werden im Folgenden die Ergebnisse der jährlichen regelmäßigen statistischen Ermittlungen über die Todesursachen, die ärztliche Behandlung der Gestorbenen, die Infektionskrankheiten, die Krankenanstalten und das Impfgeschäft für das Jahr 1897 dargestellt.

Die Tabelle 1 (sog. medizinische Tabelle) enthält wie in den Vorjahren für Bezirke und Kreise, sowie für die größeren Gemeinden zunächst einige allgemeine Zahlen der Sterblichkeitsstatistik, giebt dann den Umfang des ärztlichen Beizugs zu den tödtlich verlaufenen Krankheitsfällen und die Zahl der Todesfälle in Krankenanstalten an, und führt schließlich in hergebrachter Ausdehnung die Sterbefälle an den verbreitetsten Infektionskrankheiten, an Lungenschwindsucht und Entzündung, an Krebs und an Kindbett, sowie die gewalttham Gestorbenen auf. Die Tabelle 2 bringt in einer Landesübersicht die Sterbefälle für die sämtlichen Todesursachen. Der Tabelle 1 ist eine Uebersicht der Gesamtzahlen des vorhergehenden Jahrzehnts angefügt; in Tabelle 2 wird eine auf alle einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts ausgedehnte Nachweisung gegeben. Die Tabelle 3 zeigt die Verbreitung der Erkrankungen an den anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken und in den einzelnen Monaten des Jahres. Die Ergebnisse des Impfgeschäfts und die Verhältnisse der Krankenanstalten und ihrer Insassen sind in den Tabellen 4 und 5 bezw. in den begleitenden textlichen Ausführungen zur Darstellung gebracht.

I. Die Gestorbenen nach Todesursachen.

Die badische Todesursachenstatistik gründet sich auf die seit 1807 bezw. 1809 für das Großherzogthum im Ganzen zu Recht bestehende obligatorische Leichenschau. War der Verstorbene während der mit Tod ausgehenden Krankheit u. von einem Arzt behandelt, so ist dessen Angabe, andernfalls diejenige des für jede Gemeinde des Landes vorhandenen amtlichen Leichenschauers maßgebend. Ueber jeden Todesfall wird von dem Leichenschauer ein besonderes Formular (der Leichenschauchein) ausgefüllt, das dem Staatsarzt des betr. Verwaltungsbezirks (Bezirksarzt) zur Kontrolle vorzulegen ist. Von letzterem werden die bezüglichen Angaben in die von den Landesbeamten aufgestellten und durch die Amtsgerichte gesammelten Anzüge über die Sterbefälle aus den Landesregistern eingetragen und vierteljährlich dem Gr. statistischen Landesamt zur weiteren Bearbeitung übermittelt.

1. Die ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen.

Im Jahre der erstmaligen Ermittlung (1852) machten die in ärztlicher Behandlung Gestorbenen 47,4% aller Gestorbenen aus. Ihre Zahl nahm zunächst rasch zu; sie betrug 1863 bereits 58,2%, stieg dann aber nur langsam weiter und erreichte erst im Jahr 1877 die Höhe von 60,3%. Nach einigem Schwanken wuchs sie abermals rascher an und betrug 1888 erstmals mehr als 65%, 1894 mehr als 71, 1896 und 1897 über 70%. Für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts und dessen Durchschnitt lauten die Zahlen wie folgt:

Jahre	Zahl der Gestorbenen (ohne Todgeb.)	Davon in ärztlicher Behandlung gewesen.		Jahre	Zahl der Gestorbenen (ohne Todgeb.)	Davon in ärztlicher Behandlung gewesen	
		absolut	%			absolut	%
1888	39012	25530	65,5	1894	39583	28301	71,5
1889	38062	25034	65,8	1895	37513	25900	69,0
1890	38205	25942	67,9	1896	34986	24738	70,7
1891	38762	25730	66,4	1897	37422	26234	70,1
1892	37474	25341	67,6	im Durchschnitt			
1893	41437	28064	69,2	1888,97	38246	20142	68,4.

(Fortsetzung des Textes auf Seite 96.)

Tabelle 1 a.

Medizinische Tabelle der Amtsbezirke bezw. Gemeinden

1 Amtsbezirke.	2 Tobt- geborene		3 Ge- storbene ohne Tobt- geborene	5 Davon starben									
	Zahl	%		ärzt- lich	nicht ärztlich	in Kran- ken- und Pfl- ege- Anstalten	im ersten Lebensjahr (ohne Tobtgeb.)				auf 1000 Ein- wohner	darunter unehelich	
							behandelt	behandelt	Zahl	der Ge- storb- nen ohne Tobtgeb.			Zahl
Eugen	12	2,96	394	270	124	68,5	48	12,2	93	23,6	4,5	6	6,5
Konstanz	43	4,61	889	713	176	80,2	94	10,6	258	29,0	5,5	29	11,2
Mehlfirch	6	1,90	309	156	153	50,5	15	4,9	112	36,2	8,1	9	8,0
Fullendorf	8	4,28	179	130	49	72,8	11	6,1	62	34,6	6,4	12	19,4
Stodach	18	4,35	396	244	152	61,6	7	1,8	106	26,8	5,6	17	16,0
Heberlingen	18	3,72	466	347	119	74,5	43	9,2	104	22,3	3,9	20	19,2
Donaueshingen	10	1,85	530	378	152	71,3	62	11,7	151	28,5	6,2	11	7,3
Triberg	19	4,07	448	311	137	69,4	27	6,0	161	35,9	7,4	12	7,5
Billingen	21	3,13	650	461	189	70,9	16	2,5	241	37,1	9,3	27	11,2
Bonndorf	8	2,45	318	221	97	69,5	15	4,7	60	18,9	3,8	12	20,0
Sadingen	14	3,92	343	225	118	65,6	6	1,7	72	21,0	3,8	—	—
St. Blasien	5	2,58	189	130	59	68,8	13	6,9	33	17,5	3,4	—	—
Waldshut	24	3,89	626	431	195	68,8	63	10,1	131	20,9	4,0	10	7,6
Breisach	29	8,17	326	234	92	71,8	17	5,2	70	21,5	3,6	4	5,7
Emmendingen	46	4,80	913	658	255	72,1	38	4,2	261	28,6	5,5	22	8,4
Ettenheim	14	3,53	383	279	104	72,8	—	—	107	27,9	6,0	5	4,7
Freiburg	66	3,79	1675	1389	286	82,9	510	30,4	440	26,3	5,5	109	24,8
Neustadt	12	3,59	322	238	84	73,9	23	7,1	82	25,5	5,5	8	9,8
Staufen	9	2,69	326	254	72	78,5	13	4,0	87	26,7	4,8	9	10,3
Waldkirch	25	5,01	474	288	186	60,8	16	3,4	147	31,0	6,8	31	21,1
Lörrach	38	4,90	737	611	126	82,9	74	10,0	202	27,4	5,0	15	7,4
Müllheim	16	4,38	349	287	62	81,7	15	4,3	65	18,6	3,1	15	23,1
Schnau	16	4,94	308	220	88	71,4	14	4,5	61	19,8	3,9	5	8,2
Schopshelm	23	5,79	374	293	81	78,3	83	22,2	90	24,1	4,2	11	12,2
Rehl	22	4,04	522	383	139	73,4	2	0,4	162	31,0	5,7	28	17,3
Zahr	32	3,92	785	597	188	76,1	35	4,5	258	32,9	6,9	18	7,0
Oberkirch	17	4,28	380	266	114	70,0	23	6,1	110	29,0	6,0	13	11,8
Offenburg	51	4,07	1203	829	374	68,9	95	7,9	397	33,0	7,3	23	5,8
Wolfach	21	4,17	482	294	188	61,0	11	2,3	148	30,7	6,1	24	16,2
Achern	13	2,24	567	369	198	65,1	47	8,3	190	33,5	8,1	19	10,0
Baden	20	3,40	568	405	163	71,3	51	9,0	181	31,9	6,8	19	10,5
Bühl	28	3,99	675	429	246	63,6	89	13,2	192	28,4	6,4	16	8,3
Rastatt	41	3,04	1306	776	530	59,4	40	3,1	473	36,2	7,9	36	7,6
Bretten	30	5,25	541	377	164	69,7	2	0,4	200	37,0	8,2	23	11,5
Bruchsal	40	2,51	1553	974	579	62,7	41	2,6	684	44,0	11,3	36	5,3
Durlach	58	5,91	924	570	354	61,7	6	0,6	402	42,4	11,4	51	12,7
Ettlingen	17	2,54	652	369	283	56,6	13	2,0	275	42,2	11,6	19	6,9
Karlsruhe	121	4,69	2458	1985	473	80,8	354	14,4	959	39,0	8,2	157	16,4
Pforzheim	87	4,83	1713	1137	576	66,4	164	9,6	712	41,6	10,4	99	13,9
Mannheim	141	6,94	2890	2129	761	73,7	327	11,3	1315	45,5	10,6	223	17,0
Schwezingen	38	3,96	921	571	350	62,0	4	0,9	492	53,4	14,9	54	11,0
Weinheim	29	5,36	512	363	149	70,9	54	10,5	185	36,1	8,2	32	17,3
Eppingen	9	2,46	357	238	119	65,3	2	0,6	110	30,8	6,0	13	11,8
Heidelberg	113	5,19	2066	1648	418	79,8	353	17,1	740	35,8	9,1	110	14,9
Einshelm	35	4,46	749	503	246	67,2	33	4,4	271	36,2	7,9	27	10,0
Wiesloch	22	3,56	596	343	253	57,6	4	0,7	281	47,1	12,5	12	6,6

*) Diese sowie die in Tab. 2 (Bth. V. Krankheitsnummer 31 a—31 o) gemachten Angaben über gewalttame Todesfälle stimmen nicht als gewalttame gerechnet, bei denen überhaupt eine äußere Einwirkung vorausging, gleichviel, ob der Tod durch eine andere hinzugezogene

mit über 4000 Einwohnern für das Jahr 1897.

Tabelle 1a.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Nach Todesursachen: Geschlechter

an Malaria	an Scharlach	an Blattern	an Diptheritis	an Krupp	an Keuchhusten	an Influenza	an Kindbettfieber		an Typhus	an Ruhr	an sonstigen Infektionskrankheiten	im Ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 15-26)		gewaltig durch		an Krebs	an Lungenerkrankung und an Bronchitis	an Gingen-schwindsucht	im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-33		insbesondere Minderbetrachten in der ersten 3 Wochen
							überhaupt	davon in den ersten 3 Wochen				Selbstmord	Berupflückung und Verbrechen	Zahl	% der Gestorbenen				Zahl	% der Gestorbenen	
6,5	—	—	5	4	1	1	—	—	1	—	2	14	3,55	3	8	30	46	46	147	37,3	—
1,2	2	1	6	2	2	—	6	6	1	—	6	26	2,92	13	23	77	74	125	338	38,0	9
8,0	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1,29	2	9	20	47	84	116	37,5	1
9,4	—	—	4	—	5	2	—	—	—	—	2	13	6,65	1	4	8	18	6	50	27,9	1
6,0	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	1	7	1,77	3	11	30	39	39	129	32,6	1
9,2	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	2	8	1,72	3	14	43	30	42	140	30,0	2
7,3	5	2	6	1	18	—	1	1	3	—	1	37	6,98	9	9	27	63	47	192	36,2	4
7,5	4	1	8	1	6	—	2	2	1	—	2	25	5,58	3	10	18	53	35	144	32,1	5
1,2	14	—	—	3	36	9	2	2	2	—	2	68	10,46	7	13	15	77	64	244	37,5	3
0,0	1	—	8	1	3	1	2	1	—	—	1	17	5,35	3	7	18	37	27	109	34,3	2
—	—	—	1	1	2	—	1	1	1	—	—	6	1,75	2	12	21	24	55	120	35,0	1
7,6	2	—	4	—	—	2	2	2	—	—	1	11	5,82	2	8	10	12	15	58	30,7	2
—	1	—	1	1	6	3	3	3	2	—	3	20	3,20	4	21	42	44	56	187	29,9	5
5,7	—	4	6	—	—	1	1	1	—	—	1	15	4,60	2	9	11	39	37	113	34,7	3
8,4	3	1	20	4	11	3	3	2	3	—	4	52	5,70	5	24	46	99	119	345	37,8	7
4,7	—	—	4	7	2	1	—	—	1	—	6	21	5,48	3	7	22	54	52	159	41,5	1
4,8	—	3	18	2	15	2	1	1	5	—	11	57	3,40	21	34	112	140	230	594	35,5	7
9,8	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	4	1,24	2	5	24	35	22	92	28,6	1
0,3	—	—	5	2	5	—	—	—	—	—	—	13	3,99	4	4	15	27	42	105	32,2	1
1,1	—	—	7	3	6	—	1	1	—	—	10	27	5,70	6	13	10	36	59	151	31,9	4
7,4	6	—	6	2	7	4	—	—	3	—	2	30	4,07	9	10	35	70	102	256	34,7	3
3,1	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	3	7	2,01	6	10	22	36	48	129	37,0	—
8,2	2	—	3	2	—	3	1	1	—	—	3	14	4,55	1	4	21	23	31	94	30,5	2
2,2	1	—	3	—	1	—	1	1	2	—	—	8	2,14	6	7	22	47	39	129	34,5	2
7,3	2	—	13	11	1	11	2	1	3	—	8	51	9,77	7	14	29	45	46	192	36,8	2
7,0	1	1	25	4	2	1	4	3	1	—	4	43	5,48	8	17	38	85	89	280	35,7	4
1,8	7	2	10	4	—	4	4	4	1	—	1	33	8,68	2	9	22	36	39	141	37,1	4
5,8	27	6	26	6	7	6	1	1	9	1	5	94	7,81	7	29	53	120	132	435	36,2	4
6,2	6	4	4	2	2	1	2	2	—	—	2	23	4,77	4	13	24	47	55	166	33,5	2
0,0	27	—	5	7	—	1	1	1	8	—	7	56	9,88	—	11	30	44	75	216	38,1	2
0,5	1	2	9	2	1	1	1	1	3	—	4	24	4,23	8	17	19	41	78	187	32,9	2
8,3	3	—	3	5	—	1	1	1	—	—	3	16	2,37	2	11	29	45	68	171	25,5	3
7,6	35	1	18	12	10	3	5	4	9	—	7	100	7,66	6	24	55	157	187	529	40,5	5
1,5	21	3	4	6	21	11	1	1	—	—	3	70	12,94	4	11	37	59	48	229	42,3	4
5,3	7	1	29	22	7	9	5	5	2	—	4	86	5,54	8	22	56	128	189	489	31,5	5
2,7	19	2	24	8	26	2	2	1	1	—	7	91	9,85	5	10	21	109	93	329	35,6	5
6,9	8	1	6	6	16	4	3	3	9	—	2	55	8,44	2	10	16	76	85	244	37,4	3
6,4	39	4	27	10	36	19	7	6	18	—	29	189	7,69	25	39	136	178	349	916	37,3	11
3,9	58	5	10	7	45	9	—	—	75	—	10	219	12,78	15	36	39	178	157	644	37,6	7
7,0	75	4	31	6	34	6	8	6	3	—	25	192	6,64	47	54	88	273	393	1047	36,2	18
1,0	6	—	13	11	—	1	2	2	1	—	4	38	4,13	5	14	28	117	142	344	37,4	2
7,3	15	1	5	1	2	2	—	—	—	—	2	28	5,47	6	9	26	45	41	155	30,3	4
1,8	4	—	5	1	4	1	—	—	4	—	3	22	6,16	—	9	14	48	41	134	37,5	2
4,9	22	3	43	14	7	7	3	3	5	2	42	148	7,16	32	41	116	256	265	858	41,5	13
0,0	9	—	10	5	26	9	1	1	—	—	3	63	8,41	3	10	39	88	70	273	36,4	5
6,6	15	—	13	6	4	1	1	1	2	—	3	45	7,55	—	7	17	62	76	207	34,7	4

überein. Dort werden auch Hirschschlag und Folgen von Operationen mitgezählt, hier dagegen nicht. Ferner werden hier alle diejenigen Todesfälle Krankheit verursacht wurde oder nicht, während in Tab. 2 der letztere Umstand berücksichtigt ist. — **) an Krankheiten jeglicher Art.

Noch: Tabelle 1a.

Noch: Medizinische Tabelle der Amtsbezirke bezw.

1 Amtsbezirke bezw. Gemeinden.	2 Todes- geborene		3 Ge- storbene ohne Todes- geborene	4 D a v o n s t a r b e n						5 im ersten Lebensjahr (ohne Todtgeb.)			
	6 Zahl	7 % der Ge- storb- enen mit Todtge- borenen		8 ärzt- lich be- handelt	9 nicht ärztlich	10 ärztlich be- handelt in % der Ge- storb- enen	11 in Kranken- und Pflge- und sonstigen Anstalten		12 Zahl	13 % der Ge- storb- enen ohne Todtgeb.	14 auf 1000 Ein- wohner	15 darunter unehelich	
							16 Zahl	17 %				18 Zahl	19 %
Noch: Amts- bezirke:													
Welsheim	10	3,45	280	179	101	63,9	1	0,4	76	27,1	5,5	9	11,8
Buchen	23	4,61	551	356	195	64,6	1	0,2	166	30,1	6,1	7	4,2
Eberbach	14	3,72	362	213	149	58,8	7	1,9	117	32,3	7,9	17	14,5
Rosbach	27	4,00	650	370	280	56,9	16	2,5	213	32,8	7,0	13	6,1
Lauterbischofsbm.	28	3,07	885	523	362	59,1	19	2,1	232	26,2	5,0	18	7,8
Wertheim	17	4,63	350	270	80	77,1	10	2,9	75	21,4	3,9	5	6,7
Gemeinden mit über 4000 Einwohnern:													
Mannheim *)	108	4,72	2185	1707	478	78,1	327	15,0	952	43,6	9,7	172	18,1
Karlsruhe	70	4,20	1595	1442	153	90,0	354	22,2	571	35,8	6,8	123	21,5
Freiburg	45	3,91	1118	995	123	89,0	510	45,6	300	26,8	5,6	91	30,3
Heidelberg	47	5,08	879	813	66	92,5	348	39,6	238	27,2	6,8	55	23,1
Pforzheim	34	4,33	752	642	110	85,4	164	21,8	263	35,0	7,9	43	16,3
Stonstanz	22	6,29	328	279	49	85,1	70	21,3	98	29,9	5,2	16	16,3
Baden	10	3,48	279	229	50	82,1	49	17,6	64	22,9	4,3	8	12,5
Rastatt	6	3,49	166	147	19	88,6	35	21,1	36	21,7	2,7	6	16,7
Bruchsal	15	5,81	243	220	23	90,5	32	13,2	91	37,4	7,2	8	8,8
Lahr	15	6,20	227	197	30	86,8	35	15,4	67	29,5	6,0	7	10,4
Offenburg	13	6,77	179	161	18	89,9	26	14,5	42	23,5	4,3	2	4,8
Weinheim	14	5,36	247	193	54	78,1	54	21,9	78	31,6	8,1	17	21,8
Durlach	17	6,77	234	184	50	78,6	6	2,6	90	38,5	9,8	14	15,6
Lörrach	5	2,69	186	162	24	87,1	43	23,1	56	30,1	6,2	4	7,1
Nedarau, Landgem.	11	4,38	210	160	50	76,2	—	—	113	53,8	14,8	12	10,6
Ettlingen	8	3,90	197	169	28	85,7	13	6,6	77	39,1	11,2	9	11,7
Billingen	9	4,62	186	147	39	79,0	15	8,1	75	40,3	10,9	10	13,3
Schwebsingen	5	3,38	143	108	35	75,5	4	2,8	75	52,4	13,5	11	14,7
Brödingen, Landgem.	9	5,49	155	87	68	56,1	—	—	86	51,9	15,7	11	12,8
Hodenheim	3	2,13	138	74	64	53,6	—	—	79	57,2	15,0	7	8,9
Emmendingen	6	4,92	116	96	20	82,8	38	32,8	27	23,3	5,3	5	18,5
Eberbach	4	3,39	114	84	30	73,7	6	5,3	34	29,1	6,7	6	17,6
Bretten	7	6,25	105	91	14	86,7	2	1,9	32	30,5	7,1	3	9,4
Furtwangen	4	4,50	85	75	10	88,2	13	15,3	24	28,2	5,3	2	8,3
Waldfirch	7	6,93	94	71	23	75,5	16	17,0	24	25,5	5,6	7	29,2
Sedenheim, Ldgem.	1	1,19	84	51	33	60,7	—	—	35	41,7	8,2	4	11,4
Ueberlingen	3	3,13	93	89	4	95,7	24	25,8	8	8,6	1,9	1	12,5
Zeudenheim, Ldgem.	2	1,90	103	68	35	66,0	—	—	47	45,6	11,5	4	8,5
Keshl, Stadt u. Dorf	3	2,18	134	112	22	83,6	1	0,7	52	38,8	7,3	13	25,0
Zm Ganzen für diese Gemeinden	503	4,54	10575	8853	1722	83,7	2185	20,7	3734	35,3	6,3	671	17,97
Zm Ganzen f. die übrigen Gemeinden	1101	3,94	26847	17381	9466	64,7	842	3,1	9078	33,8	8,0	649	9,35
Amtsbezirke ohne Stadt gl. N.:													
Mannheim	33	4,47	705	422	283	59,9	—	—	363	51,5	14,0	51	14,05
Karlsruhe	51	5,58	863	543	320	62,9	—	—	388	45,0	11,6	34	8,76
Freiburg	21	3,63	557	394	163	70,7	—	—	140	25,1	5,1	18	12,86
Heidelberg	66	5,27	1187	835	352	70,3	5	0,4	502	42,3	10,8	55	10,96
Pforzheim	53	5,23	961	495	466	51,5	—	—	449	46,7	12,7	56	12,47

*) und **) Siehe die Anmerkung auf Seite 73.

1) einschließl. Käferthal.

Gemeinden mit über 4000 Einwohnern für das Jahr 1897. Nach: Tabelle 1a.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Nach Todesursachen: Gestorbene

	an Malaria	an Scharlach	an Blattern	an Diptheritis	an Krupp	an Keuchhusten	an Influenza	an Kindbettfieber		an Typhus	an Ruhr	an sonstigen Infektionskrankheiten	im Ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 15-26)		gewaltfam*) durch		an Krebs	an Stimmungs- erkrankung und chronische Bronchitis	an Lungen- schwindsucht	im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-33		insbesondere Kinder- betten in den ersten 3 Wochen **)	
								überhaupt	davon in den ersten 3 Wochen				Selbst- mord	Bermü- gung und Ver- brechen	Zahl	% der Ge- storbenen				Zahl	% der Ge- storbenen		
11,8	8	—	—	3	—	3	2	2	—	—	—	2	20	7,14	4	4	12	38	31	109	33,9	2	
4,2	14	—	—	4	7	2	9	1	—	—	—	3	40	7,26	1	9	30	65	55	200	36,3	3	
14,5	—	—	—	9	3	1	—	—	—	—	—	4	20	5,52	4	5	11	42	50	132	36,5	—	
6,1	5	—	—	4	9	3	3	4	—	—	—	5	34	5,23	1	14	18	57	58	182	28,0	7	
7,8	10	—	—	13	1	5	12	4	—	—	—	2	52	5,88	2	10	32	108	94	298	33,7	4	
6,7	1	1	—	1	1	2	8	—	—	—	1	1	3	19	5,43	1	6	16	63	55	160	45,7	2
18,1	53	4	—	24	5	31	6	4	—	—	—	19	149	6,82	33	45	71	220	302	820	37,5	13	
21,5	23	3	—	23	4	26	8	3	—	—	—	23	127	7,96	19	28	114	112	216	616	38,6	5	
30,3	—	1	—	10	1	6	—	1	—	—	—	8	31	2,77	13	23	90	75	172	404	36,1	4	
23,1	—	2	—	23	10	—	1	—	—	—	2	28	68	7,74	14	16	76	102	120	396	45,1	8	
16,3	5	1	—	4	2	26	5	—	—	—	60	9	112	14,89	10	20	27	50	92	311	41,4	1	
16,3	—	—	—	3	1	1	—	1	—	—	—	1	8	2,44	7	7	35	30	46	133	40,5	1	
12,5	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	3	3	9	3,23	8	7	13	16	38	91	32,3	—	
16,7	5	—	—	2	1	2	1	2	—	—	3	18	10,84	2	4	13	19	26	82	49,4	2		
8,8	—	—	—	4	3	—	2	1	—	—	1	13	5,35	5	7	6	15	25	71	29,2	1		
10,4	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	3	7	3,08	2	8	14	19	34	84	37,0	2	
8,8	4	3	—	—	3	—	—	—	—	—	1	12	6,70	3	7	14	12	20	68	38,0	1		
21,8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	12,01	5	6	13	17	18	62	25,1	1		
15,6	9	1	—	15	2	8	—	1	—	—	—	36	15,88	4	2	8	23	27	100	42,7	1		
7,1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1,08	—	5	5	17	24	53	28,5	—	
10,6	12	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	16	7,62	4	3	1	23	29	76	36,2	2	
11,7	1	1	—	—	3	5	3	1	—	—	6	—	20	10,15	1	3	5	35	17	81	41,1	1	
13,3	3	—	—	—	1	3	2	—	—	—	—	1	10	5,38	2	2	5	20	20	59	31,7	1	
14,7	—	—	—	3	2	—	1	—	—	—	—	—	6	4,20	1	2	7	20	15	51	35,7	—	
12,8	20	—	—	—	1	3	—	—	—	—	5	—	29	18,71	—	3	1	13	8	54	34,8	1	
8,9	—	—	—	—	3	—	—	2	—	—	—	5	3,62	—	—	1	12	30	48	34,8	2		
18,5	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	6	5,17	1	2	5	9	17	40	34,5	—	
17,6	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3	6	5,26	1	3	3	10	19	42	36,8	—	
9,4	3	2	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	12	11,43	—	1	11	15	14	53	50,5	—	
8,3	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	5	5,88	—	2	7	10	7	31	36,5	2	
29,2	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	2	7	7,45	2	7	3	7	11	37	39,4	1	
11,4	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	3,57	1	6	3	10	14	37	44,0	—	
12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2,15	1	4	13	1	12	33	35,5	—	
8,5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3,79	2	1	2	8	17	34	33,0	—	
25,0	—	—	—	—	6	2	1	1	—	—	—	2	13	9,70	3	3	5	12	6	42	31,3	—	
17,97	144	18	—	130	46	120	37	19	16	106	2	117	739	6,99	144	227	571	932	1396	4099	37,9	50	
9,35	343	36	—	359	173	277	143	73	66	86	2	144	1636	6,09	185	514	1179	2848	3037	9399	35,0	146	
14,05	22	—	—	7	1	3	—	4	—	—	—	6	43	6,10	14	9	17	53	91	227	32,2	5	
8,76	16	1	—	4	6	10	11	4	3	4	—	6	62	7,18	6	13	22	66	133	302	35,0	6	
12,86	—	2	—	8	1	9	2	—	—	—	—	3	26	4,67	8	13	22	65	58	192	34,5	3	
10,96	22	1	—	20	4	7	6	3	3	3	—	14	80	6,74	18	24	40	154	145	461	38,8	5	
12,47	53	4	—	6	5	19	4	—	—	—	—	1	107	11,13	5	16	12	128	65	333	34,7	6	

Tabelle I b. Medizinische Tabelle der Kreise etc. und des Großherzogthums

Kreise etc. und Großherzogthum.	Todes- geborene		Ge- storbene ohne Todes- geborene	Davon starben											
	Zahl	‰ der Ge- storbenen mit Todesge- borenen		ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich be- handelt in ‰ der Ge- storbe- nen	in Kranken- und Pfllege- und sonstigen Anstalten		im ersten Lebensjahr (ohne Todtgeb.)						
							Zahl	‰ der Ge- storbe- nen	Zahl	‰ der Ge- storbe- nen ohne Todtgeb.	auf 1000 Ein- wohner	Zahl	‰ der im ersten Lebensjahr Gestorbenen		
Kreise:															
Konstanz . . .	105	3,84	2 633	1 860	773	70,6	218	8,3	735	27,9	5,4	93	12,7		
Billingen . . .	50	2,98	1 628	1 150	478	70,6	105	6,4	553	34,0	7,7	50	9,0		
Waldshut . . .	51	3,34	1 476	1 007	469	68,2	97	6,6	296	20,1	3,9	22	7,4		
Freiburg . . .	201	4,35	4 419	3 340	1 079	75,6	617	14,0	1 194	27,0	5,4	188	15,7		
Lörrach . . .	93	5,00	1 768	1 411	357	79,8	186	10,5	418	23,6	4,3	46	10,8		
Offenburg . . .	143	4,07	3 372	2 369	1 003	70,3	166	4,9	1 075	31,9	6,6	106	9,9		
Baden . . .	102	3,17	3 116	1 979	1 137	63,5	227	7,3	1 036	33,2	7,3	90	8,7		
Karlsruhe . . .	353	4,31	7 841	5 412	2 429	69,0	580	7,4	3 232	41,2	9,8	385	11,9		
Mannheim . . .	208	4,59	4 323	3 063	1 260	70,9	385	8,9	1 992	46,1	11,1	309	15,5		
Heidelberg . . .	179	4,54	3 768	2 732	1 036	72,5	392	10,4	1 402	37,2	8,9	162	11,6		
Mosbach . . .	119	3,72	3 078	1 911	1 167	62,1	54	1,8	879	28,6	5,8	69	7,8		
Bezirke der Landeskommissäre:															
Konstanz . . .	206	3,47	5 737	4 017	1 720	70,0	420	7,3	1 584	27,6	5,5	165	10,4		
Freiburg . . .	437	4,37	9 559	7 120	2 439	74,5	969	10,1	2 687	28,1	5,6	340	12,7		
Karlsruhe . . .	455	3,99	10 957	7 391	3 566	67,5	807	7,4	4 268	39,0	9,0	475	11,1		
Mannheim . . .	506	4,33	11 169	7 706	3 463	69,0	831	7,4	4 273	38,3	8,8	540	12,6		
Großherzogthum	1 604	4,11	37 422	26 234	11 188	70,1	3 027	8,1	12 812	34,2	7,3	1 520	11,9		
1896 . . .	1 617	4,42	34 986	24 738	10 248	70,7	2 918	8,3	10 670	30,5	6,2	1 294	12,1		
1895 . . .	1 568	4,01	37 513	25 900	11 613	69,0	2 891	7,7	12 822	34,2	7,4	1 544	12,0		
1894 . . .	1 526	3,71	39 583	28 301	11 282	71,5	3 099	7,8	11 461	29,0	6,7	1 349	11,8		
1893 . . .	1 491	3,47	41 437	28 664	12 773	69,2	2 906	7,0	12 283	29,6	7,4	1 392	11,3		
1892 . . .	1 534	3,93	37 474	25 341	12 133	67,6	2 759	7,4	11 969	31,9	7,1	1 379	11,5		
1891 . . .	1 521	3,78	38 762	25 730	13 032	66,4	2 672	6,9	12 782	33,0	7,7	1 445	11,3		
1890 . . .	1 446	3,65	38 205	25 942	12 263	67,9	2 655	6,9	11 244	29,4	6,8	1 272	11,3		
1889 . . .	1 494	3,78	38 062	25 034	13 028	65,8	2 696	7,1	11 470	30,1	7,0	1 262	11,0		
1888 . . .	1 593	3,92	39 012	25 536	13 476	65,5	2 439	6,3	11 765	30,2	7,2	1 298	11,0		
Durchschnitte:															
1888—1897 . . .	1 539	3,87	38 246	26 142	12 104	68,4	2 806	7,3	11 928	31,2	7,1	1 375	11,5		
1880—1889 . . .	1 627	4,10	38 089	23 867	14 222	62,7	2 096	5,5	12 413	32,6	7,3	1 308	10,5		
1870—1879 . . .	2 006	4,54	42 151	24 968	17 183	59,2	1 589	3,8	15 615	37,0	10,4	1 721	11,0		
1860—1869 . . .	1 816	4,64	37 361	21 791	15 570	58,3	998	2,7	13 967	37,4	10,2	2 615	18,7		
1852—1859 . . .	1 615	4,37	35 312	18 227	17 085	51,6	765	2,2	11 428	32,4	8,6	2 254	19,7		

*) und **) Siehe die Anmerkung auf Seite 78.

für das Jahr 1897 unter Vergleichung mit den Vorjahren.

Tabelle 1b.

		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Nach Todesursachen: Gestorbene																							
an Malaria	an Scharlach	an Blattern	an Diphtheritis	an Krupp	an Keuchhusten	an Influenza	an Kindbettfieber		an Typhus	an Ruhr	an fesslichen Infektionskrankheiten	im Ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 15-26)		gewaltjam*) durch		an Krebs	an Vagen-entzündung und akuter Bronchitis	an Vagen-schwundlicht	im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-33		insbesondere Kinder-bettlerinnen in den ersten 3 Wochen *)		
							überhaupt	davon in den ersten 3 Wochen				Zahl	% der Gestorbenen	Selbstmord	Beruhigung und Verbrechen				Zahl	% der Gestorbenen			
3	1	—	22	8	9	7	6	6	2	—	14	72	2,73	25	69	208	254	292	920	34,9	14		
23	3	—	14	5	60	9	5	5	6	—	5	130	7,99	19	32	60	193	146	580	35,6	12		
4	—	—	14	3	11	6	8	7	3	—	5	54	3,66	11	48	91	117	153	474	32,1	10		
3	9	—	60	20	41	7	6	5	11	—	32	189	4,28	43	96	240	430	561	1559	35,3	24		
9	—	—	12	6	9	7	2	2	6	—	8	59	3,34	22	31	100	176	220	608	33,8	7		
43	13	—	78	27	12	23	13	11	14	1	20	244	7,24	28	82	166	333	361	1214	36,0	16		
66	3	—	35	26	11	6	8	7	20	—	21	196	6,29	16	63	133	287	408	1103	35,4	12		
152	16	—	100	59	151	54	18	16	105	—	55	710	9,05	59	128	305	728	921	2851	36,4	35		
96	5	—	49	18	36	9	10	8	4	—	31	258	5,97	58	77	142	435	576	1546	35,8	24		
50	3	—	71	26	41	18	5	5	11	2	51	278	7,38	35	67	186	454	452	1472	39,1	24		
38	1	—	34	21	16	34	11	10	10	1	19	185	6,01	13	48	119	373	343	1081	35,1	18		
30	4	—	50	16	80	22	19	19	11	—	24	256	4,46	55	149	359	564	591	1974	34,4	36		
55	22	—	150	53	62	37	21	18	31	1	60	492	5,15	93	209	506	939	1142	3381	35,4	47		
218	19	—	135	85	162	60	26	23	125	—	76	906	8,09	75	191	438	1015	1329	3954	36,1	47		
184	9	—	154	65	93	61	26	23	25	3	101	721	6,46	106	192	447	1262	1371	4099	36,7	66		
487	54	—	489	219	397	180	92	82	192	4	261	2375	6,85	329	741	1750	3780	4433	13408	35,8	196		
416	96	—	543	257	264	161	83	76	134	2	279	2235	6,39	336	741	1824	3740	4557	13433	38,4	194		
377	62	—	676	320	209	231	122	123	2	260	2382	6,35	337	709	1719	3682	4571	13400	35,7	250			
685	134	—	1831	675	548	850	117	183	4	320	5347	13,51	337	621	1636	4586	4863	17390	43,9	240			
550	91	—	1911	816	294	850	151	192	—	384	5239	12,64	354	651	1643	4710	4654	17251	41,6	339			
469	92	—	1075	560	376	547	145	167	3	277	3711	9,90	359	554	1504	4161	4504	14793	39,4	298			
631	130	—	961	507	494	53	163	183	4	313	3439	8,87	353	637	1572	4124	4664	14789	38,1	333			
205	178	2	683	423	365	907	134	147	25	274	3343	8,75	275	646	1532	4362	4955	15113	39,5	358			
363	277	2	709	380	452	6	173	217	3	283	2865	7,53	312	628	1480	4572	4715	14572	38,3	360			
973	239	1	537	349	407	3	201	263	6	277	3256	8,35	346	674	1412	4564	4998	15250	39,1	398			
516	135	0,5	941	451	381	379	138	180	5	293	3419	8,94	334	660	1607	4228	4692	14940	39,1	297			
354	387	2	674	478	479	216	216	304	25	305	3224	8,46	317	596	1311	4462	4493	14403	37,8	401			
494	1029	410	509	509	509	509	509	866	92	3400	3400	3400	253	581	4628	8862	8862	8862	8862	8862	454		
338	487	75	463	463	463	463	463	1134	228	2725	2725	2725	183	522	3430	3430	3430	3430	3430	3430	388		
330	441	28	572	554	554	554	554	1658	1207	4790	4790	4790	148	435	5373	5373	5373	5373	5373	5373	320		

Tabelle 2 a.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Im Durchschnitt der Jahre 1888 bis 1897.	1897					Nr. des Systems.	Todesursachen.	Im Durchschnitt der Jahre 1888 bis 1897.	1897																		
			im Ganzen.								im Ganzen.																		
			männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	im 1. Semester.	im 2. Semester.				männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	im 1. Semester.	im 2. Semester.														
I. Infektionskrankheiten.												31n	Folgen der Operation.	7	4	1	3	4											
1	Masern	516	487	230	257	389	181	31o	Hinrichtung	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
2	Scharlach	135	54	30	24	48	3	Summe V 942 1036 849 186 362 20																					
3a	Boden (Blattern)	0,5	—	—	—	—	—	VI. Störungen der Entwicklung u. Ernährung.																					
3b	Varicellen	2	2	—	—	1	2	32	Lebensschwäche d. Neugebor.	1814	1882	1054	828	389	1888	—	—	—	—	—									
4	Rose	79	49	34	15	47	26	33	Bildungsfehler	24	36	18	18	25	34	—	—	—	—	—									
5a	Rachenbräune, Diphtheritis	941	489	235	254	475	52	34	Zahnen	40	35	16	19	15	21	—	—	—	—	—									
5b	Diphtherie anderer Organe	15	8	6	2	8	—	35	Englische Krankheit	139	188	107	81	137	89	—	—	—	—	—									
6	Krupp	451	219	115	104	208	36	36	Abzehrung der Kinder	998	1174	654	520	630	1067	—	—	—	—	—									
7	Keuchhusten	381	397	179	218	291	251	37	Drüsenabzehrung	156	159	74	85	127	90	—	—	—	—	—									
8	Grippe (Influenza)	379	180	80	100	163	17	38	Erichöpfung (Berf. unter 60 J.)	96	60	26	34	29	—	—	—	—	—	—									
9a	Eitervergiftung	85	90	59	31	87	9	39	Altersschwäche (Berf. ab 60 J.)	3315	3106	1354	1752	1310	—	—	—	—	—	—									
9b	Hospitalbrand	0,2	—	—	—	—	—	40	Brand der Alten	31	34	19	15	34	—	—	—	—	—	—									
10	Kindbettfieber	138	92	—	92	92	—	41a	Brandgeschwür	4	3	1	2	3	—	—	—	—	—	—									
11	Karbunkel	5	7	5	2	7	2	41b	Druckbrand	4	4	3	1	4	—	—	—	—	—	—									
12	Abdominaltyphus	180	192	98	94	192	—	41c	Wasserkrebs	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
13	Pfeckfieber	0,4	—	—	—	—	—	41d	Anderer Arten von Brand	7	4	2	2	4	—	—	—	—	—	—									
14	Rückfallfieber	0,4	—	—	—	—	—	42	Krebs und Geschwülste	1607	1750	765	985	1681	—	—	—	—	—	—									
15	Ruhr	5	4	4	—	4	—	43	Kropf	11	11	3	8	10	—	—	—	—	—	—									
16	Epidemische Cholera	0,3	—	—	—	—	—	44a	Storbt	5	6	2	4	6	—	—	—	—	—	—									
17	Mumps	0,7	1	—	1	1	—	44b	Blutleckenkrankheit	12	5	3	2	5	—	—	—	—	—	—									
18	Epidemische Genickstarre	15	25	18	7	25	—	44c	Bluterkrankheit	4	6	5	1	6	—	—	—	—	—	—									
19	Wechselfieber	3	2	—	2	1	—	45	Blutmangel	46	35	14	21	33	—	—	—	—	—	—									
20	Mutter Gelenksrheumatismus	47	23	14	9	23	—	46	Weißblütigkeit	25	34	14	20	33	—	—	—	—	—	—									
21	Syphilis	34	51	28	23	50	39	47	Wassersucht	417	403	131	272	259	—	—	—	—	—	—									
22	Sonst. Infektionskrankheiten	5	3	3	—	2	3	48	Zuckerkrankheit	64	83	46	37	79	—	—	—	—	—	—									
Summe I		3419	2375	1140	1235	2114	621	49	Gicht	35	36	8	28	19	—	—	—	—	—	—									
II. Zoonosen.												50	Bronzekrankheit	4	3	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23a	Hundswuth	0,1	1	1	—	1	—	51	Sonstige Störungen d. Entwicklung und Ernährung	13	11	4	7	9	—	—	—	—	—	—									
23b	Milzbrand	0,3	2	2	—	2	—	Summe VI 3872 9068 4324 4744 4850 3100																					
23c	Rothkrankheit	0,1	—	—	—	—	—	VII. Krankh. d. Werkzeuge.																					
Summe II		0,5	3	3	—	3	—	A. Krankheiten der Haut und Muskeln.																					
III. Vergiftungen*).												52	Blutschwärtzucht	12	14	8	6	14	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Thierische u. pflanzl. Gifte	8	11	5	6	7	1	53	Zellgewebeerkrankung	33	34	21	13	33	10	—	—	—	—	—									
25a	Acute Art der mineral. Gifte	11	10	6	4	8	—	54	Zellgewebeerhärtung der Neugeborenen	3	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—									
25b	Chronische Art derselben	1	3	2	1	3	—	55	Nabelentzündung	7	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—									
26	Giftige Gase	3	9	7	2	4	—	56	Sonst. Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	21	27	15	12	22	14	—	—	—	—	—									
27	Trunksucht	43	42	35	7	34	—	57	Progressive Muskelentartung	2	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—									
Summe III		66	75	55	20	56	1	Zusammen A 78 81 49 32 74 40																					
IV. Parasiten.												B. Krankheiten der Knochen und Gelenke.																	
28	Wurmkrankheiten	2	2	1	1	2	—	58	Knochen u. Gelenkentzündg.	225	190	85	105	178	—	—	—	—	—	—									
29	Schwämmchen	15	18	9	9	11	18	59	Knochenweichung	9	4	1	3	3	—	—	—	—	—	—									
30a	Trichinose	1	—	—	—	—	—	Zusammen B 234 194 86 108 181																					
30b	Astinomyose	1	1	—	1	1	—	C. Krankheiten des Gefäßsystems.																					
Summe IV		18	21	10	11	14	18	60a	Herzbeutelentzündung	42	25	11	14	25	—	—	—	—	—	—									
V. Tod durch äußere Einwirkungen, gewalts. Tod*).												60b	Wassersucht des Herzbeutels	13	9	5	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31a	Verbrennung u. Verbrühung	63	79	37	42	68	2	61	Herzvergrößerung	111	90	40	56	86	—	—	—	—	—	—									
31b	Erfrierung	9	8	7	1	—	—	62	Herzfehler	1119	1265	508	757	1212	21	—	—	—	—	—									
31c	Ertrinken	189	197	160	36	3	2	63	Verreißung des Herzens	4	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—									
31d	Erhängen	184	178	163	15	2	—	64	Verzähmung	641	814	392	422	591	34	—	—	—	—	—									
31e	Ersticken	33	31	19	12	4	13	65	Arterienkrankheiten	103	109	54	55	109	1	—	—	—	—	—									
31f	Blutschlag	4	2	1	1	1	—	66	Venenkrankheiten	18	19	7	12	19	—	—	—	—	—	—									
31g	Blutschlag	7	11	6	5	1	—	Zusammen C 2051 2335 1021 1314 2053 59																					
31h	Explosion	2	—	—	—	—	—	Summe I																					
31i	Ueberfahren	102	128	109	19	55	—	Summe II																					
31k	Sturz und Schlag	243	300	254	46	188	—	Summe III																					
31l	Schusswunden	63	69	65	4	21	—	Summe IV																					
31m	Stich-, Schnitt-, Biß- und andere Wunden	35	29	27	2	15	1	Summe V																					

*) Siehe die Anmerkung auf Seite 78.

1) berichtigte Zahl.

2) darunter 1 Person unbekanntes Geschlechts.

Fälle im Jahr 1897.
Ärzte bezw. Leichenschauer.

Tabelle 2a.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	1897					Nr. des Systems.	Todesursachen.	1897						
		im Ganzen.	dabon						im Ganzen.	dabon					
			männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	im 1. Ber. verblieben.				männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	im 1. Ber. verblieben.		
D. Krankheiten des Nervensystems u. d. Sinneswerkzeuge.															
67	Hirnhautentzündung	491	457	234	223	447	131	112	Brechdurchfall	1370	1844	976	868	1196	1662
68	Infer. Hirnhautentzündung	456	498	256	242	495	128	113	Magen- u. Darmentzündung	64	66	32	34	59	—
69	Gehirnhöhlewasserucht	48	51	28	23	47	21	114	Darmkrampf	12	10	4	6	7	4
70a	Gehirnentzündung	95	92	49	43	86	13	115	Unterleibschwinducht	89	90	51	39	86	14
70b	Gehirnerweichung	79	91	52	39	86	—	116	Gefäßschwinducht	16	8	1	7	8	—
71	Gehirnschlag	1194	1255	624	631	903	18	117	Sonst. Unterleibskrankheiten	14	11	7	4	9	1
72	Gehirnlähmung u. Nervenschl.	61	67	35	32	57	3	118	Krankheiten der Milz	3	3	1	2	3	—
73	Geisteskrankheit	103	105	59	46	90	—	119	Gallensteine	21	30	2	28	28	—
74	Rückenmarksentzündung	55	59	32	27	53	5	120	Gelbsucht	50	36	17	19	20	16
75	Rückenmarkschwinducht	58	61	41	20	54	1	121	Leberentzündung	27	21	12	9	20	—
76	Rückenmarkslähmung	45	46	19	27	40	2	122	Akute Leberatrophie	6	9	4	5	9	—
77a	Eklampsie der Kinder	3618	3354	1905	1449	438	3136	123	Chronische Leberatrophie	165	198	125	73	194	1
77b	" der Schwangern	5	4	—	4	3	—	Zusammen F.							
77c	" der Gebärenden und Wöchnerinnen	11	13	—	13	12	—	4600	5347	2808	2539	3999	3750	—	
78	Fallsucht	63	67	38	31	52	—	G. Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge.							
79	Starrkrampf	48	44	30	14	34	19	124	Entzündung und Lähmung der Harnwege	84	79	70	9	76	—
80	Sonstige Krämpfe	42	41	18	23	29	10	125	Sonst. Leiden der Harnwege	13	10	8	2	8	1
81	Dyrenkrankheiten	6	4	2	2	3	—	126	Harnvergiftung	18	27	19	8	27	—
82	Augenkrankheiten	2	—	—	—	—	—	127	Steinkrankheit	4	1	1	—	1	—
Zusammen D.		6480	6309	3420	2889	2929	3487	128	Nierenentzündung	500	574	297	277	567	9
E. Krankheiten d. Athmungs- werkzeuge.								129	Nierenvereiterung	15	18	6	7	13	—
83	Kehlkopentzündung	58	47	25	22	43	21	Zusammen G.							
84	Kehlkoperverengung	23	11	6	5	10	7	634	704	401	303	692	10	—	
85	Kehlkopfschwinducht	34	35	28	7	31	—	H. Krankheiten der weiblichen Geschlechtswerkzeuge.							
86	Akute Bronchitis	966	777	405	372	647	470	130a	Bauchschwangerschaft	2	2	—	2	2	—
87	Chron. Bronchialkatarrh	651	551	265	286	472	54	130b	Andere Schwangerschafts- krankheiten	0	—	—	—	—	—
88a	Krupöse Lungenentzündung	1944	1513	747	766	1460	234	131	Fehlgeburt	4	—	—	—	—	—
88b	Katarhal. "	1318	1490	738	752	1415	655	132	Gebärmutterriß	6	5	—	5	5	—
89	Lungenschwinducht	4692	4433	2219	2214	3923	110	133	Folgen der Entbindung	73	73	—	73	63	—
90	Lungenblutsturz	64	61	34	27	44	—	134	Gebärmutterblutung*)	9	6	—	6	5	—
91	Lungenemphysem	466	423	239	185	402	—	135	Gebärmutterentzündung*)	13	13	—	13	13	—
92	Lungenbrand	25	27	18	9	24	—	136	Eierstockkrankheiten	15	18	—	18	18	—
93	Lungenlähmung	206	186	86	100	135	35	Zusammen H.							
94	Brustfellentzündung	180	177	107	70	173	17	123	117	—	117	106	—	—	
95	Brustwasserucht	25	12	4	8	8	—	VIII. Unbestimmte u. nicht angegebene Krankheiten.							
96	Luftaustritt in d. Brusthöhle	5	3	1	2	3	—	72	11	3	7	5	3	—	
Zusammen E.		10657	9746	4921	4825	8796	1603	Zusammenstellung.							
F. Krankheiten der Verdauungs- werkzeuge.								I.	Infektionskrankheiten	3419	2375	1140	1235	2114	621
97	Krankheiten der Zunge	1	1	—	1	1	—	II.	Poisonen	0	3	—	—	3	—
98a	Krankheit d. Ohrspeicheldrüse	2	3	2	1	2	1	III.	Bergiftungen	66	75	55	20	56	1
98b	Salzentzündung	11	14	9	5	12	3	IV.	Parasiten	18	21	10	11	14	18
99	Krankheiten der Speiseröhre	7	9	6	3	8	—	V.	Tod durch äußere Einwirkungen, gewalttätiger Tod	942	1036	849	186	362	20
100a	Unterleibsentzündung	301	292	130	162	287	16	VI.	Störungen der Entwicklung und Ernährung	8872	9068	4324	4744	4850	3193
100b	Typhus	49	64	36	28	63	—	VII.	Krankheiten der Werkzeuge dabon	24837	24833	1276	1107	4830	8954
101	Bauchwasserucht	63	47	18	29	44	—	A.	der Haut und Muskeln	78	81	40	32	74	40
102	Brüche	77	74	36	38	71	5	B.	der Knochen und Gelenke	234	194	86	108	181	5
103	Darmerichluß	114	116	52	64	115	7	C.	des Gefäßsystems	2051	2335	1021	1314	2053	59
104	Magenkatarrh	54	49	24	25	41	—	D.	des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	6480	6309	3420	2889	2929	3487
105	Magengeschwüre	91	82	46	36	77	—	E.	der Athmungswerkzeuge	10657	9746	4921	4825	8796	1603
106	Magenverengung	40	32	15	23	—	—	F.	der Verdauungswerkzeuge	4600	5347	2808	2539	3999	3750
107	Bluterbrechen	21	26	18	8	23	1	G.	d. Harn- u. Geschlechtswerkz.	634	704	401	303	692	10
108	Darmblutung	12	13	4	9	12	2	H.	d. weib. Geschlechtswerkzeuge	123	117	—	117	106	—
109	Darmzerreißung	15	13	7	6	12	2	VIII. Unbestimmte und nicht angegebene Krankheiten.							
110	Durchfall	57	54	32	22	51	—	72	11	3	7	5	3	—	
111	Kinderdurchfall	1848	2132	1141	991	1518	2015	Zusammen							
								38246	37422	19990	18339	26234	42942	—	
								Außerdem Todtgeborene							
								1539	1604	922	682	—	—	—	

*) außerhalb der Geburt und des Wochenbettes. 1) darunter 1 Person unbefangenen Geschlechts. 2) desgl. 2 Personen.

Tabelle 2 b.

Todesursachen der Todesfälle

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Im Durchschnitt der Jahre 1888—1897												davon				
		1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	in Ganzen.	männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	im 1. Jahre.	
I. Infektionskrankheiten.																		
1	Malaria	973	363	205	631	469	550	685	377	416	487	516	254	262	422	94	174	
2	Scharlach	239	277	178	130	92	91	134	62	96	54	135	70	65	123	12	11	
3a	Epid. (Blattern)	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	0,5	—		
3b	Varicellen	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1		
4	Rose	91	82	69	97	84	102	104	55	61	49	79	43	36	77	2		
5a	Rachenbräune, Diphtheritis	537	709	683	961	1075	1911	1831	676	543	489	941	467	474	888	55		
5b	Diphtherie anderer Organe	—	6	20	33	15	42	14	9	8	8	15	8	7	14	1		
6	Krupp	349	380	423	507	560	816	675	320	257	219	451	241	210	413	38		
7	Keuchhusten	407	452	365	494	376	294	548	209	264	397	381	175	206	265	116		
8	Grippe (Influenza)	3	6	907	53	547	850	850	231	161	180	379	173	206	327	52		
9a	Eitervergiftung	69	77	75	85	74	108	84	91	95	90	85	49	36	83	2		
9b	Hospitalbrand	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—		
10	Kindbettfieber	201	173	134	163	145	151	117	122	83	92	138	—	188	136	2		
11	Rarbumfel	4	2	7	7	3	6	3	6	6	7	5	3	2	5	—		
12	Abdominaltyphus	263	217	147	183	167	192	188	123	134	192	180	89	91	179	1		
13	Typhus	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	0,4	0,2	0,2	0,4	0,1		
14	Typhus	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1		
15	Ruhr	6	3	25	4	3	—	4	2	2	4	5	3	2	5	1		
16	Epidemische Cholera	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	0,3	0,2	0,1	0,3	—		
17	Mumps	1	2	—	1	1	—	—	1	—	1	0,7	0,1	0,6	0,6	0,1		
18	Epidemische Genickstarre	13	10	12	5	15	28	19	20	6	25	15	9	6	15	—		
19	Wechselfieber	3	4	2	4	2	3	4	2	5	2	3	2	1	3	—		
20	Acuter Gelenkrheumatismus	66	63	51	31	38	60	60	30	51	23	47	25	22	44	3		
21	Syphilis	23	30	31	36	33	30	24	37	40	51	34	19	15	32	2		
22	Sonst. Infektionskrankheiten	4	5	5	9	9	2	5	4	4	3	5	3	2	4	1		
Summe I		3256	2865	3343	3439	3711	5239	5347	2382	2235	2375	3419	1635	1784	3036	383	649	
II. Zoonosen.																		
23a	Hundswuth	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,1	0,1	—	—		
23b	Milchbrand	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	0,3	0,2	0,1	0,3		
23c	Rothkrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—		
Summe II		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	0,5	0,4	0,1	0,5		
III. Vergiftungen.																		
24	Thierische u. pflanzl. Gifte	8	3	5	13	3	9	9	11	8	11	8	6	2	6	2		
25a	Acute Art der mineral. Gifte	9	10	5	3	10	22	12	15	13	10	11	6	5	7	4		
25b	Chronische Art derselben	1	1	—	3	2	1	2	1	1	3	1	1	—	1	—		
26	Giftige Gase	2	—	2	1	1	2	3	8	1	9	3	2	1	1	2		
27	Trunksucht	35	43	52	43	35	47	54	30	45	42	43	37	6	33	5		
Summe III		55	57	64	63	51	81	80	65	68	75	66	52	14	53	13		
IV. Parasiten.																		
28	Wurmkrankheiten	1	1	3	3	3	3	—	3	1	2	2	1	1	2	—		
29	Schwämmchen	6	17	15	8	18	17	14	13	18	18	15	7	8	8	7		
30a	Trichinose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
30b	Astinomyose	2	1	1	3	—	1	—	2	3	1	1	0,4	1	1	—		
Summe IV		9	19	19	14	21	21	14	18	22	21	18	8	10	11	7		
V. Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltf. Tod*																		
31a	Verbrennung u. Verbrühung	43	50	65	62	52	64	59	77	82	79	63	34	29	48	15		
31b	Erfrierung	14	6	10	8	5	10	4	15	8	8	9	8	1	1	8		
31c	Ertrinken	198	194	184	190	195	182	169	174	211	197	189	143	46	6	183		
31d	Erhängen	206	172	151	202	187	184	188	186	188	178	184	160	24	5	179		
31e	Ersticken	25	18	28	39	34	31	23	55	41	31	33	22	11	5	28		
31f	Hitzschlag	—	2	2	9	12	2	8	2	2	2	4	3	1	2	2		
31g	Blitzschlag	—	2	8	3	2	10	8	5	12	11	7	5	2	0,5	7		
31h	Explosion	3	3	2	2	—	1	3	1	2	—	2	2	—	1	1		
31i	Uebersahren	108	68	97	92	86	100	108	111	119	128	102	88	14	40	62		
31k	Sturz und Schlag	252	223	238	211	185	248	221	271	282	300	243	206	37	142	101		
31l	Schusswunden	57	69	42	63	52	75	64	68	70	69	63	59	4	11	52		
31m	Stich-, Schnitt-, Biß- und andere Wunden	38	36	28	40	37	43	27	33	31	29	35	31	4	18	17		

*) Siehe die Anmerkung auf Seite 79. 1) berichtigte Zahlen.

in
Nr. des Systems
31n
31o
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41a
41b
41c
41d
42
43
44a
44b
44c
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60a
60b
61
62
63
64
65
66

in den Jahren 1888—1897.

Tabelle 2 b.

Nr. des Systems	Todesursachen.	1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897										Zm Durchschnitt der Jahre 1888—1897					
												im Ganzen.	davon				
													männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	im Lebensjahr.
31n	Folgen der Operation	8	10	12	13	6	6	8	1	5	4	7	3	4	6	1	1
31o	Hinrichtung	1	1	—	1	1	1	—	—	1	—	0,8	0,6	—	—	0,6	—
	Summe V	955	860	862	934	862	955	887	1011	1053	1036	942	765	177	286	656	28
	VI. Störungen der Entwicklung u. Ernährung.																
32	Lebensschwäche d. Neugebor.	1819	1603	1608	1839	1859	1951	1780	1925	1870	1882	1814	1054	760	849	1465	1814
33	Bildungsfehler	18	18	23	32	16	29	26	25	22	36	24	14	10	20	4	24
34	Fahren	73	31	56	46	24	37	38	30	32	35	40	21	19	16	24	27
35	Englische Krankheit	123	108	147	155	134	119	126	164	128	188	139	76	63	95	44	52
36	Abzehrung der Kinder	1003	939	923	1012	1019	1000	964	1005	946	1174	998	544	454	455	543	893
37	Drüsenabzehrung	192	163	166	152	126	133	151	166	149	159	156	84	72	109	47	70
38	Erschöpfung (Pers. unter 60 J.)	132	106	126	97	95	96	99	70	77	60	96	38	58	40	56	—
39	Alterschwäche Pers. ab 60 J.	3631	3512	3569	3311	3162	3512	3230	3132	2986	3106	3315	1460	1855	1241	2074	—
40	Brand der Alten	27	21	36	38	29	38	27	29	27	34	31	18	13	30	1	—
41a	Brandgeschwür	2	2	3	5	4	5	6	6	3	4	4	2	2	4	—	0,6
41b	Druckbrand	6	4	4	2	3	2	1	9	2	4	4	2	2	4	—	0,1
41c	Wasserkrebs	3	—	2	2	1	1	1	3	—	—	1	0,5	0,5	1	—	0,3
41d	Andere Arten von Brand	15	5	8	—	5	7	9	8	6	4	7	4	3	7	—	—
42	Krebs und Geschwülste	1412	1480	1532	1572	1504	1643	1636	1719	1824	1750	1607	708	899	1545	62	1
43	Kropf	11	9	6	9	7	20	15	18	8	11	11	3	8	11	—	0,5
44a	Storbut	6	5	10	4	5	3	4	3	5	6	5	3	2	5	—	0,5
44b	Blutstelenkrankheit	15	7	9	17	14	15	13	14	7	5	12	7	5	11	1	1
44c	Bluterkrankheit	3	2	4	6	1	3	3	4	6	6	4	3	1	4	—	1
45	Blutmangel	65	59	53	41	51	39	38	39	37	35	46	16	30	35	11	8
46	Weißblütigkeit	28	24	22	20	33	23	23	14	27	34	25	12	13	24	1	0,1
47	Wassersucht	420	410	499	426	418	394	366	437	395	403	417	132	285	252	165	—
48	Zuckerkrankheit	44	51	45	73	55	83	64	71	75	83	64	40	24	63	1	0,2
49	Gicht	37	36	36	38	33	37	38	27	33	36	35	10	25	19	16	—
50	Bronchekrankheit	1	3	3	6	4	6	6	2	5	3	4	2	2	4	—	—
51	Sonstige Störungen d. Entwicklung und Ernährung	12	22	11	8	11	18	18	10	9	11	13	6	7	9	4	5
	Summe VI	9098	8620	8901	8911	8613	9214	8682	8928	8685	9068	8872	4259	4613	4353	4519	2899
	III. Krankheit d. Werkzeuge.																
	A. Krankheiten der Haut und Muskeln.																
52	Blutschwärzucht	12	10	6	5	12	16	21	10	13	14	12	6	6	11	1	9
53	Zellgewebeentzündung	26	30	20	29	48	35	45	43	24	34	33	19	14	32	1	11
54	Zellgewebeverhärtung der Neugeborenen	2	3	4	4	6	2	3	—	4	2	3	1	2	2	1	3
55	Nabelentzündung	5	4	4	3	10	11	6	11	9	2	7	4	3	6	1	7
56	Sonst. Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	16	14	13	21	10	22	29	24	32	27	21	10	11	15	6	11
57	Progressive Muskelentartung	3	4	5	3	—	1	2	2	1	2	2	2	—	2	—	0,2
	Zusammen A.	64	65	52	65	86	87	106	90	83	81	78	42	36	68	10	41
	B. Krankheiten der Knochen und Gelenke.																
58	Knochen- u. Gelenkentzündung	222	241	258	247	208	246	235	203	200	190	225	111	114	203	22	8
59	Knochenverweichung	7	14	7	10	7	12	4	12	13	4	9	3	6	7	2	0,7
	Zusammen B.	229	255	265	257	215	258	239	215	213	194	234	114	120	210	24	9
	C. Krankheiten des Gefäßsystems.																
60a	Herzbeutelentzündung	55	41	42	50	33	50	34	44	43	25	42	22	20	41	1	—
60b	Wassersucht des Herzbeutels	17	23	13	11	13	16	8	14	5	9	13	6	7	11	2	0,1
61	Herzvergrößerung	132	118	89	114	99	104	122	126	117	90	111	52	59	107	4	0,4
62	Herzfehler	1058	1038	988	988	1023	1136	1225	1207	1261	1265	1119	432	637	1080	39	10
63	Erreißung des Herzens	8	3	4	10	6	2	3	3	2	4	4	2	2	4	—	0,2
64	Herzlähmung	471	507	534	565	589	709	668	748	806	814	641	320	321	447	194	24
65	Arterienkrankheiten	100	87	93	111	114	113	85	112	109	109	103	54	49	101	2	1
66	Venenkrankheiten	20	19	16	24	18	17	16	12	16	19	18	6	12	17	1	1
	Zusammen C.	1861	1836	1779	1873	1895	2147	2161	2266	2359	2335	2051	894	1157	1808	243	37

Nach: Tabelle 2b.

Nach: Todesursachen der Todesfälle

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Im Durchschnitt der Jahre 1888—1897										davon					
		1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	im Ganzen.	männlich.	weiblich.	kräftig behandelb.	nicht kräftig behandelb.	im 1. Lebensjahre.
D. Krankheiten des Nervensystems u. d. Sinneswerkzeuge																	
67	Hirnhautentzündung	554	519	516	471	460	522	550	461	404	457	491	262	229	177	14	115
68	Tuberkl. Hirnhautentzündung	486	441	464	480	399	453	469	439	427	498	456	237	219	150	6	101
69	Gehirnhöhlenwasserjucht	60	58	46	55	41	47	46	30	44	51	48	27	21	42	6	21
70a	Gehirnentzündung	113	100	97	105	81	105	82	102	76	92	95	54	41	89	6	12
70b	Gehirnerweichung	77	85	87	85	83	83	60	70	71	91	79	49	30	74	5	19
71	Gehirnschlag	1146	1188	1167	1207	1149	1241	1118	1243	1220	1255	1194	595	599	839	355	19
72	Gehirnlähmung u. Nervenschl.	62	59	59	57	63	56	56	70	64	67	61	31	30	52	9	3
73	Geisteskrankheit	97	105	116	116	108	88	88	108	102	105	103	56	47	88	15	1
74	Rückenmarksentzündung	62	48	49	59	56	55	68	39	51	59	55	27	28	50	5	0,1
75	Rückenmarkschwindsucht	56	70	68	65	56	42	47	60	51	61	58	33	25	50	8	0,1
76	Rückenmarkslähmung	46	37	47	43	35	40	49	49	54	46	45	22	23	40	5	1
77a	Eklampsie der Kinder	4115	3995	3865	4146	3541	3538	3218	3492	2915	3354	3618	2039	1579	416	3202	3366
77b	" der Schwangeren	3	4	9	2	8	5	5	7	7	4	5	—	5	5	—	—
77c	" der Gebärenden und Wöchnerinnen	11	10	16	8	8	12	10	11	12	13	11	—	11	11	—	—
78	Fallsucht	48	79	64	59	52	68	61	79	52	67	63	34	29	43	20	0,6
79	Startrampf	56	48	62	56	34	51	48	40	44	44	48	32	16	40	8	1,5
80	Sonstige Krämpfe	56	54	33	69	27	39	44	25	36	41	42	19	23	20	22	7
81	Dhrentkrankheiten	6	11	4	4	4	6	6	6	5	4	6	4	2	5	1	1
82	Augenkrankheiten	7	2	2	—	2	1	—	1	5	—	2	1	1	1	1	0,5
Zusammen D.		7061	6913	6771	7087	6207	6452	6025	6332	5640	6309	6480	3522	2958	2792	3688	3666
E. Krankheiten d. Athmungsorgane																	
83	Kehlkopffentzündung	62	54	60	48	66	71	66	64	43	47	58	32	26	50	8	20
84	Kehlkopferengung	15	16	22	33	25	27	37	23	18	11	23	13	10	19	4	10
85	Kehlkopfschwindsucht	50	35	39	39	22	28	34	25	32	35	34	22	12	30	4	—
86	Akute Bronchitis	1071	1043	998	1032	1017	1075	1021	863	766	777	966	483	483	768	198	541
87	Chron. Bronchialkatarrh	740	705	698	650	603	771	632	567	601	551	651	321	330	542	109	46
88a	Krupöse Lungentzündung	2258	2243	2060	1854	1887	2288	1971	1686	1674	1513	1944	962	982	1863	81	215
88b	Katarrhal.	1235	1236	1304	1238	1257	1347	1594	1133	1300	1490	1318	658	660	1216	102	538
89	Lungenschwindsucht	4998	4715	4955	4664	4504	4654	4863	4571	4557	4433	4692	2337	2355	4121	571	88
90	Lungenblutsturz	67	64	62	50	67	66	65	75	64	61	64	38	26	45	19	—
91	Lungenemphysem	569	483	543	451	458	473	419	406	439	423	466	257	209	434	32	—
92	Lungenbrand	26	17	25	20	23	26	32	31	26	27	25	18	7	25	—	—
93	Lungenlähmung	195	216	230	220	186	236	207	198	183	186	206	102	104	149	57	28
94	Brustfellentzündung	202	216	184	187	164	164	164	170	172	177	180	107	73	174	6	10
95	Brustwasserjucht	39	52	33	27	27	18	22	13	8	12	25	11	14	17	8	—
96	Luftaustritt in d. Brusthöhle	6	8	6	3	5	6	4	3	3	3	5	4	1	4	1	0,2
Zusammen E.		11533	11153	11219	10516	10311	11247	11131	9828	9886	9746	10657	5365	5292	9457	1200	1496
F. Krankheiten der Verdauungsorgane																	
97	Krankheiten der Zunge	1	2	2	4	—	2	1	1	—	1	1	0,7	0,3	1	—	—
98a	Krankheit d. Ohrspeicheldrüse	3	—	6	1	3	3	1	2	1	3	2	1	1	2	—	0,6
98b	Halssentzündung	10	17	12	7	4	15	10	7	18	14	11	6	15	9	2	—
99	Krankheiten der Speiseröhre	11	9	3	8	7	6	4	5	7	9	7	5	2	6	1	0,1
100a	Unterleibsentzündung	295	337	299	353	316	298	293	276	253	292	301	128	173	290	11	13
100b	Typhlitis	33	38	34	35	48	65	54	63	58	64	49	28	21	49	—	0,3
101	Bauchwasserjucht	83	103	74	78	52	44	49	54	46	47	63	20	43	51	12	—
102	Brüche	71	87	90	65	75	71	81	85	69	74	77	33	44	72	5	—
103	Darmverschluss	107	127	103	105	111	120	110	127	112	116	114	57	57	110	4	—
104	Magenkatarrh	65	66	61	58	48	54	57	44	34	49	54	27	27	41	13	—
105	Magengeschwüre	94	78	85	102	92	90	98	115	75	82	91	49	42	84	7	—
106	Magenverengung	62	52	25	33	34	41	39	51	34	32	40	23	17	28	12	—
107	Bluterbrechen	22	30	15	20	13	23	16	16	26	26	21	12	9	18	3	—
108	Darmlähmung	15	9	6	17	13	8	13	17	7	13	12	6	6	11	1	—
109	Darmzerreißung	15	14	17	17	10	17	12	14	19	13	15	9	6	15	—	0,1
110	Durchfall	58	79	68	48	62	43	47	60	56	54	57	28	29	49	8	—
111	Kinderdurchfall	1496	1668	1702	1858	1941	2222	1685	2207	1569	2132	1848	997	851	1207	641	1751

in den Jahren 1888—1897.

Nach: Tabelle 2b.

Nr. des Systems.	Todesursachen.										Zum Durchschnitt der Jahre 1888—1897						
	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	im Ganzen.	dabon					
												männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.	
112	Brechdurchfall	1095	1294	1084	1505	1870	1847	1058	1988	1108	1844	1370	739	631	854	516	1236
113	Magen- u. Darmentzündung	65	78	58	53	77	70	59	60	55	66	64	30	34	60	4	—
114	Darntkrampf	13	3	10	22	9	13	18	11	15	10	12	7	5	8	4	2
115	Unterleibschwinducht	100	103	122	99	72	74	70	88	73	90	89	46	43	82	7	13
116	Betröschwinducht	22	21	20	21	12	23	15	10	7	8	16	8	8	14	—	7
117	Sonst. Unterleibsfrankheiten	16	10	16	20	18	13	10	10	15	11	14	6	8	12	—	0,7
118	Krankheiten der Milz	3	8	2	3	5	3	1	3	2	3	3	2	1	3	—	0,2
119	Gallensteine	14	16	11	15	21	23	22	28	30	30	21	4	17	21	—	—
120	Gelbsucht	59	64	48	43	61	53	46	54	34	36	50	28	22	34	16	20
121	Leberentzündung	38	44	22	25	18	27	31	25	17	21	27	11	16	26	1	0,4
122	Acute Leberatrophie	6	5	6	10	8	3	5	3	9	9	6	3	3	6	—	—
123	Chronische Leberatrophie	149	159	162	142	141	155	187	165	188	198	165	102	63	160	5	0,7
	Zusammen F.	4021	4521	4163	4767	4641	4926	4092	5589	3937	5347	4600	2416	2184	3323	1277	3060
	G. Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge.																
124	Entzündung und Lähmung der Harnwege	84	86	75	84	76	72	99	100	84	79	84	75	9	80	4	—
125	Sonst. Leiden der Harnwege	19	13	15	18	15	12	15	3	10	10	13	12	1	12	1	0,3
126	Harnvergiftung	16	19	14	14	17	11	15	19	26	27	18	13	5	18	—	0,1
127	Steinkrankheit	3	3	3	6	4	3	5	6	2	1	4	2	2	4	—	—
128	Nierentzündung	444	547	428	463	477	521	520	489	543	574	500	265	235	491	9	8
129	Nierenvereiterung	15	21	16	14	16	9	13	15	20	13	15	8	7	15	—	0,2
	Zusammen G.	581	689	551	599	605	628	667	632	685	704	634	375	259	620	14	9
	H. Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane.																
130a	Bauchschwangerschaft	2	2	—	1	3	3	3	1	2	2	2	—	2	2	—	—
130b	Andere Schwangerschaftskrankheiten	2	—	—	1	3	1	1	—	—	—	0,9	—	0,9	0,9	—	—
131	Fehlgeburt	4	4	1	5	2	4	9	6	2	—	4	—	4	4	—	—
132	Gebärmutterriß	5	4	6	5	7	6	7	8	6	5	6	—	6	6	—	—
133	Folgen der Entbindung	66	71	75	75	89	87	65	77	56	73	73	—	6	6	—	—
134	Gebärmutterblutung*)	11	14	2	9	13	7	3	14	11	6	9	—	9	8	1	—
135	Gebärmutterentzündung*)	14	11	10	13	14	9	14	13	20	13	13	—	13	12	1	—
136	Eierstockkrankheiten	13	14	8	22	19	15	14	10	15	18	15	—	15	15	—	—
	Zusammen H.	117	120	102	131	150	132	116	130	112	117	123	—	123	110	13	—
137	VIII. Unbestimmte u. nicht angegebene Krankheiten.	172	89	113	106	106	50	36	27	8	11	72	35	37	15	57	21
	Zusammenstellung.																
I.	Infektionskrankheiten	3256	2865	3343	3439	3711	5239	5347	2382	2235	2375	3419	1635	1784	3036	383	649
II.	Poisonen	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	0,5	0,4	0,1	0,5	—	—
III.	Bergiftungen	55	57	64	63	51	81	80	65	68	75	66	52	14	53	13	0,8
IV.	Parasiten	9	19	19	14	21	21	14	18	22	21	18	8	10	11	7	14
V.	Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltsamer Tod	955	860	862	934	862	955	887	1011	1053	1036	942	765	177	286	656	28
VI.	Störungen der Entwicklung und Ernährung	9098	8620	8901	8911	8613	9214	8682	8928	8685	9068	8872	4259	4613	4353	4519	2899
VII.	Krankheiten der Werkzeuge	25467	25552	24902	25295	24110	25877	24537	25082	22915	24833	24857	12728	12129	18388	6469	8316
	dabon																
A.	der Haut und Muskeln	64	65	52	65	86	87	106	90	83	81	78	42	36	68	10	41
B.	der Knochen und Gelenke	229	253	265	257	215	238	339	215	213	194	234	114	120	210	24	9
C.	des Gefäßsystems	1891	1838	1779	1873	1895	2147	2161	2266	2359	2335	2051	894	1157	1898	243	37
D.	des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	7061	6913	6771	7087	6207	6452	6025	6332	5640	6309	6490	3522	2958	2792	3685	3666
E.	der Athmungswerkzeuge	11533	11153	11219	10516	10311	11247	11131	9828	9886	9746	10057	5365	5292	9457	1200	1494
F.	der Verdauungswerkzeuge	4021	4521	4163	4767	4641	4926	4092	5589	3937	5347	4600	2416	2184	3323	1277	3060
G.	d. d. u. Geschlechtswerkzeuge	581	689	551	599	605	628	667	632	685	704	634	375	259	620	14	9
H.	d. weibl. Geschlechtswerkzeuge	117	120	102	131	150	132	116	130	112	117	123	—	123	110	13	—
VIII.	Unbestimmte und nicht angegebene Krankheiten	172	89	113	106	106	50	36	27	8	11	72	35	37	15	57	21
	Im Ganzen	39012	38062	38205	38762	37474	41437	39583	37513	34986	37422	38246	19482	18764	26142	12104	11928
	Außerdem Todtgeborene	1593	1494	1446	1521	1534	1491	1526	1568	1617	1604	1539	863	676	—	—	—

*) außerhalb der Geburt und des Wochenbettes. 1) berichtigt: Zahlen.

Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken
Nach den Angaben

Tabelle 3 a.

Amtsbezirke.	Typhus.												Kindbettfieber.												Schar.				
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März		
	Engen					1				1				1	1	4	1	1	1					1	3	1	8	5	1
Konstanz	1												1	1															
Mehlfirch															1					1									
Fullendorf																													
Stodach															2														
Heberlingen			1																										
Donauessingen					1	3		1																					
Triberg				1	1	1	1	25	2																				
Willingen							2	2		2	2		1																
Bonndorf																													
Säckingen									1																				
St. Blasien									1																				
Waldshut									2	1			2	2	1	1													
Breisach				1				1	2		3	1	1	2		1													
Emmendingen				1				1	1	2	2		1	1															
Ettenheim																													
Freiburg	1	2			3	2	6	1	2	6	1	3	1	2	8	1	1	1	2		1	2	3	2	9	1	1	1	3
Neustadt								1	1	1																			
Staufen									1	1																			
Waldkirch									1																				
Lörrach	1	1			1			4	5	1																			
Müllheim	1		1					1	1																				
Schönau																													
Schopfheim			1				3	1	1																				
Kehl			1	1				1	1	1			2		1	1	1			1	1		1	3	1	1	3	1	3
Lahr	1	1						2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1		2	2	1							
Oberkirch		1		1				1	1	1	1																		
Offenburg	2	6	4	6	1	2	5	8	13	8	2	1	1	3															
Wolfach									2																				
Achern			1		1			2			1	1	3	1															
Baden	1			1				2	1																				
Bühl			1					1	1																				
Rastatt	1	1	1	2	1	1	3	4	6	8	1	3	1		1														
Bretten	2				1	2	1		3	4			1	1	3														
Bruchsal	5	4					1	1	1	1																			
Durlach				11	1		4	15	5	4			1	1															
Ettlingen	6		3	1	6	8	13	6	12	3	8	3	1		1														
Karlsruhe	11	2	4	5	10	4	10	7	5	7	9	7	4	4	2														
Pforzheim	5	2	5	2	51	27	130	313	102	84	30	12	1	1	1														
Mannheim	3	4		4		2	2	7	6	3	6	8	5	1	2	1	2												
Schwetzingen	5						1			1	1	1																	
Weinheim	1							2	3		1	4	1		1														
Eppingen	1				1		1		5	4																			
Heidelberg	14	2		2	4	6	15	7	11	8	5	3	2	2															
Sinsheim							1	2	2																				
Wiesloch							1		1																				

bezw. Gemeinden mit über 4000 Einwohnern im Jahr 1897.

Tabelle 3 a.

der Bezirksärzte.

Jahr	Diphtheritis												Im ganzen Jahr:														
	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Dyphus	Kindbett fieber	Scharlach	Diphtheritis	Blattern (Pocken)	
1	3	5	2	2	—	—	—	—	—	7	6	5	11	14	8	6	7	1	2	8	4	2	1	5	14	79	—
2	—	—	—	—	1	4	5	—	—	10	4	12	12	7	15	1	6	2	3	2	11	2	12	25	85	—	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	—	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	5	1	—	6	4	5	12	1	3	—	—	—	2	1	45	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	6	6	1	—	—	—	9	1	7	4	1	2	1	38	—	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	1	4	3	—	—	2	3	1	—	3	5	50	12	14	9	7	6	3	1	1	1	9	5	24	112	—	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	4	4	2	8	3	4	12	7	4	1	1	31	8	5	66	—	
10	4	1	1	5	—	2	4	1	—	18	12	17	7	4	2	2	1	2	2	11	6	5	5	37	84	—	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	8	4	4	1	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	35	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	26	—	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	1	1	1	2	2	2	1	1	—	—	—	6	1	20	—	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	3	4	3	7	1	—	5	4	8	—	—	8	8	3	51	—	
16	16	12	2	2	—	—	—	—	—	5	7	3	—	3	—	1	4	1	3	1	1	8	5	67	25	—	
17	9	5	16	7	1	2	1	1	1	21	23	24	20	9	7	2	8	—	6	12	34	7	8	90	166	—	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	1	—	—	1	4	5	2	2	7	2	2	2	2	2	29	—
19	4	5	9	4	8	10	19	22	16	26	8	6	10	5	9	8	10	15	11	32	27	24	11	150	—		
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	—	1	2	1	3	4	—	—	—	—	2	1	6	21	—	
21	18	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	6	4	3	5	4	—	3	4	2	3	1	3	6	30	45	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	6	4	3	5	4	—	3	4	2	5	2	1	6	4	40	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	4	7	2	1	6	—	1	2	1	2	8	6	17	34	—	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	12	1	3	7	—	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	6	8	3	2	2	3	6	3	2	6	2	1	4	52	—	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	4	2	2	1	1	—	1	2	3	7	7	3	1	25	—	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Jahresbericht 1897

bezirken bezm. Gemeinden mit über 4000 Einwohnern im Jahr 1897.

Noch: Tabelle 3 a.

L a d.	D i p h t h e r i t i s.												Im ganzen Jahr:				
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ephe-	Kind-	Schar-	Diph-	Stat-
	phus	bett-	lach	theri-	ten												
3	6	3	8	4	2	1	5	3	2	1	1	2	2	2	3	25	—
1	2	4	1	5	2	4	6	2	2	1	3	1	5	5	6	33	—
3	1	5	1	2	4	7	4	3	2	2	8	2	12	1	10	71	—
16	22	16	11	11	8	5	7	7	10	11	8	38	9	97	131	—	
3	20	21	10	38	31	13	13	17	42	33	25	66	16	55	277	—	
4	25	8	6	9	4	9	8	7	9	10	22	20	18	84	220	—	
1	41	28	37	22	15	10	18	3	7	5	26	32	9	46	217	—	
2	6	1	2	3	3	3	1	1	3	2	—	595	1	50	22	—	
1	1	1	2	2	4	4	1	2	1	1	3	1	1	4	40	—	
3	1	1	2	1	1	1	—	—	1	4	4	9	2	2	4	8	
1	9	13	3	1	7	9	—	—	7	16	13	9	5	1	8	87	
1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	4	3	1	1	10	
3	1	2	—	—	—	—	—	—	1	3	4	6	8	11	3	69	
5	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	5	2	3	
1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	7	3	7	1	3	3	11	
2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	6	8	11	3	69	
6	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	5	2	3	
1	15	10	11	1	2	1	1	—	1	1	—	—	—	3	3	11	
7	4	1	2	—	—	—	—	—	1	3	7	1	1	3	3	11	
43	15	10	11	1	2	1	1	—	1	1	—	—	—	3	3	11	
97	4	1	2	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
4	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
5	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
2	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
3	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
4	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
5	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
2	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
3	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
4	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
5	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
2	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
3	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
4	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
5	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
2	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
3	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
4	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
5	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
2	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
3	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
4	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
5	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
2	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
3	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
4	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
5	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
2	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
3	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
4	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
5	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
2	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
3	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
4	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
5	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
2	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
3	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
4	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
5	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
2	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
3	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
4	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
5	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
2	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
3	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
4	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
5	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
2	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
3	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
4	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
5	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
2	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
3	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
4	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
5	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
2	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
3	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
4	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
5	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
2	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
3	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
4	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
5	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
2	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
3	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
4	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
5	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
2	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
3	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
4	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
5	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
2	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	8	11	3	69	
3	4	—	—	—													

Großherzogthum im Jahr 1897 unter Vergleichung mit den Vorjahren. Tabelle 3b.

Jahr	Diphtheritis.												Im ganzen Jahr:													
	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Dyphus	Kindbettstieber	Scharlach	Diphtheritis	Matern (Polken)
1895	3	5	2	2	1	5	6	—	—	31	16	32	34	29	29	17	19	26	16	21	35	5	22	41	305	—
1896	5	5	4	5	—	4	7	2	—	31	21	71	21	26	18	12	11	17	10	16	8	45	18	66	262	—
1897	—	—	1	3	—	—	1	1	1	39	20	13	8	12	4	3	7	5	11	2	8	9	18	9	132	—
1898	48	25	29	14	9	12	20	29	24	70	46	37	43	31	26	17	38	27	30	39	72	50	52	310	476	—
1899	—	3	1	1	2	1	2	1	3	19	8	14	17	8	6	9	4	8	8	5	12	29	11	25	118	—
1900	12	17	13	8	30	27	6	20	21	114	88	48	33	33	21	26	87	104	78	106	87	82	49	217	825	—
1901	2	—	3	2	2	2	—	—	2	15	24	23	25	22	7	16	38	36	24	35	18	102	35	35	283	—
1902	13	20	30	21	26	12	8	11	15	87	68	37	24	83	56	27	58	58	88	83	70	980	61	211	739	—
1903	16	11	10	2	11	13	6	7	7	45	28	36	33	25	17	10	32	40	68	70	54	65	22	123	458	—
1904	1	5	3	—	13	6	4	3	14	73	48	58	31	42	25	54	29	34	30	44	90	97	26	73	558	—
1905	4	6	4	2	3	4	—	1	1	14	22	24	15	22	18	21	17	22	20	61	66	47	30	35	322	—
1906	8	10	7	10	1	9	14	3	1	101	57	116	63	67	51	32	37	48	37	39	51	59	58	116	699	—
1907	60	45	43	23	41	40	28	50	48	203	142	99	93	72	53	52	129	139	116	150	171	161	112	552	1419	—
1908	15	20	33	23	28	14	8	11	17	102	92	60	49	105	63	43	96	94	112	118	88	1082	96	246	1022	—
1909	21	22	17	4	27	23	10	11	22	132	98	118	79	89	60	85	78	96	118	175	210	209	78	231	1338	—
1910	8	10	6	7	1	9	13	2	—	57	43	107	57	51	41	26	26	31	19	33	45	19	34	102	536	—
1911	3	9	5	4	2	3	1	2	4	96	59	28	29	40	23	10	27	32	26	22	22	59	51	56	414	—
1912	57	36	40	24	40	38	28	49	47	160	110	91	87	60	42	56	141	138	115	149	162	202	103	520	1311	—
1913	31	32	43	23	41	27	14	20	24	143	115	103	67	126	81	57	108	125	178	183	148	1102	104	371	1434	—
1914	5	10	6	2	13	9	4	2	13	82	62	64	44	56	40	63	38	51	45	95	143	129	52	96	783	—
1915	104	97	100	60	97	86	60	75	88	538	389	393	284	333	227	212	340	377	383	482	520	1511	344	1145	4478	—
1916	195	174	214	130	139	132	101	106	120	494	523	466	375	299	322	281	351	334	315	446	547	811	362	1884	4753	—
1917	70	91	87	47	93	81	112	147	180	670	460	485	354	298	259	288	319	340	432	551	545	903	379	1100	5001	1
1918	132	86	87	56	71	82	83	70	78	709	751	732	686	621	369	380	422	421	633	662	816	1205	413	1190	7202	1
1919	86	135	139	115	111	144	154	168	138	626	404	409	432	453	452	401	655	801	825	910	1001	1033	457	1472	7369	1
1920	87	123	115	88	72	73	71	111	88	376	338	365	217	270	263	146	225	305	371	469	442	1077	413	1220	3787	6
1921	225	203	171	142	102	102	134	151	176	384	370	258	359	344	297	201	169	192	308	318	373	1392	470	1968	3573	—
1922	429	387	293	165	120	144	202	140	173	144	172	241	198	221	209	150	199	247	254	303	355	1147	363	2685	2693	20
1923	361	326	253	169	208	130	216	187	149	381	345	351	251	231	176	177	184	192	225	221	226	1459	462	3195	2960	18
1924	304	293	270	232	176	196	173	249	377	259	275	321	222	195	202	130	163	133	141	162	293	1608	557	2935	2501	7
1925	199	192	173	120	119	117	131	140	157	458	403	402	338	326	278	237	303	334	389	452	512	1215	422	1879	4432	5
1926	166	162	151	100	101	106	115	121	130	493	426	419	363	355	300	257	335	377	440	517	575	1135	400	1583	4857	4
1927	248	266	200	178	175	165	166	171	175	273	276	277	227	209	176	137	162	174	184	207	253	1464	454	2510	2555	17

(Fortsetzung des Textes von Seite 77.)
 Hiernach waren 26 234 oder 70,1 % der 37 422 Gestorbenen des Jahres 1897 ärztlich behandelt worden, während bei 11 188 oder 29,9 % keine ärztliche Thätigkeit stattgefunden hatte. Und zwar waren von den 12 812 im 1. Lebensjahre Gestorbenen nur 6 378 oder 49,8 %, von den 24 610 über 1 Jahr alten Gestorbenen 19 856 oder 80,7 %, von den 19 090 männlichen Personen 13 111 oder 68,7 %, von den 18 330 weiblichen dagegen 13 123 oder 71,6 % ärztlich behandelt worden.

Die Antheile der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen sind für jedes der beiden Geschlechter von jeher verschieden, wenn auch — mit Ausnahme des Jahres 1888 — nicht sehr erheblich. Die ärztliche Behandlung der Kinder im ersten Lebensjahre hat erst in den letzten Jahren die gegenwärtige Höhe von nahezu 50 % erreicht; in den 80er Jahren hat sie ziemlich regelmäßig zwischen einem Drittel und zwei Fünftel der gestorbenen Kinder geschwankt. Folgende Nachweisung giebt für das letzte Jahrzehnt nähere Auskunft. Es wurden ärztlich behandelt

im Jahr	von je 100 Gestorbenen			im Jahr	von je 100 Gestorbenen		
	Männl.	Weibl.	im ersten Lebensj.		Männl.	Weibl.	im ersten Lebensj.
1888	58,7	67,2	39,3	1894	70,6	72,4	47,2
1889	64,7	66,8	38,8	1895	67,5	70,7	47,3
1890	66,7	69,1	42,2	1896	69,2	72,3	47,8
1891	65,0	67,8	42,4	1897	68,7	71,6	49,8
1892	66,2	69,1	43,3	im Durchschnitt			
1893	67,7	70,7	43,7	1888/97	67,0	69,8	44,2

Wie gewöhnlich wurde in den verschiedenen Gegenden des Landes auch im Jahr 1897 die ärztliche Hilfe in ungleichem Maße in Anspruch genommen. Die Verhältniszahl schwankte in den Amtsbezirken zwischen 50,5 % aller Todesfälle im Amtsbezirke Neckfisch und 82,0 % in den Bezirken Freiburg und Lörrach; noch günstigere Verhältniszahlen als diese Amtsbezirke wiesen die Städte Heidelberg mit 92,5 %, Karlsruhe mit 90,0, Freiburg mit 89,0 und Pforzheim mit 85,4 % aller Gestorbenen auf.

Von den Gestorbenen der Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren im Ganzen 83,7 % (1896: 84,2 %), in den übrigen Gemeinden nur 64,7 % (1896: 65,4 %) ärztlich behandelt worden. In Ueberlingen stieg der Antheil derselben auf 95,7 % und in Bruchsal auf 90,5 %; dagegen betrug er in Hockenheim nur 53,6 %, in Brötzingen 56,1 %.

Wird die Zahl der Gestorbenen sowie die der davon ärztlich Behandelten zur Zahl der vorhandenen Aerzte in Beziehung gesetzt, so sinkt im Allgemeinen mit der Zunahme der Aerzte die Sterblichkeitsziffer und der Prozentsatz der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen steigt, wie folgende Nachweisung, in der die kleinen Zahlen der Amtsbezirke zu größeren Gruppen (nach der Anzahl der vorhandenen Aerzte) zusammengefaßt sind, deutlich erkennen läßt. Es kamen

in Gruppe *)	auf 10000 Einwohner		auf 1000 Einwohner	auf 100 Gestorbene
	Aerzte überhaupt	durchschnittlich		
I.	1,6 — 2,0	1,7	23,3	61,0
II.	2,1 — 3,0	2,7	22,7	68,6
III.	3,1 — 4,0	3,6	21,0	68,9
IV.	4,1 — 5,0	4,6	19,0	73,9
V.	5,1 u. mehr	6,8	21,7	78,2

Nur die Gruppe V macht bezüglich der allgemeinen Sterbeziffer eine erhebliche Ausnahme. Diese Abtheilung, in welcher mehr als 5 Aerzte auf 10 000 Einwohner entfallen, besteht aus den Amtsbezirken Konstanz, Pfullendorf, Bonndorf, Freiburg, Müllheim, Baden Karlsruhe, Mannheim und Heidelberg. Sie enthält die größten Städte des Großherzogthums, die zum Theil ungünstigere Sterblichkeitsverhältnisse aufweisen als das platte Land. Dazu kommen die Bäderstädte mit ihrem großen Fremdenverkehr und die beiden Universitätsstädte mit ihren Kliniken und Krankenanstalten, denen regelmäßig zahlreiche Schwerkranken zugeführt werden, bei denen naturgemäß auch der Prozentsatz der Todesfälle größer ist als bei anderen Kranken.

*) Die Amtsbezirke vertheilen sich auf die fünf Gruppen wie folgt:

- I. (mit 1,6—2,0 Aerzten auf 10 000 Einwohner): Eppingen und Wiesloch;
- II. (mit 2,1—3,0 Aerzten auf 10 000 Einwohner): Engen, Erberg, Willingen, Waldshut, Ettenheim, Schopshelm, Kastatt, Bretten, Bruchsal, Durlach, Ettlingen, Schwegingen, Buchen, Eberbach, Mosbach und Tauberbischofsheim;
- III. (mit 3,1—4,0 Aerzten auf 10 000 Einwohner): Neckfisch, Stodach, Ueberlingen, Donaueschingen, Säckingen, Breisach, Emmendingen, Neustadt, Waldkirch, Lörrach, Schönau, Kehl, Kahr, Offenburg, Wolfach, Achern, Wühl, Pforzheim, Weinheim, Sinsheim und Albstheim;
- IV. (mit 4,1—5,0 Aerzten auf 10 000 Einwohner): St. Blasien, Staufen, Oberkirch und Wertheim;
- V. (mit 5,1 und mehr Aerzten auf 10 000 Einwohner): Konstanz, Pfullendorf, Bonndorf, Freiburg, Müllheim, Baden, Karlsruhe, Mannheim und Heidelberg.

2. Die in Anstalten Gestorbenen.

Die Zahl der in den Krankenanstalten (einschl. Anstalten für Geisteskranke) Gestorbenen und deren Verhältniß zur Zahl aller Gestorbenen ist seit dem ersten Beobachtungsjahre (1852) von 694 oder 1,8% aller Gestorbenen auf 767 oder 2,7% im Jahr 1863, 1376 oder 3,3% im Jahr 1874 und 2001 oder 5,2% im Jahr 1885 gestiegen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts betrug dieselbe

im Jahr	Zahl	%	im Jahr	Zahl	%	im Jahr	Zahl	%
1888	2439	6,3	1892	2759	7,4	1896	2918	8,3
1889	2696	7,1	1893	2906	7,0	1897	3027	8,1
1890	2655	6,9	1894	3099	7,8	im Durchschnitt		
1891	2672	6,9	1895	2891	7,7	1888/97	2806	7,3

Da die Krankenanstalten sich vornehmlich in größeren Gemeinden befinden, so macht die Zahl der darin Gestorbenen in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern einen weit höheren Antheil aller Gestorbenen (20,7%) aus, als in den übrigen Gemeinden des Landes (3,1%); auch in den Bezirken ist die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen — je nach der Zahl der vorhandenen Krankenhäuser — sehr verschieden. Höchste Zahlen einer- und geringste oder Fehlzahlen andererseits kamen 1897 in folgenden Bezirken vor: Es starben in Krankenanstalten

über 10% der Gestorbenen:

in	%	in	%
Freiburg	30,4	Donaueschingen	11,7
Schopfheim	22,2	Mannheim	11,3
Heidelberg	17,1	Konstanz	10,6
Karlsruhe	14,4	Weinheim	10,5
Bühl	13,2	Waldshut	10,1
Engen	12,2	Vörrach	10,0

unter 1% der Gestorbenen:

in	%	in	%
Schwezingen	0,9	Bretten	0,4
Wiesloch	0,7	Adelsheim	0,4
Durlach	0,6	Buchen	0,2
Eppingen	0,6	Ettenheim	—
Rehl	0,4		

Zu den Anstalten für Geisteskranke, Zbioten, Epileptiker u. insbesondere starben 185 oder 4,7% aller im Laufe des Berichtsjahres vorhanden gewesenen Pfleglinge gegen 206 oder 5,5% im Jahr 1896; in den Kreispflegeanstalten kamen 402 Sterbefälle vor oder 13,2 auf 100 Verpflegte gegen 372 oder 12,2% der Verpflegten im Jahr 1896.

3. Die im ersten Lebensjahre Gestorbenen.

Gleichwie bei der Vergleichung der Zahl der im 1. Lebensjahre Gestorbenen mit derjenigen der Geborenen (vergl. Tabelle 2a der Bewegung der Bevölkerung, Seite 54 ff.) ergibt sich bei einer Vergleichung der Zahl der im 1. Lebensjahre gestorbenen Kinder mit der Zahl der Gestorbenen und der Einwohner, daß die in früheren Jahren so erschreckend hohe Kindersterblichkeit langsam, aber ständig zurückgeht. Während von 100 überhaupt Gestorbenen in den Jahren 1860—1879 nicht weniger als 37 im 1. Lebensjahre standen, belief sich der Antheil der letzteren im Durchschnitt der letzten 10 Jahre nur noch auf 31,2% und im Berichtsjahr auf 34,2%.

Um so ungünstigere Verhältniszahlen weist freilich die Gegend auf, die regelmäßig den größten Antheil zur Kindersterblichkeit stellt: im Amtsbezirke Schwezingen waren 53,4% sämtlicher Todesfälle solche von Kindern im 1. Lebensjahre, in Wiesloch 47,1%, in Mannheim 45,5% und in Bruchsal 44,0%. Es sind dieselben Bezirke, in denen auch die Lungenschwindsucht die meisten Opfer fordert. Dazu kommt, daß eben diese genannten Bezirke, wie bereits in der Mittheilung über die Bewegung der Bevölkerung nachgewiesen ist, die stärkste Bevölkerungszunahme haben; der Tod hält unter der großen Zahl von Neugeborenen eine reiche Ernte. Welchen Einfluß auf die Höhe der Kindersterblichkeit die berufliche Thätigkeit der Mütter, und welchen Einfluß natürliche Verhältnisse haben, kann hier nicht näher erörtert werden; dies muß Aufgabe einer späteren, sich auf einen längeren Zeitraum erstreckenden Untersuchung bleiben.

In den letzten 10 Jahren ergaben sich für die Kindersterblichkeit im Großherzogthum folgende Zahlen: Es starben im 1. Lebensjahre

im Jahr	überhaupt	% der Geborenen	% der Gestorbenen	im Jahr	überhaupt	% der Geborenen	% der Gestorbenen	im Jahr	überhaupt	% der Geborenen	% der Gestorbenen
1888	11 765	22,5	30,2	1892	11 969	21,8	31,9	1896	10 670	18,4	30,5
1889	11 470	21,6	30,1	1893	12 283	22,1	29,6	1897	12 812	21,7	34,2
1890	11 244	21,7	29,4	1894	11 461	21,1	29,0	im Durchschnitt			
1891	12 782	23,1	33,0	1895	12 822	22,6	34,2	1888/97	11 928	21,7	31,2

Anschließend wird die Bedeutung einiger wichtiger Todesursachen, welche vorwiegend bei Kindern auftreten und alljährlich zahlreiche Opfer zu fordern pflegen, im Einzelnen nachgewiesen.

4. Masern.

Seit 1895 haben die Todesfälle an Masern etwas zugenommen, doch blieben sie auch 1897 noch hinter dem Durchschnitt des letzten Jahrzehnts zurück. Es starben nämlich an Masern

im Jahr	Personen	davon im 1. Lebensjahr	im Jahr	Personen	davon im 1. Lebensjahr	im Jahr	Personen	davon im 1. Lebensjahr
1888	973	303	1892	469	174	1896	416	145
1889	363	124	1893	550	185	1897	487	181
1890	205	65	1894	685	229	im Durchschnitt		
1891	631	211	1895	377	125	1888/97	516	174

Die Kinder machten also im Berichtsjahre 37,2 % und im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts 33,7 % der an Masern gestorbenen Personen aus.

5. Scharlach.

Die Todesfälle an Scharlach haben gegenüber dem Vorjahr absolut und im Verhältnis zur Zahl der Erkrankten eine Abnahme erfahren. Es starben nämlich daran von 1145 Erkrankten 54 oder 4,7 % gegen 96 von 1884 Erkrankten (5,1 %) im Vorjahre. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts fielen dieser Krankheit zum Opfer

im Jahr	Personen	% der Erkrankten	im Jahr	Personen	% der Erkrankten	im Jahr	Personen	% der Erkrankten
1888	239	8,1	1892	92	7,5	1896	96	5,1
1889	277	8,7	1893	91	6,2	1897	54	4,7
1890	178	6,6	1894	134	11,3	im Durchschnitt		
1891	130	6,6	1895	62	5,6	1888/97	135	7,2

Die meisten Sterbefälle an Scharlach weisen die Amtsbezirke Offenburg mit 6 und Pforzheim mit 5 auf; 29 Amtsbezirke waren völlig von dieser Krankheit verschont.

6. Blattern (Pocken).

Todesfälle an Blattern sind in den letzten 7 Jahren nicht mehr vorgekommen; seit 1871, wo die Epidemie 3184 Personen wegraffte, treten sie nur noch in vereinzelt, vom Auslande eingeschleppten Fällen auf.

7. Diphtheritis (Rachenbräune) und Krupp.

Während die Zahl der Todesfälle an Diphtherie in den Jahren 1892—94 eine recht erhebliche Steigerung erfahren hatte, zeigte das Jahr 1895 eine sehr erfreuliche Besserung, welche auch 1896 und 1897 anhielt, augenscheinlich eine Folge der immer häufiger werdenden Anwendung des Behring'schen Serums. Auch die Zahl der an Krupp Gestorbenen ist seit 1893 von 816 auf 257 im Jahr 1896 und auf 219 im Jahr 1897 gesunken, womit die niedrigste Zahl in den letzten 10 Jahren erreicht wurde. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben

im Jahr	an Diphtherie	% der Erkrankten	an Krupp	im Jahr	an Diphtherie	% der Erkrankten	an Krupp	im Jahr	an Diphtherie	% der Erkrankten	an Krupp
1888	537	21,5	349	1892	1075	28,4	560	1896	543	11,4	257
1889	709	24,0	380	1893	1911	25,9	816	1897	489	10,9	219
1890	683	25,4	423	1894	1831	25,4	675	im Durchschnitt			
1891	961	26,9	507	1895	676	13,5	320	1888/97	941	21,2	451

Die meisten Opfer forderte die Diphtheritis in den Amtsbezirken Heidelberg (43 Fälle), Mannheim (31 Fälle) und Bruchsal (29 Fälle).

8. Keuchhusten.

Die Sterblichkeit an Keuchhusten hat im Jahr 1897 zugenommen; sie steht über dem Durchschnitt des letzten Jahrzehnts. Es starben daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1888	407	1892	376	1896	264
1889	452	1893	294	1897	397
1890	365	1894	548	im Durchschnitt	
1891	494	1895	209	1888/97	381

Im Durchschnitt 1880/89 waren 479, 1870/79: 509, 1860/69: 463, 1852/59: 554 Todesfälle an Keuchhusten zu verzeichnen. — Von den Amtsbezirken weisen Pforzheim mit 45, Billingen und Karlsruhe mit je 36 und Mannheim mit 34 Todesfällen an dieser Krankheit die ungünstigsten Verhältnisse auf, während 9 Amtsbezirke mit Todesfällen an Keuchhusten verschont blieben.

An den unter Biff. 4—8 genannten Krankheiten (Masern, Scharlach, Diphtherie, Krupp und Keuchhusten) zusammen genommen sind im letzten Jahrzehnt 24 236 Personen gestorben, die sich auf die einzelnen Jahre wie folgt verteilen:

Jahre	Personen	Jahre	Personen	Jahre	Personen
1888	2505	1892	2572	1896	1576
1889	2181	1893	3662	1897	1646
1890	1854	1894	3873	Durchschnitt	
1891	2723	1895	1644	1888/97	2424

Hiernach ist das Jahr 1897 eins der günstigsten in dem letzten 10-jährigen Zeitraum.

Das erste Lebensjahr ist an diesen vier Todesursachen in recht ungleichem Maße beteiligt. Im Jahr 1897 starben Untereinfährige an Masern 181 (37,2 % der an Masern Gestorbenen), an Scharlach 3 (5,6 %), an Diphtheritis 52 (10,6 %), an Krupp 36 (16,4 %) und an Keuchhusten 251 (63,2 %).

An den folgenden Todesursachen sind überwiegend erwachsene Personen beteiligt.

9. Grippe (Influenza).

Die Influenza, welche früher nur in vereinzelt Fällen vorkam, hat seit ihrem epidemischen Zuge durch Europa im Jahr 1890 auch in Baden eine größere Zahl von Personen hinweggerafft, und zwar hat sie verursacht

im Jahr	Sterbefälle	im Jahr	Sterbefälle	im Jahr	Sterbefälle
1888	3	1892	547	1896	161
1889	6	1893	850	1897	180
1890	907	1894	850	im Durchschnitt	
1891	53	1895	231	1888/97	379

Besonders ungünstig war im Berichtsjahre der Monat März, der die meisten Influenzopfer forderte. Von den Amtsbezirken hatten Karlsruhe (19), Tauberbischofsheim (12), Kehl und Bretten (je 11) die meisten Todesfälle, während 11 Amtsbezirke, mit Ausnahme von Eberbach alle oberländische, mit Sterbefällen an Influenza verschont wurden.

10. Gestorbene Wöchnerinnen.

In den ersten drei Wochen nach der Entbindung starben Wöchnerinnen überhaupt

im Jahr	Zahl	% der Niedergelommenen	im Jahr	Zahl	% der Niedergelommenen	im Jahr	Zahl	% der Niedergelommenen
1888	398	0,74	1892	298	0,54	1896	194	0,33
1889	360	0,66	1893	339	0,60	1897	196	0,33
1890	358	0,68	1894	240	0,43	im Durchschnitt		
1891	333	0,59	1895	250	0,43	1888/97	297	0,53

Die Sterblichkeit im Wochenbett ist hiernach im Jahr 1897 sehr gering gewesen; sie ist die zweitniedrigste des letzten Jahrzehnts, bezw. der ganzen Beobachtungszeit. Insbesondere an Kindbettfieber wurden 344 Erkrankungen zur Anzeige gebracht, von denen nur 92 oder 26,3 % tödlich ausgingen. Im letzten Jahrzehnt gingen die Sterbefälle an Kindbettfieber von 36,1 % im Jahr 1888 auf 26,8 % im Berichtsjahre zurück; im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts starben von den an Kindbettfieber erkrankten Frauen nahezu genau ein Drittel. Folgende Uebersicht giebt nähere Auskunft darüber: Es starben Wöchnerinnen

im Jahr	an Kindbettfieber	% der Erkrankten	im Jahr	an Kindbettfieber	% der Erkrankten	im Jahr	an Kindbettfieber	% der Erkrankten
1888	201	36,1	1892	145	35,1	1896	83	22,9
1889	173	37,4	1893	151	33,0	1897	92	26,8
1890	134	36,9	1894	117	28,3	im Durchschnitt		
1891	163	34,7	1895	122	32,2	1888/97	138	32,7

11. Typhus.

Von den im Jahr 1897 zur Anzeige gelangten 1511 Erkrankungen an Typhus hatten 192 oder 12,7 % einen tödlichen Ausgang gegen 134 oder 16,5 % von 811 Erkrankungen im Vorjahre. In den letzten 10 Jahren starben an Abdominaltyphus überhaupt

im Jahr	überhaupt	% der Erkrankten	im Jahr	überhaupt	% der Erkrankten	im Jahr	überhaupt	% der Erkrankten
1888	263	16,4	1892	167	15,5	1896	134	16,5
1889	217	14,9	1893	192	18,6	1897	192	12,7
1890	147	12,8	1894	183	15,0	im Durchschnitt		
1891	183	13,2	1895	123	13,6	1888/97	180	14,8

Gegenüber dem Vorjahre hat die Zahl der Erkrankungen und die Zahl der Todesfälle zwar eine Zunahme erfahren, die Krankheit ist aber in Bezug auf ihre Gefährlichkeit entschieden im Rückgang.

Während im Durchschnitt der Jahre 1852/59 noch 1658 Personen an dieser Krankheit gestorben sind, ist die Zahl der Todesfälle daran für das letzte Jahrzehnt auf 180 herabgesunken.

12. Ruhr (Dysenterie).

An dieser Krankheit starben im Durchschnitt der Jahre 1880/89: 25, 1870/79: 92, 1860/69: 228, 1852/59: 1207 Personen; dagegen erlagen derselben

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1888	6	1892	3	1896	2
1889	3	1893	—	1897	4
1890	25	1894	4	im Durchschnitt	
1891	4	1895	2	1888/97	5.

Wie schon in früheren Jahren hervorgehoben wurde, erscheint die Kraft dieser, sowie der vorher aufgeführten Krankheit in den letzten Jahrzehnten gegen ihr häufiges früheres, oft verderbliches Auftreten gebrochen, was hauptsächlich der Einwirkung vervollkommener sanitärer Einrichtungen, sowie fortgeschrittener ärztlicher Behandlung und diätetischer Lebensweise zuzuschreiben sein dürfte.

13. Selbstmorde.

Die Zahl der Selbstmorde war im Jahr 1897 um 7 geringer als im Vorjahre; sie betrug

1888	346	1891	353	1894	337	1897	329
1889	312	1892	359	1895	337	im Durchschnitt	
1890	275	1893	354	1896	336	1888/97	334.

Wie gewöhnlich waren die Selbstmorde in den größeren Gemeinden verhältnißmäßig häufiger als in den übrigen und im Großherzogthum im Allgemeinen. Von den 329 Selbstmördern des Jahres 1897 kamen 144 auf die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern, 89 auf die Städte mit mehr als 20000 Einwohnern insbesondere. Auf 1000 Einwohner entfielen in den erstgenannten Gemeinden 0,24, in den letzteren 0,24, in den übrigen Gemeinden 0,16, im ganzen Lande 0,19 Selbstmorde.

Im Durchschnitt des Jahrzehnts 1888/97 legten 279 Männer und 55 Frauen Hand an sich; das weibliche Geschlecht machte also fast ein Sechstel (genauer 16,3 %) der Selbstmörder aus. Im Jahr 1897 war der Antheil der weiblichen Personen etwas günstiger; von den 329 Selbstmördern waren nur 47 oder 14,3 % Frauen.

Als Todesart wählten die Selbstmörder wie stets in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts auch 1897 am häufigsten das Erhängen (179), Ertränken (59) und Erschießen (54); Tod durch Gift kam 12mal vor. Von den männlichen Selbstmördern (282) starb weit über die Hälfte (164) durch Erhängen und nahezu ein Fünftel (53) durch Erschießen; von den weiblichen Personen suchten fast ein Drittel (15) den Tod durch Erhängen und fast die Hälfte (22) im Wasser.

Auf die Monate vertheilen sich die Selbstmorde meist derart, daß sie unter Schwankungen gegen den Sommer zu- und danach abnehmen. Im Jahr 1897 fiel die Höchstzahl in den Juni, die Mindestzahl in den Februar, im Durchschnitt des ganzen Jahrzehnts in den Mai bezw. Februar.

14. Todesfälle durch Verunglückung und Verbrechen u.

Auf gewaltsame Weise (durch Verbrechen, Vergehen, Unfall, Verunglückung) kamen im Jahr 1897: 741 Personen, gerade soviel als im Vorjahr, ums Leben. Im letzten Jahrzehnt starben auf diese Weise

im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einwohner	im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einwohner	im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einwohner
1852	415	0,31	1890	646	0,39	1895	709	0,41
1863	483	0,34	1891	637	0,39	1896	741	0,43
1874	572	0,38	1892	554	0,33	1897	741	0,42
1888	674	0,41	1893	651	0,39	im Durchschnitt		
1889	628	0,38	1894	621	0,37	1888/97	660	0,39.

In den Gemeinden von mehr als 4000 Einwohnern kamen im Berichtsjahr 227, in den übrigen Gemeinden 514 gewaltsame Todesfälle, auf 1000 Einwohner dort 0,38, hier 0,45 vor.

Von den gewaltsamen Todesfällen waren 50 die Folge von Verbrechen und Vergehen, 691 von Verunglückung; letztere geschah durch Sturz in 193, Ertrinken in 140, Ueberfahren von Fuhrwerk in 67, Verbrühen in 45 Fällen, auf der Eisenbahn verunglückten 44 Personen. Des Weiteren wurde der Tod durch Verbrennen in 36, Erschlagen in 30, durch Stoß oder Schlag von Pferden und Rindvieh in 23, Vergiftung in 21, durch Maschinen in 14, Ersticken in 12 und auf sonstige Weise in 66 Fällen herbeigeführt.

In den einzelnen Jahren des Jahrzehnts kamen um

	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	im Durchschnitt
Verbrechen zc.	43	53	45	39	48	43	52	59	67	50	50
Beringlüdung	631	575	601	598	506	608	569	650	674	691	610

oder in Prozenten

	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	im Durchschnitt
Verbrechen zc.	10,1	6,4	8,4	7,0	5,1	6,6	8,4	8,3	9,0	6,7	7,6
Beringlüdung	89,9	93,6	91,6	93,0	93,9	93,4	91,6	91,7	91,0	93,3	92,4

Die durch Verbrechen und Vergehen herbeigeführten Todesfälle machten hiernach im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts 7,6 % aller auf gewaltsame Weise herbeigeführten Sterbefälle aus; in einzelnen Jahren desselben (1889, 1891, 1892 und 1893) war der Prozentsatz der ersteren sogar noch erheblich geringer, während in den letzten Jahren (mit Ausnahme des Berichtsjahres) wieder eine ständige Zunahme der auf jene Weise umgekommenen Personen zu verzeichnen war.

Von den im Jahr 1897 durch Verbrechen und Vergehen Getödteten waren 28 Männer, 8 Frauen und 14 Kinder, unter den Beringlücten waren 454 Männer, 74 Frauen und 163 Kinder. Die Kinder machten bei den ersteren 28,0 %, bei den letzteren 23,6 % aus gegen 38,0 bzw. 25,9 % im Durchschnitt des Jahrzehnts 1888/97. Auffallend ist, daß letztgenannte Prozentzahl Jahr für Jahr fast dieselbe bleibt, während der Antheil der Kinder an der Zahl der durch Verbrechen zc. Getödteten viel erheblicheren Schwankungen unterliegt.

15. Krebs.

Todesfälle an Krebs und Geschwülsten (böartigen Neubildungen) kamen vor

im Jahr	bei Personen	im Jahr	bei Personen	im Jahr	bei Personen
1888	1412	1892	1504	1896	1824
1889	1480	1893	1643	1897	1750
1890	1532	1894	1636	im Durchschnitt	
1891	1572	1895	1719	1888/97	1607.

Die Sterblichkeit an diesen Krankheiten nimmt mit einigen Schwankungen ziemlich stetig zu und hatte im Jahr 1896 den Höchstand des Jahrzehnts erreicht.

16. Lungenschwindsucht und Lungenentzündung.

Im Jahr 1897 starben an der Lungenschwindsucht 4433, an der krupösen und katarrhalischen Lungenentzündung einschl. akuter Bronchitis 3780, somit an diesen Todesursachen zusammengekommen 8213 Personen, d. s. 21,9 % oder mehr als ein Fünftel sämtlicher Gestorbenen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben

an Lungenschwindsucht			an Lungenentzündung zc.			zusammen		
im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einw.	einschl. Kinder im 1. Jahre	auf 1000 Einw.	überhaupt	auf 1000 Einw.	einschl. Kinder im 1. Jahre	auf 1000 Einw.
1888	4998	3,12	4564	2,85	3280	2,04	9562	5,97
1889	4715	2,94	4572	2,85	3226	2,01	9287	5,79
1890	4955	2,98	4362	2,63	3130	1,88	9317	5,61
1891	4664	2,81	4124	2,49	2892	1,74	8788	5,30
1892	4504	2,71	4161	2,50	2879	1,73	8665	5,21
1893	4654	2,81	4710	2,84	3731	2,25	9364	5,65
1894	4863	2,93	4586	2,76	3348	2,02	9449	5,69
1895	4571	2,65	3682	2,07	2425	1,40	8253	4,72
1896	4557	2,63	3740	2,16	2483	1,48	8297	4,79
1897	4433	2,54	3780	2,16	2421	1,38	8213	4,70
im Durchschnitt	4692	2,78	4228	2,50	2982	1,77	8920	5,28

Diese zwei Krankheiten bzw. Krankheitsgruppen fordern nebst der Ekampsie der Kinder und der Altersschwäche zahlreichere Opfer als irgend welche anderen Todesursachen.

Die Zahl der Opfer an Lungenschwindsucht ist verhältnismäßig nicht sehr erheblichen Schwankungen unterworfen; im letzten Jahrzehnt bewegt sie sich zwischen 2,54 und 3,12 auf 1000 Einwohner, während die Zahl der an Lungenentzündung und akuter Bronchitis Gestorbenen zwischen 2,07 und 2,85 schwankt. Die Todesfälle an beiden Krankheitsgruppen zusammen waren verhältnismäßig im Jahr 1897 geringer als in irgend einem andern Jahre des ganzen Jahrzehnts.

Umstehend ist in üblicher Weise die Sterblichkeit an den beiden Krankheitsformen in den einzelnen Amtsbezirken und in den größeren Städten dargestellt. Dabei sind die Amtsbezirke bzw.

Städte und Landbezirke nach der Häufigkeit der Sterbfälle an beiden Krankheiten geordnet; mit einem * sind die Bezirke versehen, in denen beide Krankheiten, jede für sich, hinsichtlich der Zahl der Todesfälle über, mit einem † diejenigen, in denen beide unter dem Landesdurchschnitt stehen.

Auf 1000 Einwohner (also einschl. der Kinder im 1. Lebensjahre) starben im Jahr 1897

an beiderlei Lungen- krankheiten			davon an Schwind- sucht			Ent- zün- dung			an beiderlei Lungen- krankheiten			davon an Schwind- sucht			Ent- zün- dung								
in			in			in			in			in			in								
Schwellingen*	7,86	4,31	3,55	Adelsheim	5,02	2,26	2,76	Säckingen	4,18	2,91	1,27	Ettlingen	6,79	3,58	3,21	Pforzheim	4,87	2,28	2,59	Baden†	4,15	2,72	1,43
Heidelberg, Land*	6,43	3,12	3,31	Eppingen	4,86	2,24	2,62	Stodach†	4,14	2,07	2,07	Heidelberg, Stadt*	6,37	3,24	3,13	Offenburg†	4,66	2,44	2,22	Triberg†	4,07	1,62	2,45
Heidelberg, Stadt*	6,31	3,41	2,90	Freiburg, Stadt	4,65	3,24	1,41	Bonnendorf†	4,06	1,71	2,35	Eberbach*	6,25	3,40	2,85	Freiburg	4,63	2,37	2,26	Müllheim†	4,06	2,32	1,74
Wiesloch*	6,12	3,37	2,75	Freiburg	4,60	2,86	1,74	Schopfheim†	4,06	1,84	2,22	Wertheim*	6,09	2,84	3,25	Sinsheim	4,58	2,03	2,55	Oberkirch†	4,06	2,11	1,95
Wertheim*	6,09	2,84	3,25	Emmendingen†	4,57	2,49	2,08	Karlsruhe, Stadt†	3,90	2,57	1,33	Karlsruhe, Land	5,97	3,99	1,98	Donaueshingen	4,55	1,94	2,61	Breisach†	3,88	1,89	1,99
Karlsruhe, Land	5,97	3,99	1,98	Donaueshingen	4,55	1,94	2,61	Breisach†	3,88	1,89	1,99	Ettenheim*	5,95	2,92	3,03	Neustadt†	3,81	1,47	2,34	Neustadt†	3,81	2,32	1,49
Ettenheim*	5,95	2,92	3,03	Karlsruhe	4,49	2,97	1,52	Neustadt†	3,81	1,47	2,34	Messtsch†	5,84	2,45	3,39	Staufen†	3,81	2,32	1,49	Weinheim†	3,80	1,81	1,99
Messtsch†	5,84	2,45	3,39	Buchen†	4,49	2,06	2,43	Staufen†	3,81	2,32	1,49	Rastatt*	5,73	3,11	2,62	Weinheim†	3,80	1,81	1,99	Mosbach†	3,79	1,91	1,88
Rastatt*	5,73	3,11	2,62	Freiburg, Land†	4,49	2,12	2,37	Weinheim†	3,80	1,81	1,99	Durlach	5,71	2,63	3,08	Mosbach†	3,79	1,91	1,88	Bühl†	3,75	2,26	1,49
Durlach	5,71	2,63	3,08	Engent†	4,48	2,24	2,24	Mosbach†	3,79	1,91	1,88	Mannheim, Land	5,55	3,51	2,04	Bühl†	3,75	2,26	1,49	Schönau†	3,50	2,01	1,49
Mannheim, Land	5,55	3,51	2,04	Bretten†	4,46	2,00	2,46	Bühl†	3,75	2,26	1,49	Pforzheim, Land	5,44	1,83	3,61	Schönau†	3,50	2,01	1,49	Kehl†	3,20	1,62	1,58
Pforzheim, Land	5,44	1,83	3,61	Waldfirch†	4,41	2,74	1,67	Schönau†	3,50	2,01	1,49	Billingen	5,42	2,46	2,96	Kehl†	3,20	1,62	1,58	Waldbshut†	3,08	1,72	1,36
Billingen	5,42	2,46	2,96	Tauberbischofs†	4,39	2,04	2,35	Kehl†	3,20	1,62	1,58	Mannheim	5,39	3,18	2,21	Waldbshut†	3,08	1,72	1,36	St. Blasien†	2,82	1,57	1,25
Mannheim	5,39	3,18	2,21	Lörrach†	4,28	2,54	1,74	Waldbshut†	3,08	1,72	1,36	Mannheim, Stadt	5,34	3,09	2,25	St. Blasien†	2,82	1,57	1,25	Ueberlingen†	2,69	1,57	1,12
Mannheim, Stadt	5,34	3,09	2,25	Pforzheim, Stadt†	4,26	2,76	1,50	St. Blasien†	2,82	1,57	1,25	Landesdurchschnitt	5,28	2,78	2,50	Ueberlingen†	2,69	1,57	1,12	Pfullendorf†	2,48	0,62	1,86
Landesdurchschnitt	5,28	2,78	2,50	Konstanz†	4,22	2,65	1,57	Ueberlingen†	2,69	1,57	1,12	Bruchsal	5,23	3,12	2,11	Pfullendorf†	2,48	0,62	1,86				
Bruchsal	5,23	3,12	2,11	Wolfach†	4,19	2,26	1,93	Pfullendorf†	2,48	0,62	1,86	Achern	5,08	3,20	1,88								
Achern	5,08	3,20	1,88																				

In nachstehender Uebersicht werden die Amtsbezirke in der Ordnung der 1897 stattgehabten Sterblichkeit an jeder einzelnen der beiderlei Krankheiten aufgeführt, unter Beifügung der Ziffern des Vorjahres. Darnach starben auf 1000 Einwohner

an Lungenschwindsucht:				an Lungenentzündung (einschl. akuter Bronchitis)				
in	1897	1896	in	1897	1896	in	1897	1896
Schwellingen	4,31	4,34	Lahr	2,37	2,13	Pforzheim, Land	3,61	2,12
Karlsruhe, Land	3,99	3,78	Staufen	2,32	2,93	Schwellingen	3,55	3,10
Ettlingen	3,58	3,58	Müllheim	2,32	2,01	Messtsch	3,39	3,60
Mannheim, Land	3,51	3,50	Pforzheim	2,28	2,34	Heidelberg, Land	3,31	3,50
Heidelberg, Stadt	3,41	3,33	Wolfach	2,26	2,43	Wertheim	3,25	2,32
Eberbach	3,40	3,94	Bühl	2,26	2,39	Ettlingen	3,21	2,32
Wiesloch	3,37	4,04	Adelsheim	2,26	2,25	Heidelberg	3,13	3,30
Freiburg, Stadt	3,24	3,69	Engen	2,24	2,24	Durlach	3,08	2,40
Heidelberg	3,24	3,30	Eppingen	2,24	1,69	Ettenheim	3,03	3,81
Achern	3,20	2,43	Freiburg, Land	2,12	1,86	Billingen	2,96	2,50
Mannheim	3,18	2,93	Oberkirch	2,11	2,49	Heidelberg, Stadt	2,90	3,04
Bruchsal	3,12	3,50	Stodach	2,07	2,50	Eberbach	2,85	2,24
Heidelberg, Land	3,12	3,29	Buchen	2,06	2,06	Adelsheim	2,76	3,06
Rastatt	3,11	3,38	Tauberbischofs†	2,04	2,91	Wiesloch	2,75	1,60
Mannheim, Stadt	3,09	2,72	Sinsheim	2,03	2,33	Freiburg	2,62	1,62
Karlsruhe	2,97	2,90	Schönau	2,01	2,07	Rastatt	2,62	1,62
Ettenheim	2,92	2,47	Bretten	2,00	1,96	Eppingen	2,62	2,35
Säckingen	2,91	2,49	Donaueshingen	1,94	2,61	Donaueshingen	2,61	2,60
Freiburg	2,86	3,07	Mosbach	1,91	2,14	Pforzheim	2,59	1,83
Wertheim	2,84	2,58	Breisach	1,89	1,99	Sinsheim	2,55	2,35
Landesdurchschnitt	2,78	2,63	Schopfheim	1,84	2,36	Landesdurchschnitt	2,50	2,16
Pforzheim, Stadt	2,76	2,70	Pforzheim, Land	1,83	2,00	Bretten	2,46	2,17
Waldfirch	2,74	1,53	Weinheim	1,81	2,87	Triberg	2,45	2,22
Baden	2,72	3,67	Waldbshut	1,72	1,67	Buchen	2,43	2,20
Konstanz	2,65	2,59	Bonnendorf	1,71	1,65	Freiburg, Land	2,37	2,30
Durlach	2,63	2,49	Triberg	1,62	1,80	Bonnendorf	2,35	1,71
Karlsruhe, Stadt	2,57	2,56	Kehl	1,62	0,91	Tauberbischofs†	2,35	2,02
Lörrach	2,54	2,46	Ueberlingen	1,57	1,64	Neustadt	2,34	2,08
Emmendingen	2,49	2,88	St. Blasien	1,57	2,61	Lahr	2,26	2,42
Billingen	2,46	2,16	Neustadt	1,47	1,67	Mannheim, Stadt	2,25	2,11
Messtsch	2,45	1,30	Pfullendorf	0,62	2,16	Säckingen	2,25	2,11
Offenburg	2,44	2,48				Engen	2,24	1,94
						Schopfheim	2,22	1,60
						Offenburg	2,22	2,05

Wie gewöhnlich fordern die Lungenkrankheiten in den einzelnen Amtsbezirken ihre Opfer in verschiedener Menge. Im Bezirk Schwellingen starben im Jahr 1897 an beiden Todesursachen zusammengenommen 7,86, im Bezirk Pfullendorf nur 2,48 von 1000 Einwohnern; der Schwindfucht für sich erlagen ebenfalls im Bezirk Schwellingen 4,81, im Bezirk Pfullendorf nur 0,52, den entzündlichen Brustkrankheiten im Bezirk Schwellingen 3,55, im Bezirk Ueberlingen 1,12 von 1000 Einwohnern. Dabei weist wie alljährlich ein Theil der Bezirke für beide Krankheitsarten eine große, ein anderer Theil eine geringe, ein dritter Theil aber eine verschieden hohe Sterblichkeit auf.

Die Sterbeziffer eines und desselben Bezirks ist in den beiden Jahren nicht selten recht erheblichen Schwankungen unterworfen. Unterschiede von $\frac{1}{2}$ ‰ und mehr finden sich bei der Sterblichkeit an Schwindfucht in folgenden 15 Amtsbezirken: Achern, Waldkirch, Mestkirch, Eppingen, Rehl (Zunahme); Eberbach, Wiesloch, Baden, Staufen, Tauberbischofsheim, Donaueschingen, Schopfheim, Weinheim, St. Blasien, Pfullendorf (Abnahme). Bei der Lungenentzündung u. sind die Differenzen noch häufiger: sie betragen $\frac{1}{2}$ ‰ und mehr in folgenden 20 Bezirken: Pforzheim Land, Wertheim, Ettlingen, Durlach, Eberbach, Wiesloch, Raftatt, Pforzheim, Bonndorf, Schopfheim, Schönau (Zunahme); Ettenheim, Stockach, Mannheim Land, Mosbach, Müllheim, Staufen, Säckingen, St. Blasien, Ueberlingen (Abnahme). Die Bezirke für die Schwindfucht bilden größere natürliche Gebiete gleichartiger und stetiger Sterblichkeit, während für die Lungenentzündung die Bezirke sich von Jahr zu Jahr weniger bestimmt und dabei anders gruppieren. So lassen sich für die Lungenschwindfucht auch im Jahr 1897 folgende Gebiete unterscheiden mit einer den allgemeinen Landesdurchschnitt zum Theil erheblich übersteigenden Sterbeziffer: die untere Rhein- und Neckargegend außer Weinheim (Bezirke Mannheim, Schwellingen, Heidelberg, Eberbach, Wiesloch, Durlach, Karlsruhe Land, Ettlingen, Raftatt); der östlich von jenem Gebiet gelegene Landestheil (Neckarhügel- und Bauland) hat fast durchgängig mäßig hohe und geringe Sterbeziffern. Auch die südlich anschließende Rheinebene aufwärts bis Säckingen mit seitlicher Ausdehnung über den nördlichen Schwarzwald und mit Einschluß des Kinzigthals weist im Ganzen eine recht geringe oder mäßig hohe Sterblichkeit auf; dasselbe gilt von dem dann südöstlich folgenden hohen und südlichen Schwarzwald nebst Baar und oberem Rheinthale sowie von der Donau- und Seegegend.

17. Allgemeine Uebersicht der Todesursachen.

Die medizinische Tabelle und die im Anschluß daran im Vorstehenden gegebenen Uebersichten und Bemerkungen berücksichtigen nur eine beschränkte Zahl von Todesursachen, welche im Jahr 1897 nur 13408 oder 35,8 ‰ aller Todesfälle herbeigeführt haben. Dagegen umfassen die Tabellen 2a und 2b (Seite 84—89) sämtliche Sterbefälle und sämtliche Todesursachen des Systems, beschränken sich aber auf Angaben für das Land im Ganzen, während die medizinische Tabelle bis auf die Amtsbezirke und die größeren Gemeinden zurückgeht.

In der Tabelle 2a sind bei jeder Todesart die Gestorbenen nach dem Geschlecht, die ärztlich behandelten Personen, sowie die im 1. Lebensjahr gestorbenen Kinder unterschieden; der Gesamtzahl ist der Durchschnitt des Jahrzehnts zur Vergleichung beigelegt. Die Tabelle 2b giebt für jede Todesursache lediglich die Gesamtzahl der Gestorbenen für jedes der zehn letzten Jahre, die Unterscheidung der Tabelle 2a aber für den Durchschnitt des Jahrzehnts 1888/97.

In der umstehenden Uebersicht werden die Ergebnisse des Jahres 1897 und des Durchschnittes der 10 Jahre 1888/97 für die Abtheilungen und Gruppen der Todesursachen zusammengefaßt, und zwar in der weiteren Ausführung, daß einerseits die im 1. Lebensjahr und im Alter von 1 Jahr und darüber Gestorbenen und die männlichen und weiblichen Personen gesondert angegeben sind, andererseits neben der Darstellung aller Gestorbenen eine besondere für die in ärztlicher Behandlung Gestorbenen gegeben ist. Den Zahlenreihen der überhaupt Gestorbenen sind die procentalen Antheile der einzelnen Krankheitsgruppen an deren Gesamtzahl, den einzelnen Zahlen der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen das Verhältniß derselben zu den an den Krankheiten der Abtheilung überhaupt Gestorbenen beigelegt.

Diese Uebersicht läßt erkennen, wie die Abtheilungen der Krankheiten u. sehr ungleich zu der Gesamtzahl der Sterbefälle beitragen und in denselben die ärztliche Behandlung in ungleichem Maße stattfindet. Während auf die Krankheiten der Organe im Berichtsjahr wie im zehnjährigen

Gruppen der Todesursachen.	a. Zum Jahre 1897.										b. Zur Durchschnitt der Jahre 1888 bis 1897.									
	Untereinstufige					Hochereinstufige					Untereinstufige					Hochereinstufige				
	Sehl.	%	Sehl.	%	Sehl.	%	Sehl.	%	Sehl.	%	Sehl.	%	Sehl.	%	Sehl.	%	Sehl.	%	Sehl.	%
I. Infektionskrankheiten.	621	4,85	1754	7,13	2375	6,35	1140	12,35	649	5,44	2770	10,83	3419	8,94	1635	17,84	839	9,51	1784	0,01
II. Pneumonie.	1	0,01	74	0,30	75	0,20	55	20	0,8	0,5	0,002	0,5	0,002	0,4	0,1	0,002	0,001	0,07	14	0,27
III. Vergiftungen.	18	0,14	8	0,01	21	0,05	10	11	14	0,12	4	0,02	18	0,05	8	10	0,04	0,05	10	0,04
IV. Parafiten.	20	0,15	1016	4,13	1036	2,77	849	186	28	0,23	914	3,47	942	2,46	765	177	3,93	0,94	177	3,93
V. Gewaltthamer Tod.	3195	24,94	5873	23,87	9068	24,23	4824	4744	2899	24,30	5978	22,69	8872	23,20	4259	4613	21,86	24,53	12129	65,33
VI. Störungen der Entwü- lung und Ernährung.	8954	69,89	15879	64,52	24833	66,36	12706	12127	8316	69,72	16511	62,85	24857	64,99	12738	12129	65,33	64,84	12129	65,33
VII. Krankheiten der Organe.	40	0,31	41	0,17	81	0,22	49	32	41	0,34	87	0,14	78	0,20	42	38	0,22	0,19	38	0,22
a. der Haut und Muskeln.	5	0,04	139	0,77	124	0,32	86	103	9	0,08	325	0,85	334	0,61	114	130	0,58	0,54	130	0,58
b. der Knochen und Gelenke.	59	0,46	2276	9,25	3333	6,24	1021	1314	37	0,31	2014	7,65	2051	5,36	894	1157	4,59	6,17	1157	4,59
c. des Gefäßsystems.	3487	27,22	2922	11,47	8399	15,86	3420	2889	3666	30,73	2814	10,70	8480	16,94	8539	2956	18,05	15,77	2956	18,05
d. des Nerven Systems u. der Sinnesorgane.	1603	12,51	8143	33,09	9746	26,04	4921	4825	1494	12,53	9163	34,82	10567	27,87	5355	5292	27,54	28,20	5292	27,54
e. der Atmungsorgane.	3730	29,27	1597	6,49	3347	14,29	2808	2539	3080	25,65	1540	5,85	4600	12,03	2416	2184	12,40	11,54	2416	12,40
f. der Verdauungsorgane.	10	0,08	604	2,82	704	1,88	401	303	9	0,08	859	2,37	834	1,66	375	269	1,92	1,37	269	1,92
g. der Harn- u. Geschlechtsorgane.	—	—	117	0,45	117	0,31	—	117	—	—	133	0,47	133	0,32	—	123	0,55	0,55	123	0,55
h. der weiblichen Geschlechtsorgane.	3	0,02	8	0,03	11	0,03	8	7	21	0,18	51	0,19	72	0,19	35	37	0,16	0,20	37	0,16
VIII. Unbekannt u. nicht angegeben.	12812	100,00	24610	100,00	37422	100,00	19090	18330	11928	100,00	26318	100,00	38246	100,00	19452	18764	100,00	100,00	18764	100,00

Gruppen der Todesursachen.	B. Verrücklich Behandelte unter den Geforbeneu.																			
	Sehl.	%	Sehl.	%	Sehl.	%	Sehl.	%	Sehl.	%										
	I. Infektionskrankheiten.	475	76,49	1839	93,44	2114	89,01	1020	1094	492	75,81	2544	91,48	3036	88,80	1413	1593	88,26	89,29	1593
II. Pneumonie.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Vergiftungen.	1	100,00	55	74,34	56	74,67	41	15	0,5	62,50	53	61,54	53	80,30	42	11	80,77	78,57	11	80,77
IV. Parafiten.	11	61,11	3	100,00	14	56,67	7	7	7	42,86	4	100,00	11	50,56	6	5	62,80	50,00	5	62,80
V. Gewaltthamer Tod.	6	30,90	356	35,04	362	34,94	277	85	8	32,14	278	30,42	286	30,47	234	62	29,41	35,03	62	29,41
VI. Störungen der Entwü- lung und Ernährung.	1169	36,59	3651	62,68	4850	53,48	2315	2535	895	30,87	3458	57,89	4353	49,06	2081	2392	49,39	49,59	2392	49,39
VII. Krankheiten der Organe.	4714	52,65	14116	88,90	18830	75,83	9446	9884	8869	46,52	14519	87,78	18388	73,98	9270	9118	72,83	75,18	9118	72,83
a. der Haut und Muskeln.	36	90,00	38	92,63	74	91,36	47	27	35	85,37	33	89,19	68	87,13	37	31	86,10	86,11	31	86,10
b. der Knochen und Gelenke.	5	100,00	176	93,12	181	93,30	78	108	9	100,00	291	89,33	210	89,75	104	106	91,23	88,33	106	91,23
c. des Gefäßsystems.	37	62,71	2018	88,60	2033	87,92	872	1181	21	56,76	1767	88,73	1808	83,15	784	1044	85,46	90,33	1044	85,46
d. des Nerven Systems u. der Sinnesorgane.	697	19,99	2332	79,09	2939	46,43	1523	1406	616	16,80	2176	77,36	2732	43,09	1469	1323	41,71	44,73	1323	41,71
e. der Atmungsorgane.	1391	86,77	7405	90,94	8796	90,24	4471	4325	1231	82,40	8236	89,77	9457	88,74	4704	4633	89,36	88,11	4633	89,36
f. der Verdauungsorgane.	2588	67,63	1461	91,48	3994	74,79	2004	1935	1949	63,69	1374	89,22	3233	72,24	1737	1586	71,90	72,52	1586	71,90
g. der Harn- u. Geschlechtsorgane.	10	100,00	882	98,27	692	98,30	391	301	8	88,89	613	97,92	620	97,79	365	255	97,33	98,46	255	97,33
h. der weiblichen Geschlechtsorgane.	—	—	106	90,60	106	90,60	—	106	—	—	110	89,43	110	89,43	—	110	89,43	89,43	110	89,43
VIII. Unbekannt u. nicht angegeben.	2	66,67	3	37,50	5	45,45	2	106	2	9,52	13	25,49	15	20,33	7	8	20,00	21,62	8	20,00
Zur Ganzen.	6378	49,78	19856	80,68	26234	70,10	18111	18128	5273	44,21	20869	79,30	26142	68,35	13053	18089	67,00	69,76	18089	67,00

Durchschnitt nahezu $\frac{2}{3}$ (66,36 bezw. 64,99 %) aller Gestorbenen kommen, erscheinen die Zoonosen 1897 mit 0,01 und im Durchschnitt mit 0,001, die Parasiten mit 0,05 bezw. 0,03 und die Vergiftungen mit 0,20 bezw. 0,17 % der Todesfälle. Unter den Krankheiten der Organe verursachten die der Athmungsorgane mit 26,04 % im Jahr 1897 und 27,87 % im Durchschnitt des Jahrzehnts 1888/97 die größte Zahl an Sterbefällen; alsdann folgen die Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane mit 16,86 bezw. 16,94 % sowie der Verdauungsorgane mit 14,29 bezw. 12,03 %. Und zwar stellten bei den beiden letztgenannten Gruppen die Säuglinge mit zusammen 56,49 bezw. 56,38 vom Hundert, bei den Krankheiten der Athmungsorgane die Uebereinjährigen mit 33,09 bezw. 34,82 vom Hundert die größten Antheile an den Todesfällen. Von den an Störungen der Entwicklung und Ernährung Gestorbenen waren nur 53,48 bezw. 49,06 %, von den an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane Gestorbenen dagegen 98,30 bezw. 97,79 % ärztlich behandelt. Ebenso tritt die ungleiche Häufigkeit des Sterbens und der ärztlichen Behandlung der Unter- und der Uebereinjährigen, sowie der beiden Geschlechter bei den einzelnen Krankheitsgruppen hervor. So starben z. B. an Störungen der Entwicklung und Ernährung von den Männern 28,65 bezw. 21,86 %, von den Frauen 25,88 bezw. 24,59 %; von den daran gestorbenen Untereinjährigen waren 36,59 bezw. 30,87, von den Uebereinjährigen 62,68 bezw. 57,89 %, von den Männern 53,54 bezw. 48,39, von den Frauen 53,44 bezw. 49,69 % ärztlich behandelt worden. Ueberhaupt hatten im Jahr 1897 bezw. durchschnittlich 49,78 bezw. 44,21 % der Unter- und 80,68 bezw. 79,30 % der Uebereinjährigen, 68,88 bezw. 67,00 % der Männer und 71,59 bezw. 69,76 % der Frauen ärztliche Behandlung erfahren. Die Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe war also bei den Uebereinjährigen nahezu noch einmal so groß als bei den Kindern im 1. Lebensjahr und bei weiblichen Personen etwas häufiger als bei männlichen.

Noch größere Verschiedenheiten treten in der Tabelle 2 b bei den 160 einzelnen Arten der Todesursachen hervor. Im Durchschnitt sowie im Jahr 1897 kommt nahezu die Hälfte aller Gestorbenen auf folgende 6: Lungenschwindsucht, Eklampsie der Kinder, Altersschwäche, Lungenentzündung, Kinderdurchfall und Lebensschwäche der Neugeborenen. Die nachstehenden 42 Ursachen, auf die zusammen 91,86 % aller Sterbefälle entfallen, fordern jährlich im Durchschnitt 100 und mehr Gestorbene, davon 4 mehr als 3000, weitere 6 mehr als 1000 und fernere 7 500 und mehr.

Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle
89	Lungenschwindsucht	4692	64	Herzlähmung	641	31c	Ertrinken	189
77a	Eklampsie der Kinder	3618	1	Masern	516	31d	Erhängen	184
39	Altersschwäche	3315	128	Nierenentzündung	500	12	Abdominaltyphus	180
88	Lungenentzündung	3262	67	Hirnhautentzündung	491	94	Brustfellentzündung	180
111	Kinderdurchfall	1848	91	Lungenemphysem	466	123	Chron. Leberatrophie	165
32	Lebensschwäche d. Neugeb.	1814	68	Tuberk. Hirnhautentzdg.	456	37	Drüsenabzehrung	156
42	Krebs und Geschwülste	1607	6	Krupp	451	35	Englische Krankheit	139
112	Brechdurchfall	1370	47	Wassersucht	417	10	Kindbettfieber	138
71	Gehirnschlag	1194	7	Keuchhusten	381	2	Scharlach	135
62	Herzfehler	1119	8	Grippe	379	103	Darmverschluss	114
36	Abzehrung der Kinder	998	100	Unterleibsentzündung	350	61	Herzvergrößerung	111
86	Acute Bronchitis	966	31k	Sturz und Schlag	243	65	Arterienkrankheiten	103
5	Diphtheritis	956	58	Knochen- u. Gelenkentzdg.	225	73	Geisteskrankheit	103
87	Chron. Bronchialkatarrh	651	93	Lungenlähmung	206	31i	Ueberfahren	102

II. Die Erkrankungen an Infektionskrankheiten.

An den Infektionskrankheiten, über welche regelmäßig Anzeige erstattet wird, erkrankten nach der Tabelle 3 (Seite 90/95) im Berichtsjahre 7478 Personen, und zwar an Diphtherie 4478, Scharlach 1145, Typhus 1511, Kindbettfieber 344; Blattern (Pocken) kamen nicht vor. Von diesen Erkrankten starben an Diphtherie 489, Scharlach 54, Typhus 192, Kindbettfieber 92, oder vom Hundert der Erkrankten an Diphtherie 10,9, Scharlach 4,7, Typhus 12,7, Kindbettfieber 26,7. Bezüglich der Bezirke ergab sich Folgendes:

6878 49,76 19856 80,68 26294 70,10 13111 13128 5273 44,21 20869 79,30 26142 68,35 13053 13089 67,00 69,76.

Keine Erkrankungsfälle wurden gemeldet: an Typhus in den Bezirken Pfullendorf, Stodach, Bomdorf und St. Blasien, an Kindbettfieber in Pfullendorf, an Scharlach in Mespelkirch, Pfullendorf und Bounndorf; dagegen kamen Erkrankungen an Diphtherie in allen Bezirken des Landes vor.

Höchste Erkrankungszahlen wurden aus folgenden Bezirken bezw. Städten gemeldet:

an Diphtheritis (mehr als 100 Fälle)		an Scharlach (50 und mehr Fälle)		an Typhus (mehr als 50 Fälle)		an Kindbettfieber (10 und mehr Fälle)	
Heidelberg	376	Offenburg	141	Pforzheim	763	Freiburg	24
Karlsruhe	316	Freiburg	111	Pforzheim, St.	595	Karlsruhe	21
Rehl	313	Mannheim	110	Pforzheim, Land	168	Freiburg, St.	18
Karlsruhe, St.	277	Freiburg, St.	97	Karlsruhe	81	Durlach	17
Offenburg	245	Freiburg, Stadt	84	Heidelberg	77	Mannheim	17
Heidelberg, St.	217	Pforzheim	69	Ettlingen	69	Heidelberg	16
Mannheim	200	Dreisbach	67	Karlsruhe, St.	66	Karlsruhe, St.	16
Bruchsal	195	Karlsruhe	66	Offenburg	58	Offenburg	15
Emmendingen	166	Heidelberg	59	Achern	57	Freiburg	13
Heidelberg, Land	159	Karlsruhe, St.	55			Landeshochschule	13
		Pforzheim, St.	50			Konstanz	12
						Bühl	11
						Rehl	10

Die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren an den Erkrankungen beteiligt mit 30,77 % an der Diphtherie, 47,77 % am Scharlach, 60,56 % am Typhus, 25,29 % am Kindbettfieber. Da die Einwohnerzahl dieser Gemeinden 28,54 % der Gesamtbevölkerung beträgt, hatten dieselben für Diphtherie, Scharlach und Typhus eine verhältnismäßig sehr viel größere, für Kindbettfieber eine geringere Erkrankungsziffer als die übrigen Gemeinden des Großherzogthums.

III. Das Impfgeschäft von 1897.

Die Ergebnisse des Impfgeschäfts für das Jahr 1897 sind in der folgenden Tabelle 4 in der üblichen Weise zur Darstellung gebracht.

Tabelle 4. Impfpflichtige, Geimpfte und Ungeimpfte im Jahr 1897.

Impfpflichtige.	Kleine Kinder		Zusammen	Geimpfte und Ungeimpfte.	Kleine Kinder		Zusammen
	Schüler	Schüler			Schüler	Schüler	
Zur Erst- bez. Wiederimpfung Vorzustellende nach den Bezirkslisten zu Anfang 1897	61 491	38 008	99 499	Von diesen wurden geimpft*):			
Im Laufe des Jahres zugezogene Impfpflichtige	2 445	335	2 780	a. mit Erfolg	42 326	35 231	77 557
zusammen	63 936	38 343	102 279	b. ohne Erfolg	1 185	1 569	2 754
				c. mit unbekanntem Erfolg, weil nicht zur Nachschau erschienen	93	93	186
				zusammen	43 604	36 893	80 497
Davon sind:				Ungeimpft blieben, weil			
a. gestorben	8 224	63	8 287	a. auf Grund ärztlicher Zeugnisse vorläufig zurückgestellt	3 670	433	4 103
b. verzogen	3 247	534	3 781	b. nicht aufzufinden oder zufällig abwesend	223	229	452
c. von der Impfpflicht befreit, weil während der letzten 5 Jahre an den natürlichen Blattern erkrankt	1	1	2	c. vorschriftswidrig der Impfung entzogen	1 395	66	1 461
d. bereits 1896 oder in den vorhergehenden Jahren mit Erfolg geimpft	3 246	124	3 370	zusammen	5 288	728	6 016
e. bereits in vorhergehenden Jahren mit Erfolg geimpft, aber erst 1897 zur Nachschau vorgestellt	326		326	Die vorschriftswidrig der Impfung Entzogenen waren			
zusammen	15 044	722	15 766	% der Impflinge	2,18	0,17	1,43
Insomit blieben impfpflichtig	48 892	37 621	86 513	dagegen 1896	1,62	0,32	1,13
				" 1895	1,88	0,26	1,25
				" 1894	2,29	0,20	1,45
				" 1893	1,20	0,21	0,79
				" 1892	1,06	0,21	0,72
				" 1891	0,95	0,13	0,61
				" 1890	0,51	0,24	0,39

* Sämtliche Impflinge wurden mit Thierimpfung geimpft; Impfung mit Menschenimpfung kommt seit 1887 nicht mehr vor.
 *) darunter 100 Schüler, welche wegen Aufhören des Besuchs einer die Impfpflicht bedingenden Lehranstalt nicht geimpft wurden.

IV. Die Krankenanstalten 1897.

In den folgenden Uebersichten werden Zahl, Umfang und Benützung der öffentlichen Krankenanstalten und der Privatkrankenanstalten mit mehr als 10 Betten dargestellt; die Angaben beruhen auf den für die Reichsstatistik jährlich gemachten Erhebungen und umfassen die allgemeinen Krankenanstalten, die Entbindungs-, die Augenheil- und die Irrenanstalten (einschl. der Anstalten für Epileptische und Idioten). Ferner sind Angaben über die 9 Kreispflegeanstalten angefügt, in denen meist unterstützungsbedürftige, körperlich oder geistig gebrechliche Personen, die sich zur Aufnahme in eine der vorbenannten Anstalten nicht eignen, auf Kosten der Kreise (Landarmenverbände) oder von Gemeinden (Ortsarmenverbänden) verpflegt werden.

A. Krankenanstalten.

1. Allgemeine Angaben.

a. Abgefürzte kreisweise Darstellung.

Tabelle 5a.

Kreis.	Allgemeine Krankenanstalten*)					Entbindungsanstalten			Irrenanstalten			Def- fent- liche An- stalten im Ganzen	Privatanstalten			Anstalten über- haupt *)					
	im Gan- zen	davon gehören	Angenheilkranke- anstalten (nur Kranke)			im Gan- zen	davon gehören	im Gan- zen	davon gehören	im Gan- zen	Allgemeine Krankenanstalten		Augen- heilkranke Anstalten	Entbindungs- anstalt	im Gan- zen						
Konstanz.	17	13	1	2	1	—	—	—	—	—	17	3	1	1	5	22					
Billingen	13	11	2	—	—	1	—	1	—	—	14	—	—	—	1	14					
Waldshut	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	1	6					
Freiburg.	21	15	2	2	—	1	1	—	2	2	25	1	—	—	1	26					
Lörrach	11	9	2	—	—	—	—	—	1	1	12	—	—	—	—	12					
Offenburg	15	10	2	3	—	—	—	—	1	1	16	2	—	—	2	18					
Baden	11	9	1	1	—	1	—	1	1	1	13	4	1	—	5	18					
Karlsruhe	14	9	—	4	1	1	—	1	1	1	16	2	1	—	3	19					
Mannheim	10	5	2	1	2	1	—	1	—	—	11	—	—	—	—	11					
Heidelberg	15	4	8	1	2	1	1	—	1	1	18	3	—	—	3	21					
Rosbach.	10	—	8	2	—	—	—	—	—	1	11	1	—	—	1	12					
Großherzth. 1897	142	6	100	17	15	4	2	6	2	1	3	8	5	1	2	158	17	3	1	21	179
" 1896	139	5	100	16	14	4	2	6	2	1	3	8	5	1	2	155	14	3	—	17	172

*) Außerdem bestehen bei den allgemeinen Krankenanstalten (im Kreise Karlsruhe) 3 besondere Augenheilabteilungen und 1 besondere Entbindungsabteilung.

b. Eingehendere Darstellung für das Großherzogthum.

Tabelle 5b.

Art der Anstalten und Angaben*).	Allgemeine Kranken- anstalten.	Augenheil- anstalten.	Entbin- dungs- anstalten.	Irren- anstalten.	Anstalten im Ganzen.	
					1897	1896
a. Anstalten mit öffentlichem Charakter	142	2	6	8	158	155
Zahl der Betten (Plätze) für Kranke	5 647	125	156	2 910	8 888	8 726
Im Laufe des Jahres verpflegte Kranke	45 049	1 372	1 352	3 930	51 703	48 972
davon männlich	27 658	764	—	2 012	30 434	28 754
" weiblich	17 391	608	1 352	1 918	21 269	20 218
Verpflegungstage	1 081 773	26 119	33 079	1 006 856	2 147 827	2 062 582
b. Anstalten mit privatem Charakter (soweit sie mehr als 10 Betten haben)	17	3	1	—	21	17
Zahl der Betten (Plätze) für Kranke	838	74	12	—	924	797
Im Laufe des Jahres verpflegte Kranke	2 884	754	34	—	3 672	2 783
davon männlich	1 704	428	—	—	2 132	1 602
" weiblich	1 180	326	34	—	1 540	1 181
Verpflegungstage	163 201	13 621	3 280	—	180 102	131 943
c. Anstalten im Ganzen	159	5	7	8	179	172
Zahl der Betten (Plätze) für Kranke	6 485	199	168	2 910	9 762	9 523
Im Laufe d. Jahres verpflegte Kranke	47 933	2 126	1 386	3 930	55 375	51 755
davon männlich	29 362	1 192	—	2 012	32 566	30 356
" weiblich	18 571	934	1 386	1 918	22 809	21 399
Verpflegungstage	1 244 974	39 740	36 359	1 006 856	2 327 929	2 194 525
davon kommen auf männliche Kranke	708 379	22 067	—	501 470	1 231 916	1 152 986
" " weibliche "	536 595	17 673	36 359	505 386	1 096 013	1 041 539

*) Die Angaben für die 3 bei den allgemeinen Krankenanstalten bestehenden Augenheilabteilungen sind hier bei denen der allgemeinen Krankenanstalten enthalten; ebenso auch die der besonderen Entbindungsabteilung.

2. Krankheitsarten und Bewegung.

Tabelle 5c. a. Allgemeine Krankenanstalten.

Krankheiten. (a. = Anstalten mit öffentlichem Charakter.) (b. = Privatanstalten mit mehr als 10 Betten.)	1896.			1897.													
	Im Laufe des Jahres behandelte Fälle			Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Fälle			Abgang im Laufe des Jahres überhaupt		davon durch Tod		Bestand am Schluß des Jahres		
	männl.	weibl.	zuf.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	zuf.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
Behandelte Fälle.																	
I. Entwicklungskrankheiten	a.	272	573	845	34	39	251	556	285	595	880	253	540	64	68	32	55
	b.	38	26	64	4	—	73	48	77	48	125	75	47	—	—	2	1
II. Infektions- u. allgem. Krankheiten	a.	4865	4300	9165	280	296	4649	4251	4929	4547	9476	4605	4265	277	283	324	282
	b.	254	145	399	31	15	266	168	297	183	480	283	171	6	1	34	12
III. Lokalisierte Krankheiten	a.	22306	12448	34754	1408	757	21873	12094	23281	12851	36132	21843	12030	861	565	1438	821
	b.	950	720	1670	97	95	1319	871	1416	966	2382	1256	854	13	6	160	112
Und zwar Krankheiten																	
A. des Nervensystems	a.	1332	1153	2485	114	106	1235	1065	1349	1171	2520	1243	1061	75	50	106	110
	b.	298	159	457	20	20	346	200	366	220	586	345	209	2	1	21	11
B. " Ohren	a.	200	188	388	17	3	414	219	431	222	653	417	211	8	1	14	11
	b.	6	4	10	—	1	2	4	2	5	7	2	5	—	—	—	—
C. der Augen	a.	817	644	1461	39	38	810	609	849	647	1496	798	617	2	5	51	30
	b.	2	2	4	—	—	—	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—
D. " Athmungs- werkzeuge	a.	4315	1869	6184	353	143	4084	1723	4437	1866	6303	4071	1733	402	222	366	133
	b.	286	264	550	57	65	259	293	316	358	674	249	278	6	4	67	80
E. " Circulations- werkzeuge	a.	1087	665	1752	72	47	990	643	1062	690	1752	990	632	76	71	72	58
	b.	37	33	70	3	1	34	28	37	29	66	35	29	—	—	2	—
F. " Verdauungs- werkzeuge	a.	2718	2239	4957	136	103	2924	2234	3060	2337	5397	2933	2221	127	88	127	116
	b.	91	97	188	2	3	85	81	87	84	171	81	78	—	1	6	6
G. " Geschlechts- werkzeuge	a.	617	2390	3007	38	107	595	2332	633	2439	3072	593	2311	46	76	40	128
	b.	51	80	131	—	4	39	88	39	92	131	38	88	3	—	1	4
H. " äußeren Be- deckungen	a.	4499	1711	6210	185	76	4167	1621	4352	1697	6049	4168	1616	20	13	184	81
	b.	27	10	37	—	—	27	14	27	14	41	27	14	—	—	—	—
I. " Bewegungs- werkzeuge	a.	1768	925	2693	152	86	1742	986	1894	1072	2966	1721	975	21	23	173	97
	b.	73	63	136	2	—	211	143	213	143	356	188	132	2	—	25	11
K. Mechanische Ver- legungen	a.	4953	714	5667	302	48	4912	662	5214	710	5924	4909	653	84	16	305	57
	b.	79	8	87	13	1	316	18	329	19	348	291	19	—	—	38	—
IV. Anderweitige Krankheiten u. un- bestimmte Diag- nosen	a.	469	445	914	37	42	463	437	500	479	979	477	450	85	25	23	29
	b.	8	13	21	1	—	25	9	26	9	35	25	8	—	—	1	1
Zusammen	a.	27912	17766	45678	1759	1194	27236	17338	28995	18472	47467	27178	17285	1237	941	1817	1187
	b.	1250	904	2154	133	110	1693	1096	1816	1206	3022	1619	1080	19	7	197	126
Im Ganzen a. und b.		29162	18670	47832	1892	1244	28919	18434	30811	19678	50489	28797	18365	1256	948	2014	1313
1896		—	—	—	1747	1198	27415	17472	29163	18670	47832	27270	17426	1168	850	1892	1244
Behandelte Personen.																	
1897	a.	26120	16525	42645	1685	1083	25973	16308	27658	17391	45049	25929	16279	1209	922	1729	1112
	b.	1291	866	2067	133	110	1571	1070	1704	1180	2884	1512	1054	19	7	192	126
Zusammen		27321	17391	44712	1818	1193	27544	17378	29362	18571	47933	27441	17333	1228	929	1921	1238
1896		—	—	—	1621	1131	25700	16260	27321	17391	44712	25503	16198	1162	848	1818	1193

Noch: 2. Krankheitsarten und Bewegung.

b. Augenheilkrankheiten.

Tabelle 5d.

Krankheiten. (Wegen der Bezeichnungen a. und b. siehe Tabelle 5c.)	1896.			1897.									Außerdem wurden im Jahr 1897 in den mit allg. Kranken- anstalten verbunde- nen 3 Augenheil- abteilungen *) Fälle behandelt						
	Im Laufe des Jahres behandelte Fälle			Bestand zu An- fang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Fälle			Abgang im Laufe des Jahres					Bestand am Schlusse d. Jahres			
	männl.	weibl.	zuf.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	zuf.	männl.	weibl.	zuf.	männl.	weibl.	zuf.			
Behandelte Fälle.																			
Erkrankungen der Augenslider . . .	a.	22	16	38	1	—	27	23	28	23	51	28	22	—	1	—	22	27	49
	b.	20	21	41	—	—	23	14	23	14	37	23	14	—	—	—	—	—	—
„ Thränenorgane . . .	a.	16	9	25	2	—	6	19	8	19	27	7	19	1	—	—	18	33	51
	b.	16	15	31	—	1	13	14	13	15	28	13	15	—	—	—	—	—	—
„ Orbitalgebilde . . .	a.	3	2	5	—	—	10	3	13	3	13	8	3	2	—	—	9	11	20
	b.	3	3	6	—	—	8	2	8	2	10	8	2	—	—	—	—	—	—
„ Bindehaut . . .	a.	31	37	68	3	—	33	31	36	31	67	34	31	2	—	—	42	53	95
	b.	63	49	112	1	1	78	53	79	54	133	77	52	2	2	—	—	—	—
„ Cornea . . .	a.	221	226	447	6	4	211	239	217	243	460	211	237	6	6	—	204	193	397
	b.	139	129	268	4	5	148	134	152	139	291	147	136	5	3	—	—	—	—
„ Iris . . .	a.	46	35	81	2	2	43	58	45	60	105	44	59	1	1	—	22	33	55
	b.	26	26	52	2	1	32	19	34	20	54	33	17	1	3	—	—	—	—
„ Chorioidea . . .	a.	28	26	54	2	2	23	22	25	24	49	24	23	1	1	—	19	24	43
	b.	9	10	19	1	—	15	8	16	8	24	14	8	2	—	—	—	—	—
„ Retina mit den Sehnerven . . .	a.	50	24	74	3	1	48	38	51	39	90	47	36	4	3	—	30	11	41
	b.	34	10	44	1	1	20	21	21	22	43	21	21	—	1	—	—	—	—
des Linsensystems . . .	a.	110	128	238	5	4	151	87	156	91	247	153	91	3	—	—	47	46	92
	b.	73	34	107	1	2	67	48	68	50	118	65	48	3	2	—	—	—	—
„ Glaskörpers . . .	a.	9	1	10	—	—	10	3	10	3	13	10	3	—	—	—	4	2	6
	b.	10	8	18	1	—	17	8	18	8	26	18	8	—	—	—	—	—	—
der Augenmuskeln . . .	a.	26	15	41	—	—	30	38	30	38	68	29	38	1	—	—	23	31	59
	b.	22	20	42	—	—	23	18	23	18	41	21	18	2	—	—	—	—	—
Neubildungen des Bulbus . . .	a.	13	6	19	2	—	16	9	18	9	27	18	8	—	1	—	6	2	7
	b.	5	5	10	—	—	1	1	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
Verletzungen des Bulbus . . .	a.	147	18	165	2	—	121	15	123	15	138	121	15	2	—	—	32	11	43
	b.	60	9	69	1	—	58	10	59	10	69	57	10	2	—	—	—	—	—
Refraktionsanomalien . . .	a.	6	8	14	—	—	13	18	13	18	31	12	18	1	—	—	31	13	44
	b.	8	3	9	1	—	15	4	16	4	20	16	4	—	—	—	—	—	—
Akkommodationsano- malien, Glaucom und Sonstiges . . .	a.	13	18	31	—	—	7	17	7	17	24	7	17	—	—	—	6	—	6
	b.	5	7	12	—	—	2	1	2	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
Zusammen . . .	a.	741	569	1310	28	13	749	620	777	633	1410	753	620	24	13	—	—	—	—
	b.	491	349	840	13	11	520	355	533	366	899	516	355	17	11	—	—	—	—
Im Ganzen a. und b.		1232	918	2150	41	24	1269	975	1310	999	2309	1269	975	41	24	—	519	479	998
1896 . . .		—	—	—	35	28	1197	890	1232	918	2150	1191	894	41	24	—	525	444	969
Behandelte Personen.																			
1897 . . .	a.	730	545	1275	28	13	736	595	764	608	1372	740	595	24	13	—	—	—	—
	b.	401	315	716	13	11	415	313	428	326	754	411	315	17	11	—	—	—	—
Zusammen . . .		1131	860	1991	41	24	1151	910	1192	934	2126	1151	910	41	24	—	519	479	998
1896 . . .		—	—	—	35	28	1096	832	1131	860	1991	1090	836	41	24	—	525	444	969

*) Diese sämtlichen Fälle sind schon bei den Angaben der allgemeinen Krankenanstalten (Tabelle 5c) einbezogen.

Tabelle 5 e.

c. Entbindungsanstalten.

Jahre.	Im Laufe des nebenstehenden Jahres										
	verpflegte		Ent- bundene	darunter					geborene Kinder (*)	darunter	
	Schwangere und Wöchnerinnen	Neugeborene		erkrankten am Kindbettfieber	starben über- haupt	am Kind- bettfieber insbesondere	mit operativer Hilfe entbunden	tob- geboren		ge- storben	
a. Mit öffentlichem Charakter.											
1892 . . .	900	821	821	10	11	7	95	4	825	61	24
1893 . . .	1025	930	944	8	6	2	81	4	951	50	31
1894 . . .	1178	1056	1086	6	8	3	113	6	1084	61	36
1895 . . .	1087	990	1013	2	8	1	95	4	999	49	22
1896 . . .	1279	1147	1168	4	6	1	106	1	1159	74	40
1897 . . .	1352	1281	1289	2	10	—	116	5	1284	53	32
b. Mit privatem Charakter.											
1897 . . .	34	27	29	—	—	—	4	—	29	2	—
**) c. Mit einer allgemeinen Krankenanstalt verbundene besondere Entbindungsabtheilung.											
1892 . . .	32	32	32	—	—	—	4	1	32	5	7
1893 . . .	43	45	40	2	3	—	3	—	42	2	4
1894 . . .	45	47	43	2	—	—	2	—	44	2	5
1895 . . .	43	40	43	1	—	—	1	—	43	3	6
1896 . . .	51	46	51	—	—	—	7	—	52	6	5
1897 . . .	56	56	56	1	1	1	2	—	56	3	4

*) auschl. vorzeitige Geburten; **) Diese Zahlen sind unter a. und b. nicht enthalten, dagegen bei Tabelle 5 e berücksichtigt.

d. Irrenanstalten.

(sämmlich mit öffentlichem Charakter).

Tabelle 5 f.

Stand und Bewegung in den Anstalten	Krankheitsformen.												Fälle im Ganzen				
	Einfache Seelen- führung (Melan- cholie, Manie)		Paralytische Seelen- führung		Seelen- führung mit Epilepsie		Epilepsie (ohne febrile Störungen)		Imbecillität, Idiotismus und Kretinismus		Delirium potatorum		Nicht- geistes- transt		m.	w.	Zus.
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.					
Bestand zu An- fang des Jahres	824	976	86	59	96	63	31	19	325	218	20	4	10	16	1392	1355	2747
Zugang im Laufe des Jahres . .	367	433	102	59	46	16	8	5	67	39	22	2	8	9	620	563	1183
Behandelte Fälle im Ganzen . .	1191	1409	188	118	142	79	39	24	392	257	42	6	18	25	2012	1918	3930
Davon Fälle nachge- wiesener Erblichkeit	661	759	71	39	58	23	—	—	56	31	5	1	2	2	853	855	1708
Abgang im Laufe des Jahres . .	382	412	106	55	40	11	10	5	59	31	22	2	9	4	628	520	1148
Davon durch Tod . .	32	54	36	12	7	5	1	—	23	13	1	—	1	—	101	84	185
Bestand am Schlusse d. Jahres	809	997	82	63	102	68	29	19	333	226	20	4	9	21	1384	1398	2782
1896 behandelte Fälle im Ganzen	1117	1385	174	94	139	80	33	23	378	259	32	5	31	23	1904	1869	3773

(Fortsetzung des Textes von Seite 107.)

Aus den Angaben in Tabelle 5 b auf S. 107 lassen sich folgende Verhältniszahlen ableiten:

Es kommen	bei den allgem. Kranken-	bei den Augenheil- anstalten	bei den Ent- bindungs-	bei den Irren-	bei den Anstalten im Ganzen
	1897	1896	1897	1896	1897
auf 1 Anstalt durchschnittlich Betten . . .	40,8	39,8	24,0	363,7	54,5
" 1 Bett " Kranke . . .	7,4	10,7	8,4	1,3	5,7
" 1 Kranken " Verpflegungstage	26,0	18,7	26,2	256,2	42,0
und zwar auf 1 männlichen Kranken . . .	24,1	18,5	—	249,2	37,8
" " " 1 weiblichen " . . .	28,9	18,9	26,2	263,5	48,0
von 100 Kranken auf das männliche Geschlecht	61,3	56,1	—	51,2	58,8
" weibliche " . . .	38,7	43,9	100,0	48,8	41,2
1 Anstalt auf Einwohner . . .	10 994,4	349 621,2	249 729,4	218 513,3	9 766,0
1 Bett " " . . .	269,7	8 784,5	10 405,4	600,7	179,1
1 Verpflegter auf Einwohner . . .	36,5	822,3	1 261,3	444,8	31,6
1 Verpflegungstag auf Einwohner . . .	1,4	44,0	48,1	1,7	0,8

B. Kreispflegeanstalten 1896 und 1897.

Im Nachfolgenden wird eine kurze Uebersicht über Stand und Bewegung der Insassen in den 9 Kreispflegeanstalten (Geisingen, Zettingen, Freiburg, Wiechs, Fußbach, Hub, Weinheim, Sinsheim und Krauthheim) für die Jahre 1896 und 1897 gegeben:

Es betrug	im Jahr 1896			im Jahr 1897		
	männlichen Geschlechts	weiblichen Geschlechts	überhaupt	männlichen Geschlechts	weiblichen Geschlechts	überhaupt
der Bestand zu Anfang des Jahres . . .	1275	1086	2361	1312	1060	2372
der Zugang im Laufe des Jahres . . .	462	221	683	466	209	675
die Zahl der Verpflegten im Laufe des Jahres . . .	1737	1307	3044	1778	1269	3047
der Abgang im Laufe des Jahres . . .	425	247	672	495	218	713
davon durch Entlassung . . .	237	63	300	252	59	311
Tob . . .	188	184	372	243	159	402
der Bestand am Schluß des Jahres . . .	1312	1060	2372	1283	1051	2334

Nach ihren Gebrechen und Krankheiten setzten sich die Insassen in folgender Weise zusammen: Es litten

an	am Schluß des Jahres 1896				am Schluß des Jahres 1897			
	männl. Personen	weibl. Personen	zusammen	%	männl. Personen	weibl. Personen	zusammen	%
angeborener Geisteschwäche . . .	188	215	403	16,99	163	203	366	15,68
Kretinismus . . .	28	23	51	2,15	37	35	72	3,08
Fallsucht . . .	43	45	88	3,71	52	45	97	4,16
erworbener Geisteschwäche	239	354	593	25,00	283	352	635	27,21
chronischer Natur . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
akuter Natur . . .	26	32	58	2,45	26	27	53	2,27
Taubstummheit . . .	26	32	58	2,45	26	27	53	2,27
körperlichen Siechthumsformen . . .	788	391	1179	49,70	722	389	1111	47,60
darunter								
scrophs . . .	1	3	4	0,17	2	4	6	0,26
konstitutioneller Syphilis . . .	1	5	6	0,25	3	6	9	0,39
Verkrümmelung . . .	30	17	47	1,98	31	16	47	2,01
Gehirn- und Rückenmarkslähmung . . .	69	46	115	4,85	70	50	120	5,10
Alkoholisimus . . .	50	10	60	2,53	65	13	78	3,34

Demnach waren die Insassen mit körperlichen und geistigen Siechthumsformen in beiden Jahren ziemlich gleichmäßig vertreten, jedoch mit dem charakteristischen Unterschiede, daß beim männlichen Geschlechte die ersteren mit 60,1 bzw. 56,3 %, beim weiblichen aber die letzteren mit 63,1 bzw. 63,0 % überwogen.

Nach dem Alter setzten sich die Insassen der Kreispflegeanstalten in beiden Jahren wie folgt zusammen: Es waren alt

Jahre	am Schluß des Jahres 1896				am Schluß des Jahres 1897			
	männl. Personen	weibl. Personen	zusammen	%	männl. Personen	weibl. Personen	zusammen	%
unter 15 . . .	1	1	2	0,08	1	1	2	0,09
15 — 29 . . .	96	97	193	8,14	95	81	176	7,54
30 — 49 . . .	320	336	656	27,66	304	332	636	27,25
50 — 69 . . .	596	432	1028	43,34	595	441	1036	44,39
70 u. mehr . . .	299	194	493	20,78	288	196	484	20,73

Die Personen von 50 Jahren und darüber machten in beiden Jahren nahezu zwei Drittel (1896: 64,12 %, 1897: 65,12 %) des Schlußbestandes der Insassen aus. Auch hier weisen die beiden Geschlechter Unterschiede auf: bei den Männern sind die Antheile der Ueberfünfzigjährigen mit 68,2 bzw. 68,8 % nicht unbeträchtlich größer als bei den Frauen mit 59,1 % bzw. 60,8 %.

2. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1897.

Wie aus der auf den Seiten 112/119 folgenden, aus zwei Theilen bestehenden Tabelle über die Ergebnisse der geburtshilflichen Statistik des Jahres 1897 hervorgeht, bleibt seit dem Jahr 1888 die ermittelte Zahl der unter Geburtshilfe frühzeitig (vom 7. bis 10. Monat) und rechtzeitig (im 10. Monat) geborenen Kinder ziemlich gleichmäßig hinter der Zahl der in die Stauderegister eingetragenen Geborenen zurück. Im Jahr 1897 betrug die Zahl der ersteren 59 692, die der letzteren 60 522 oder 830 bzw. 1,37 % mehr; 1896 war der Unterschied 607 oder 1,02 %; 1895: 729 oder 1,25 %; 1894: 472 oder 0,85 %; 1893: 752 oder 1,01 %;

(Fortsetzung des Textes auf Seite 120.)