

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

2. Ernteergebnisse

[urn:nbn:de:bsz:31-220912](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220912)

(Fortsetzung des Textes von Seite 147.)

b) Als Nach- oder Stoppelfrucht:

mit	In den Jahren			Zu- (+) oder Abnahme (-) gegen	
	1899	1900	1901	1899	1900
Weisse Rüben	50 357	45 340	52 320	+ 3,90	+ 15,39
Klee	19 378	18 520	22 110	+ 14,10	+ 19,38
Luzerne	5 441	3 840	6 780	+ 24,61	+ 76,56
Außerdem betrug die Grasfläche:					
Wiesen	209 140	209 560	210 010	+ 0,42	+ 0,21
davon wässerbar	36,80 %	36,69 %	35,10 %		

2. Ernteergebnisse.

Der mittlere Ertrag vom Hektar, sowie im Ganzen für die einzelnen Früchte und Gewächse belief sich in den Jahren 1899, 1900 und 1901 in Doppelzentnern:

Bei	Som Hektar			Körnerertrag:			Zu- (+) oder Abnahme (-) gegen	
	1899	1900	1901	1899	Im Ganzen 1900	1901	1899	1900
Wintergetreide:								
Weizen	15,9	15,8	13,8	576 030	566 000	490 380	-14,87	-13,36
Spelz	17,9	18,7	16,1	1 024 090	1 023 360	871 960	-14,86	-14,79
Roggen	15,1	15,9	16,9	648 020	704 290	719 650	+11,05	+ 2,18
Weizen und Roggen) im	17,2	15,7	16,3	224 120	204 920	208 310	- 7,05	+ 1,65
Spelz und Roggen) Gemenge	17,8	18,8	15,7	116 660	141 370	112 950	- 3,18	-20,10
Sommergetreide:								
Gerste	16,5	15,3	15,3	961 860	870 100	894 680	- 6,98	+ 2,82
Hafer	15,4	16,5	14,4	1 049 550	1 186 400	995 430	- 5,16	-12,40
Weizen	15,4	14,9	15,3	54 270	42 750	44 160	-18,63	+ 3,30
Roggen	17,8	9,9	12,6	36 050	16 340	32 240	-10,57	+97,31
Wintergetreide:								
Stroh'ertrag:								
Weizen	29,8	25,9	22,4	1 077 190	895 380	794 810	-26,21	-11,23
Spelz	28,7	25,9	20,6	1 644 340	1 366 510	1 110 650	-32,46	-18,72
Roggen	33,5	29,4	30,1	1 458 070	1 297 900	1 349 820	- 7,42	+ 4,00
Weizen und Roggen) im	34,3	30,6	32,6	447 000	404 540	416 910	- 6,73	+ 3,06
Spelz und Roggen) Gemenge	33,7	30,9	25,9	220 270	227 170	180 260	-18,16	-20,65
Sommergetreide:								
Gerste	21,1	17,9	16,8	1 231 940	1 027 590	984 690	-20,97	- 4,17
Hafer	22,1	22,3	19,5	1 505 750	1 530 560	1 352 780	-10,16	-11,62
Weizen	25,9	21,9	22,1	88 150	63 430	63 750	-27,68	+ 0,50
Roggen	26,9	22,3	24,9	81 350	36 940	63 650	-21,76	+72,31
Knollen- und Wurzelgewächse:								
Sonstige Erträge:								
Kartoffeln	131,6	121,5	128,5	11 488 930	10 692 130	11 297 060	- 1,67	+ 5,66
Runkelrüben	266,3	328,5	336,9	8 014 120	8 792 700	9 468 120	+18,14	+ 7,68
Futterkräuter und Gräser:								
Klee } sämtliche	68,6	63,9	55,5	2 610 500	2 404 770	2 047 170	-21,58	-14,87
Luzerne } Schnitte	65,1	66,5	51,5	1 479 430	1 518 790	1 181 370	-20,15	-22,22
Wiesen } nebdert	51,1	48,7	48,9	10 691 080	10 207 470	10 089 390	- 5,63	- 1,16
Dandelsgewächse:								
Tabak	17,2	19,9	20,1	118 230	133 450	143 840	+21,66	+ 7,79
Hopfen	9,1	7,1	6,3	16 810	14 550	12 380	-26,35	-14,91
Wein (Hektoliter)	19,1	51,7	34,3	341 040	1 013 070	609 710	+78,78	-39,82

Von dem gesammten Kartoffelertrag des Jahres 1901 waren rund 6% krank.

Die besonderen Erhebungen über das Herbsterträgniß des Jahres 1901 hatten folgende Ergebnisse:

Art der Angaben.	Weinbaugegenden nach geographischen Gruppen der Reborte:										Großherzogthum
	I. Seegegend	II. Oberes Rheinthal	III. Markgräfler Gegend	IV. Kaiserstuhl	V. Breisgau	VI. Ortenau und Bühler Gegend	VII. Unteres Rheinthal	VIII. Kraichgau und Neckargegend	IX. Bergstraße	X. Main- und Taubergegend	
Zahl der Reborte, aus denen berichtet wurde . . .	30	16	56	22	29	52	16	20	7	29	277
Ertragende Rebfläche (ha) . . .	985	255	2 264	2 408	1 243	2 737	662	692	365	1 454	13 065
Durchschnittsertrag vom Hektar (hl)	22,6	25,9	51,1	42,3	37,3	42,1	29,5	25,6	21,4	9,1	35,7
Dagegen 1900	68,6	79,0	109,1	65,2	64,0	57,5	27,9	22,6	23,1	8,7	60,4
1899	27,8	27,9	34,0	36,9	17,6	12,9	3,9	3,4	2,8	5,0	20,6
Gesamtertrag hl	22 250	6 600	115 660	101 770	46 410	115 240	19 540	17 740	7 810	13 230	466 250
Davon:											
Weißwein . . .	14 250	5 890	115 190	89 460	35 140	69 010	7 270	4 300	5 620	12 680	358 810
Rothwein . . .	7 640	710	470	4 580	2 020	14 040	8 240	8 290	2 190	470	48 650
Weißherbst . . .	—	—	—	4 550	480	3 900	—	—	—	—	8 980
Schiller . . .	—	—	—	—	4 110	2 600	3 880	4 500	—	80	15 170
Edelwein . . .	20	—	—	800	4 660	24 500	150	650	—	—	30 780
Gemischt . . .	340	—	—	2 380	—	1 190	—	—	—	—	3 910
Dagegen 1900	70 770	19 110	292 280	145 110	88 840	171 050	17 650	20 870	9 050	13 550	848 280
1899	26 270	4 630	64 860	87 540	19 080	33 340	2 490	2 430	1 310	6 240	248 190

Hiernach erstreckt sich das aus 277 Reborten (gegen 294 im Vorjahr) gewonnene Ergebnis auf eine in Ertrag stehende Rebfläche von 13 065 ha, welche nach den Gemeinde-Ernteberichten für das Jahr 1901, in denen eine solche von 17 770 ha festgestellt ist, fast drei Viertel (73,5%) des gesammten ertragfähigen Rebgebietes des Landes ausmacht.

3. Ernte und Hagelschäden.

In den Jahren 1892 bis 1901 wurden die Ernteerträge durch folgende Schäden beeinträchtigt, wobei die Gemeinden so oft gezählt sind als sie betroffen wurden:

Jahre	Witterungseinflüsse:				Pflanzenkrankheiten und schädliche Pflanzen:					Schädliche Thiere:			Uebershaupt
	Dürre und Trockenheit	Kälte und kalte Witterung	Hagel-schläge	Sonstige Einflüsse	Traubenkrankheit	Weiß- und Honig- thau	Kartoffel- krankheit	Brand und Moß	Sonstige	Mäuse und Engerlinge	Schnecken und Raupen	Sonstige	
1892	609	34	205	96	27	2	34	—	26	169	—	1	1203
1893	1483	51	93	96	5	60	4	5	8	75	—	3	1883
1894	—	685	195	38	133	18	658	13	9	232	—	2	1983
1895	457	345	186	121	40	10	44	14	26	295	7	1	1546
1896	36	1178	222	103	32	18	217	30	11	208	10	13	2078
1897	140	755	239	236	88	50	303	42	24	142	35	3	2057
1898	133	513	161	92	198	77	189	26	14	64	17	12	1496
1899	337	148	161	62	214	103	44	32	20	138	4	17	1280
1900	153	97	316	111	128	36	498	32	1	77	1	8	1458
1901	455	515	253	147	226	76	696	25	5	210	8	8	2624
%	17,4	19,6	9,6	5,6	8,6	2,9	26,5	1,0	0,2	8,0	0,3	0,3	100,0
Durchschnitt													
1892/1901	380	432	203	110	109	45	269	22	15	161	8	7	1761
%	21,6	24,5	11,5	6,2	6,2	2,6	15,3	1,2	0,9	9,1	0,5	0,4	100,0

Darnach ist der Ernteertrag in einer ziemlich großen, den 10 jährigen Durchschnitt übersteigenden Zahl von Fällen mehr oder weniger durch abnorme Witterungseinflüsse, durch Pflanzenkrankheiten, sowie durch schädliche Thiere ungünstig beeinflusst bzw. beeinträchtigt worden. Ins-