

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

3. Die Viehseuchen im Jahr 1902

[urn:nbn:de:bsz:31-220925](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220925)

oder 69,14 % (1901: 3234 oder 69,09 %) der reinen Simmentaler Rasse angehörten, 1024 oder 22,04 % (1901: 1050 oder 22,43 %) Kreuzungsprodukte derselben bildeten. Der Anteil der sonstigen Schweizer Rassen und der Kreuzungen derselben ist in dem gleichen Zeitraum von 255 Stück oder 5,9 % auf 17 oder 0,37 % zurückgegangen; Niederungsrasen und deren Kreuzungen sowie Landschlag kamen nur 7 vor, während auf den Wälderschlag zusammen 386 Färren oder 8,31 % (gegen 2018 oder 46,64 % im Jahr 1873) entfielen. Vom letzteren gehörten dem Vorder- und dem Hinter-Wälderschlag je 193 an.

Von den Gemeindefärren gingen in 13 Gemeinden 29 Stück mit den Kühen zur Weide. Färrenstallungen gab es 1932, wovon nur 27 als unbefriedigend bezeichnet wurden; von den 1931 Sprungplätzen wurden 44 unbefriedigend befunden. In 565 Gemeinden wurde Sprunggeld erhoben. In 1328 Gemeinden besteht für 2417 Färren ein Vertrag mit dem Färrenhalter.

Die 59 gekörten Privatfärren besprangen 1499 weibliche Tiere; vermutlich bleiben diese Zahlen, da eine Verpflichtung der Besitzer zur Angabe nicht vorliegt, hinter der Wahrheit nicht unerheblich zurück.

Auf 1 Gemeindefärren kamen 1902: 87,8 Kühe und sprungfähige Kalbinnen, auf 1 Zuchtfärren überhaupt 86,6.

3. Die Viehseuchen im Jahr 1902.

(Vgl. Band XIX, Jahrgang 1902, Nr. 4, Seite 96 u. f.)

Wie aus den Berichten der Bezirkstierärzte über das Auftreten ansteckender Tierkrankheiten hervorgeht, kamen im Jahr 1902 Fälle von Milz- und Rauschbrand, Bläschenauschlag, Maul- und Klauenseuche, Räude, Rotlauf, Schweineseuche, Influenza der Pferde und Geflügelcholera vor, während solche von Röh, Lungenseuche, Schafpocken und Tollwut nicht beobachtet wurden. Über das Auftreten der einzelnen Seuchen läßt sich kurz folgendes sagen:

An Milzbrand, der im Jahr 1901 in 70 Gemeinden in 75 Ställen an 80 Tieren festgestellt worden war, sind im Jahr 1902 in 44 Gemeinden und 52 Ställen 59 Rinder erkrankt. Meist erkrankte in je einem Stalle nur ein Stück Vieh.

Der Rauschbrand zeigte auch diesmal wieder eine etwas geringere Ausbreitung als der Milzbrand, auch hat er gegen das Vorjahr abgenommen und tritt mehr in der Form einer ortseigenen Krankheit auf. Im Berichtsjahr wurden in 10 Gemeinden in 13 Ställen 14 Tiere vom Rauschbrand ergriffen, gegen 15 Gemeinden und 15 Ställe mit 15 Tieren im Jahr 1901. Auch an dieser Seuche, an der ausschließlich das Rindvieh beteiligt war, erkrankte in je 1 Stalle nur 1 Tier.

Eine wesentliche Verminderung hat das Auftreten der Maul- und Klauenseuche erfahren, von der im Jahr 1901: 64 Gemeinden mit 438 Ställen heimgesucht wurden, während sie 1902 nur in 43 Gemeinden mit 138 Ställen festgestellt worden ist. Am stärksten wurde das Rindvieh, dagegen nur unbedeutend Schweine und Ziegen betroffen. Die Zahl der Erkrankungsfälle an Maul- und Klauenseuche hat gegenüber dem Vorjahr um über 58 Prozent abgenommen; sie betrug 1901: 2049 Tiere (darunter 1728 Stück oder 84,3 % Rindvieh) und 1902: 849 Tiere (darunter 828 Stück oder 97,5 % Rindvieh, 12 oder 1,4 % Schweine und 9 oder 1,1 % Ziegen).

Der Bläschenauschlag, der im Berichtsjahr 747 Stück Rindvieh in 102 Gemeinden in 605 Ställen ergriffen hat, kam im Jahr 1901 in 115 Gemeinden in 498 Ställen bei 538 Stück Rindvieh und 1 Pferd vor. Auch der Bläschenauschlag blieb wie der Milz- und Rauschbrand in der Regel in je 1 Stalle auf 1 Tier beschränkt.

Die Räude, die in früheren Jahren namentlich durch wandernde Schafherden häufig eingeschleppt wurde, ist mit dem Rückgang der Schafzucht im allgemeinen seltener geworden und hat im Jahr 1902 in 13 Gemeinden 20 Ställe bzw. Herden ergriffen gegen 33 Ställe in 14 Gemeinden im Jahr 1901.

Vom Rotlauf wurden im Berichtsjahr in 174 Gemeinden in 439 Ställen 699 Schweine ergriffen gegen 664 Schweine in 170 Gemeinden in 418 Ställen im Vorjahr. Gegenüber dem Vorjahr ist eine kleine Zunahme von Erkrankungen zu verzeichnen.

An Schweineseuche erkrankten 1902 in 3 Gemeinden und 3 Ställen 17 Tiere gegen 16 Tiere in 3 Gemeinden und 3 Ställen im Jahr 1901.

An der Influenza erkrankten im Berichtsjahr in 8 Gemeinden und 10 Ställen 21 Pferde gegen 37 Pferde in 5 Gemeinden und 6 Ställen im Vorjahr.

Die Geflügelcholera wurde in 35 Gemeinden und 422 Ställen an 3410 Hühnern, 41 Enten und 35 Gänse festgestellt. Im Vorjahr erkrankten in 109 Gemeinden und 963 Ställen 12825 Hühner, 96 Gänse und 145 Enten.

Im Berichtsjahr haben gegenüber dem Vorjahr 1901 Roß, Milzbrand, Maul- und Klauenseuche, Räude, Influenza und Geflügelcholera abgenommen, Bläschenauschlag, Rotlauf und Schweinefeuche dagegen eine kleine Zunahme zu verzeichnen.

Nachstehende Übersichten veranschaulichen das Vorkommen der Viehseuchen im letzten Jahrzehnt 1893/1902.

| Jahre. | Roß. | | | | Milzbrand. | | | | Raußbrand. | | | | Bläschenauschlag. | | | | | |
|-------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------|--------|------------------|--|-------------|--------|------------------|--|-------------------|--------|------------------|---------------------------------------|-----|---|
| | Ver-seuchte | | Davon sind | | Ver-seuchte | | Davon sind | | Ver-seuchte | | Davon sind | | Ver-seuchte | | Davon sind | | | |
| | Gemeinden | Ställe | Erkrankte Pferde | umgefallen freiwillig getödtet worden | Gemeinden | Ställe | Erkrankte Kinder | umgefallen freiwillig getödtet worden | Gemeinden | Ställe | Erkrankte Kinder | umgefallen freiwillig getödtet worden | Gemeinden | Ställe | Erkrankte Kinder | Davon sind freiwillig getödtet worden | | |
| 1893 | 2 | 2 | 1 | — | 102 | 122 | 128 | 118 | 10 | 36 | 53 | 51 | 46 | 5 | 89 | 322 | 356 | — |
| 1894 | — | — | — | — | 108 | 137 | 137 | 121 | 15 | 40 | 52 | 51 | 44 | 7 | 99 | 385 | 412 | 2 |
| 1895 | — | — | — | — | 96 | 113 | 118 | 97 | 21 | 23 | 30 | 29 | 28 | 1 | 113 | 457 | 488 | 1 |
| 1896 | — | — | — | — | 93 | 112 | 119 | 97 | 22 | 27 | 55 | 57 | 51 | 6 | 120 | 593 | 810 | 1 |
| 1897 | — | — | — | — | 89 | 108 | 106 | 84 | 22 | 24 | 40 | 40 | 34 | 6 | 114 | 479 | 505 | 4 |
| 1898 | — | — | — | — | 78 | 92 | 93 | 61 | 32 | 30 | 69 | 69 | 63 | 6 | 141 | 635 | 675 | 4 |
| 1899 | 2 | 2 | 4 | — | 73 | 98 | 93 | 80 | 13 | 31 | 50 | 48 | 43 | 5 | 123 | 650 | 578 | 4 |
| 1900 | 8 | 11 | 19 | — | 61 | 75 | 74 | 61 | 13 | 21 | 40 | 37 | 35 | 2 | 80 | 445 | 479 | 3 |
| 1901 | 28 | 38 | 74 | 2 | 71 | 76 | 80 | 62 | 18 | 15 | 15 | 15 | 14 | 1 | 122 | 526 | 539 | 1 |
| 1902 | 9 | 10 | — | — | 47 | 55 | 59 | 39 | 20 | 11 | 14 | 15 | 12 | 3 | 109 | 639 | 747 | 4 |
| Darvon Bestand von 1901 | 9 | 10 | — | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 34 | — | — |
| Übergang nach 1903 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 46 | — | — |
| Durchschnitt 1893/1902 | 5 | 6 | 10 | 0,2 | 82 | 99 | 101 | 82 | 19 | 26 | 42 | 41 | 37 | 4 | 111 | 513 | 559 | 2 |

1) Außerdem 1 Pferd.

| Jahre. | Maul- und Klauenseuche. | | | | | | | | | | Räude. | | | | Influenza. | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------|-----------------|----------|--------|--------|------------|-----------------------------|-----------|--------------------|------------------|------------|----------------------------|-----------|-------------|-----------------------|------------------|-----|----|----|-----|----|
| | Ver-seuchte | | Erkrankte Tiere | | | | Davon sind | | | | Ver-seuchte | | Davon sind | | Ver-seuchte | | Erkrankte Pferde | | | | | |
| | Gemeinden | Ställe | Rinder | Schweine | Ziegen | Schafe | umgefallen | freiwillig ge-tödtet worden | Gemeinden | Ställe oder Herden | Erkrankte Schafe | umgefallen | freiwillig getödtet worden | Gemeinden | Ställe | Davon sind umgefallen | | | | | | |
| 1893 | 213 | 1315 | 6920 | 61 | 33 | 55 | 228 | 11 | — | 45 | 2 | — | — | 21 | 75 | 520 | — | 94 | — | — | | |
| 1894 | 152 | 836 | 3129 | 42 | 80 | 323 | 17 | 1 | 2 | 23 | 2 | — | — | 16 | 28 | 342 | 1 | 172 | — | — | | |
| 1895 | 274 | 1529 | 7632 | 158 | 60 | 1069 | 46 | 63 | — | 115 | 4 | — | — | 12 | 17 | 467 | 4 | 275 | — | — | | |
| 1896 | 410 | 2841 | 11390 | 215 | 139 | 794 | 159 | 1 | 2 | 186 | 5 | — | — | 18 | 36 | 243 | 2 | 75 | — | — | | |
| 1897 | 351 | 3233 | 13941 | 250 | 286 | 1897 | 195 | 33 | 14 | 161 | 7 | 3 | 56 | 29 | 116 | 590 | 26 | 68 | 10 | 40 | 117 | |
| 1898 | 326 | 2191 | 9278 | 167 | 155 | 392 | 144 | 20 | 2 | 176 | 2 | 2 | — | 19 | 63 | 525 | 29 | 219 | 9 | 15 | 47 | |
| 1899 | 650 | 11238 | 37499 | 2063 | 1775 | 1112 | 611 | 215 | 239 | 377 | 28 | 2 | — | 17 | 27 | 207 | 5 | 13 | 20 | 26 | 91 | |
| 1900 | 455 | 4691 | 23060 | 602 | 346 | 556 | 277 | 57 | 3 | 154 | 6 | 2 | — | 17 | 40 | 595 | 1 | 10 | 12 | 19 | 54 | |
| 1901 | 65 | 439 | 1728 | 215 | 106 | — | 131 | 35 | 14 | 74 | 10 | — | — | 17 | 36 | 426 | 20 | 25 | 7 | 9 | 37 | |
| 1902 | 56 | 184 | 828 | 12 | 9 | — | 37 | 2 | 4 | 7 | — | 1 | — | 15 | 28 | 147 | 1 | 2 | 8 | 10 | 21 | |
| Darvon Bestand von 1901 | 13 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Übergang nach 1903 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Durchschnitt 1893/1902 | 295 | 2850 | 11541 | 879 | 299 | 620 | 185 | 44 | 33 | 0,4 | 132 | 7 | 1 | 6 | 17 | 47 | 406 | 9 | 99 | 11 | 20 | 61 |

1) Außerdem 6 Pferde. 2) Desgl. 3 Pferde.

