

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

2. Ernteergebnisse

[urn:nbn:de:bsz:31-220925](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220925)

(Fortsetzung des Textes von Seite 145.)

b) Als Nach- oder Stoppelfrucht:

mit	In den Jahren			Zu (+) oder Abnahme (-) gegen	
	1900	1901	1902	1900	1901
Weisse Rüben	45 340	52 320	46 890	+ 1 550	- 5 430
Klee	18 520	22 110	21 480	+ 2 960	- 630
Luzerne	3 840	6 780	6 160	+ 2 320	- 620
Außerdem betrug die Grasfläche:					
Wiesen	209 560	210 010	210 620	+ 1 060	+ 610
davon wasserbar	36,69 %	35,10 %	35,83 %		

2. Ernteergebnisse.

Der mittlere Ertrag vom Hektar, sowie im ganzen für die einzelnen Früchte und Gewächse belief sich in den Jahren 1900, 1901 und 1902 in Doppelzentnern:

Bei	Vom Hektar			Körnerertrag:			Zu (+) oder Abnahme (-) gegen	
	1900	1901	1902	1900	Im ganzen 1901	1902	1900	1901
Wintergetreide:								
Weizen	15,8	13,8	16,9	566 000	490 380	596 170	+ 30 170	+ 105 790
Spelz	18,7	16,2	18,4	1 023 360	871 960	986 950	- 36 410	+ 114 990
Roggen	15,9	16,0	15,8	704 290	719 650	735 560	+ 31 270	+ 15 910
Weizen und Roggen) im	15,7	16,3	17,2	204 920	208 310	232 460	+ 27 540	+ 24 150
Spelz und Roggen) Menge	18,8	15,7	17,7	141 370	112 950	128 420	- 12 950	+ 15 470
Sommergetreide:								
Gerste	15,3	15,3	17,9	870 100	894 680	1 007 270	+ 137 170	+ 112 590
Hafer	16,5	14,4	15,6	1 136 400	995 430	1 089 920	- 46 480	+ 94 490
Weizen	14,0	15,3	16,5	42 750	44 160	41 120	- 1 630	- 3 040
Roggen	9,9	12,6	13,9	16 340	32 240	37 590	+ 21 250	+ 5 350
Wintergetreide:								
Stroh'ertrag:								
Weizen	25,0	22,4	29,9	895 380	794 810	1 056 760	+ 161 380	+ 261 950
Spelz	25,0	20,6	24,7	1 366 510	1 110 650	1 324 400	- 42 110	+ 213 750
Roggen	29,4	30,2	32,2	1 297 900	1 349 820	1 495 630	+ 197 730	+ 145 810
Weizen und Roggen) im	30,6	32,6	38,5	404 540	416 910	519 120	+ 114 580	+ 102 210
Spelz und Roggen) Menge	30,0	25,0	27,4	227 170	180 260	198 040	- 29 130	+ 17 780
Sommergetreide:								
Gerste	17,9	16,8	20,6	1 027 590	984 690	1 159 800	+ 132 210	+ 175 110
Hafer	22,3	19,5	21,1	1 530 560	1 352 780	1 474 920	- 55 640	+ 122 140
Weizen	21,0	22,1	22,2	63 430	63 750	55 220	- 8 210	- 8 530
Roggen	22,3	24,9	23,5	36 940	63 650	63 430	+ 26 490	- 220
Knochen- und Wurzelgewächsen:								
Sonstige Erträge:								
Kartoffeln	121,5	128,5	128,7	10 692 130	11 297 060	11 210 790	+ 518 660	- 86 270
Runkelrüben	328,5	336,0	251,9	8 792 700	9 468 120	7 302 930	- 1 489 770	- 2 165 190
Futterkräutern und Gräsern:								
Klee } sämtliche	63,9	55,5	68,0	2 404 770	2 047 170	2 591 520	+ 186 750	+ 544 350
Luzerne } Schnitte	66,5	51,5	63,8	1 518 790	1 181 370	1 471 190	- 47 600	+ 289 820
Wiesen } gebürt	48,7	48,0	57,2	10 207 470	10 089 390	12 052 790	+ 1 845 320	+ 1 963 400
Handelsgewächsen:								
Tabak	19,9	20,1	18,0	133 450	143 840	130 240	- 3 210	- 13 600
Hopfen	7,1	6,3	8,7	14 550	12 380	16 410	+ 1 860	+ 4 030
Wein (Hektoliter)	51,7	34,3	22,9	1 013 070	609 710	404 750	- 608 320	- 204 960

Von dem gesamten Kartoffelertrag des Jahres 1902 waren rund 2 % frank.

Die besonderen Erhebungen über das Herbstergebnis des Jahres 1902 hatten folgende Ergebnisse:

Art der Angaben.	Weinbaugegenden nach geographischen Gruppen der Reborte:										Großherzogtum
	I. See-gegend	II. Oberes Rheintal	III. Markgräfler Gegend	IV. Kaiserstuhl	V. Breisgau	VI. Ortenau und Süßler Gegend	VII. Unteres Rheintal	VIII. Kraichgau und Neckar-gegend	IX. Bergstraße	X. Main- und Tauber-gegend	
Zahl der Reborte, aus denen berichtet wurde . .	40	18	73	25	37	58	19	24	7	26	327
Ertragende Rebfläche (ha) . . .	1 083	272	2 856	2 646	1 573	2 720	734	1 029	396	1 389	14 698
Durchschnittsertrag vom Hektar (hl)	28,2	33,9	55,3	30,0	13,9	18,2	6,1	7,3	11,7	2,8	25,1
Dagegen 1901	22,6	25,9	51,1	42,3	37,3	42,1	29,5	25,6	21,4	9,1	35,7
Gesamtertrag hl . . .	30 530	9 220	157 810	79 380	21 920	49 490	4 440	7 480	4 650	3 960	368 880
Davon:											
Weißwein . . .	18 760	6 640	156 150	67 070	14 190	28 010	1 510	2 280	3 080	3 610	301 300
Rotwein . . .	9 560	2 580	1 110	5 690	1 710	12 310	1 450	1 640	1 570	340	37 960
Weißherbst . . .	—	—	—	5 900	700	1 210	—	—	—	—	7 810
Schiller . . .	220	—	—	—	1 080	1 260	1 210	750	—	10	4 530
Gemischt . . .	1 990	—	550	720	4 240	6 700	270	2 810	—	—	17 280
Dagegen 1901	22 250	6 600	115 660	101 770	46 410	115 240	19 540	17 740	7 810	13 230	466 250

Hiernach erstreckt sich das aus 327 Reborten (gegen 277 im Vorjahr) gewonnene Ergebnis auf eine in Ertrag stehende Rebfläche von 14 698 ha, welche nach den Gemeinde-Ernteberichten für das Jahr 1902, in denen eine solche von 17 680 ha festgestellt ist, über vier Fünftel (83,1 %) des gesamten ertragfähigen Rebgebietes des Landes ausmacht.

3. Ernte- und Hagelschäden.

In den Jahren 1893 bis 1902 wurden die Ernterträge durch folgende Schäden beeinträchtigt, wobei die Gemeinden so oft gezählt sind als sie betroffen wurden:

Jahre	Witterungseinflüsse:				Pflanzenkrankheiten und schädliche Pflanzen:					Schädliche Tiere:			überhaupt
	Dürre und Trockenheit	Nasse und kalte Witterung	Hagelschläge	Sonstige Einflüsse	Tranbenkrankheit	Mehl- und Honigtau	Kartoffelkrankheit	Brand und Rost	Sonstige	Mäuse und Engerlinge	Schnecken und Raupen	Sonstige	
1893	1483	51	93	96	5	60	4	5	8	75	—	3	1883
1894	—	685	195	38	133	18	658	13	9	232	—	2	1983
1895	457	345	186	121	40	10	44	14	26	295	7	1	1546
1896	36	1178	222	103	32	18	217	30	11	208	10	13	2078
1897	140	755	239	236	88	50	303	42	24	142	35	3	2057
1898	133	513	161	92	198	77	189	26	14	64	17	12	1496
1899	337	148	161	62	214	103	44	32	20	138	4	17	1280
1900	153	97	316	111	128	36	498	32	1	77	1	8	1458
1901	455	515	253	147	226	76	696	25	5	210	8	8	2624
1902	282	159	288	377	104	77	373	26	42	124	33	8	1893
%	14,9	8,4	15,2	19,9	5,5	4,1	19,7	1,4	2,2	6,6	1,7	0,4	100,0
Durchschnitt													
1893/1902	348	445	211	138	117	53	303	24	16	156	12	7	1830
%	19,0	24,3	11,5	7,5	6,4	2,9	16,6	1,3	0,9	8,5	0,7	0,4	100,0

Darnach ist der Erntertrag in einer ziemlich großen, den 10-jährigen Durchschnitt übersteigenden Zahl von Fällen mehr oder weniger durch abnorme Witterungseinflüsse, durch Pflanzenkrankheiten sowie durch schädliche Tiere ungünstig beeinflusst bzw. beeinträchtigt worden. Insbesondere wurde die Ernte in 340 Gemeinden durch Spätfröste, in 288 durch Hagelschläge, in 282 durch Dürre, in 146 durch nasse Witterung, in 22 durch zu frühen und zu späten Schnee, in 15 durch Überschwemmung, in 13 durch Winterfalte und Auswinterung, in 373 durch Kartoffelkrankheit,