

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

2. Ernteergebnisse

[urn:nbn:de:bsz:31-220936](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220936)

(Fortsetzung des Textes von Seite 149.)

b) Als Nach- oder Stoppelfrucht:

mit	In den Jahren			Zu (+) oder Abnahme (-) gegen	
	1901	1902	1903	1901	1902
Weisse Rüben	52 320	46 890	49 170	- 3 150	+ 2 280
Klee	22 110	21 480	22 360	+ 250	+ 880
Luzerne	6 780	6 160	6 230	- 550	+ 70.
Außerdem betrug die Grasfläche:					
Wiesen	210 010	210 620	211 230	+ 1 220	+ 610
davon wässerbar 35,10 % 35,83 % 35,79 %					

2. Ernteergebnisse.

Der mittlere Ertrag vom Hektar, sowie im ganzen für die einzelnen Früchte und Gewächse belief sich in den Jahren 1901, 1902 und 1903 in Doppelzentnern:

Bei	Som Dektar			Körnerertrag:			Zu (+) oder Abnahme (-) gegen	
	1901	1902	1903	1901	Im ganzen 1902	1903	1901	1902
Wintergetreide:								
Weizen	13,8	16,9	16,9	490 380	596 170	599 500	+ 109 120	+ 3 330
Spelz	16,7	18,4	18,6	871 960	986 950	975 280	+ 103 320	- 11 670
Roggen	16,0	15,3	17,7	719 650	735 560	820 940	+ 101 290	+ 85 380
Weizen und Roggen) im	16,3	17,2	18,3	208 310	232 460	248 850	+ 40 540	+ 16 390
Spelz und Roggen) Gemenge	15,7	17,7	17,7	112 950	128 420	125 000	+ 12 050	- 3 420
Sommergetreide:								
Gerste	15,3	17,9	17,6	894 680	1 007 270	985 760	+ 91 080	- 21 510
Hafer	14,4	15,6	15,6	995 430	1 089 920	1 116 190	+ 120 760	+ 26 270
Weizen	15,3	16,5	16,1	44 160	41 120	41 660	- 2 500	+ 540
Roggen	12,6	13,9	12,5	32 240	37 590	29 860	- 2 380	- 7 730
Wintergetreide:								
Weizen	22,4	29,9	28,1	794 810	1 056 760	1 006 600	+ 211 790	- 50 160
Spelz	20,6	24,7	25,1	1 110 650	1 324 400	1 312 530	+ 201 880	- 11 870
Roggen	30,1	32,1	32,2	1 349 820	1 495 630	1 493 580	+ 143 760	- 2 050
Weizen und Roggen) im	32,6	38,5	33,1	416 910	519 120	450 460	+ 33 550	- 68 660
Spelz und Roggen) Gemenge	25,0	27,4	25,8	180 260	198 040	181 880	+ 1 620	- 16 160
Sommergetreide:								
Gerste	16,8	20,6	20,9	984 690	1 159 800	1 171 490	+ 186 800	+ 11 690
Hafer	19,5	21,1	20,6	1 352 780	1 474 920	1 465 700	+ 112 920	- 9 220
Weizen	22,7	22,2	21,7	63 750	55 220	56 060	- 7 690	+ 840
Roggen	24,9	23,5	18,5	63 650	63 430	44 210	- 19 440	- 19 220
Knollen- und Wurzelgewächsen:								
Kartoffeln	128,5	128,7	117,4	11 297 060	11 210 790	10 300 090	- 996 970	- 910 700
Runkelrüben	336,0	251,9	312,5	9 468 120	7 302 930	9 177 120	- 291 000	+ 1 874 190
Futterkräutern und Gräsern:								
Klee } sämtliche	55,5	68,0	66,3	2 047 170	2 591 520	2 526 620	+ 479 450	- 64 900
Luzerne } Schnitt	51,5	63,8	63,9	1 181 370	1 471 190	1 509 860	+ 328 490	+ 38 670
Wiesen } gedürrt	48,0	57,2	57,9	10 089 390	12 052 790	11 180 430	+ 1 091 040	- 872 360
Handelsgewächsen:								
Tabak	20,1	18,0	14,9	143 840	130 240	106 970	- 36 870	- 23 270
Hopfen	6,3	8,7	10,3	12 380	16 410	18 540	+ 6 160	+ 2 130
Wein (Hektoliter)	34,3	22,9	19,7	609 710	404 750	692 850	+ 83 140	+ 288 100

Von dem gesamten Kartoffelertrag des Jahres 1903 waren rund 6% krank.

Die besonderen Erhebungen über das Herbstsertragnis des Jahres 1903 hatten folgende Ergebnisse:

Art der Angaben.	Weinbaugegenden nach geographischen Gruppen der Reborte:										Großherzogtum
	I. See- gegend	II. Oberes Rhein- tal	III. Neck- gräfler Gegend	IV. Kaiser- stuhl	V. Breis- gau	VI. Ortenau und Bühler Gegend	VII. Unteres Rhein- tal	VIII. Kraich- gau und Neckar- gegend	IX. Berg- straße	X. Main- und Tauber- gegend	
Zahl der Reborte, aus denen berichtet wurde . . .	40	18	73	25	38	61	21	28	7	38	349
Ertragende Rebfläche (ha) . . .	1 070	270	2 840	2 690	1 590	3 030	730	1 030	400	1 750	15 400
Durchschnittsertrag vom Hektar (hl)	38,1	70,2	33,6	46,3	45,9	43,1	29,7	31,4	24,4	11,0	36,8
Dagegen 1902	28,2	33,9	55,3	30,0	13,9	18,2	6,1	7,3	11,7	2,8	25,1
Gesamtertrag hl . . .	40 770	18 950	95 430	124 660	72 920	130 470	21 650	32 290	9 760	19 260	566 160
Davon:											
Weißwein . . .	28 680	16 220	94 660	113 170	67 320	86 910	6 960	10 480	6 850	17 780	449 030
Rotwein . . .	10 640	2 730	610	8 730	2 510	20 670	10 220	7 020	2 910	1 450	67 490
Weißherbst . . .	—	—	—	2 500	—	5 530	—	—	—	—	8 030
Schiller . . .	140	—	—	—	2 520	2 150	4 250	13 600	—	30	22 690
Gemischt . . .	1 310	—	160	260	570	15 210	220	1 190	—	—	18 920
Dagegen 1902	30 530	9 220	157 810	79 380	21 920	49 490	4 440	7 480	4 650	3 960	368 880

Hiernach erstreckt sich das aus 349 Reborten (gegen 327 im Vorjahr) gewonnene Ergebnis auf eine in Ertrag stehende Rebfläche von 15 400 ha, welche nach den Gemeinde-Ernteberichten für das Jahr 1903, in denen eine solche von 17 630 ha festgestellt ist, fast neun Zehntel (87,4 %) des gesamten ertragfähigen Rebgebietes des Landes ausmacht.

3. Ernte- und Hagelschäden.

In den Jahren 1894 bis 1903 wurden die Ernteerträge durch folgende Schäden beeinträchtigt, wobei die Gemeinden so oft gezählt sind, als sie betroffen wurden:

Jahre	Witterungseinflüsse:				Pflanzenkrankheiten und schädliche Pflanzen:					Schädliche Tiere:			überhaupt
	Dürre und Frodenheit	Nasse und kalte Witterung	Hagel- schläge	Sonstige Einflüsse	Rebl- krankheit	Rehl- und Honig- tau	Kartoffel- krankheit	Brand und Rost	Sonstige	Mäuse und Enger- linge	Schnecken und Raupen	Sonstige	
1894	—	685	195	38	133	18	658	13	9	232	—	2	1983
1895	457	345	186	121	40	10	44	14	26	295	7	1	1546
1896	36	1178	222	103	32	18	217	30	11	208	10	13	2078
1897	140	755	239	236	88	50	303	42	24	142	35	3	2057
1898	133	513	161	92	198	77	189	26	14	64	17	12	1496
1899	337	148	161	62	214	103	44	32	20	138	4	17	1280
1900	153	97	316	111	128	36	498	32	1	77	1	8	1458
1901	455	515	253	147	226	76	696	25	5	210	8	8	2624
1902	282	159	288	377	104	77	373	26	42	124	33	8	1893
1903	211	321	210	134	204	98	640	75	53	144	15	8	2118
%	10,0	15,2	9,9	6,3	9,7	4,6	30,3	3,6	2,5	6,8	0,7	0,4	100,0
Durchschnitt													
1894/1903	220	472	223	142	137	56	366	32	21	163	13	8	1853
%	11,9	25,5	12,0	7,7	7,4	3,1	19,7	1,7	1,1	8,8	0,7	0,4	100,0

Darnach ist der Ernteertrag in einer ziemlich großen, den 10-jährigen Durchschnitt übersteigenden Zahl von Fällen mehr oder weniger durch abnorme Witterungseinflüsse, durch Pflanzenkrankheiten sowie durch schädliche Tiere ungünstig beeinflusst bzw. beeinträchtigt worden. Insbesondere wurde die Ernte in 275 Gemeinden durch nasse Witterung, in 211 durch Dürre, in 210 durch Hagelschlag, in 113 durch Spätfröste, in 46 durch Winterkälte und Auswinterung, in 8 durch Überschwemmung, in 7 durch Sturm, in 6 durch zu frühen und zu späten Schnee, in 640 durch