

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

## **Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

### 2. Ernteergebnisse

[urn:nbn:de:bsz:31-220945](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220945)

(Fortsetzung des Textes von Seite 157.)

b) Als Nach- oder Stoppelfrucht:

mit	In den Jahren			Zu- (+) oder Abnahme (-) gegen	
	1902	1903	1904	1902	1903
Weißer Rüben . . . . .	46 890	49 170	47 890	+ 1 000	- 1 280
Klee . . . . .	21 480	22 360	22 920	+ 1 440	+ 560
Luzerne . . . . .	6 160	6 230	6 800	+ 640	+ 570
Außerdem betrug die Grasfläche:					
Wiesen . . . . .	210 620	211 230	211 780	+ 1 160	+ 550
bavon wasserbar . . . . .	35,83 %	35,79 %	34,98 %		

2. Erntergebnisse.

Der mittlere Ertrag vom Hektar, sowie im ganzen für die einzelnen Früchte und Gewächse belief sich in den Jahren 1902, 1903 und 1904 in Doppelzentnern:

Bei	Vom Hektar			Körnerertrag:			Zu- (+) oder Abnahme (-) gegen	
	1902	1903	1904	1902	Im ganzen 1903	1904	1902	1903
<b>Wintergetreide:</b>								
Weizen . . . . .	16,9	16,9	15,2	596 170	599 500	548 100	- 48 070	- 51 400
Spelz . . . . .	18,4	18,6	18,0	986 950	975 280	930 180	- 56 770	- 45 100
Roggen . . . . .	15,8	17,7	15,0	735 560	820 940	701 450	- 34 110	- 119 490
Weizen und Roggen) im	17,2	18,3	15,0	232 460	248 850	201 570	- 30 890	- 47 280
Spelz und Roggen) Gemenge	17,7	17,7	17,3	128 420	125 000	113 260	- 15 160	- 11 740
<b>Sommergetreide:</b>								
Gerste . . . . .	17,9	17,6	15,7	1 007 270	985 760	859 660	- 147 610	- 126 100
Hafer . . . . .	15,6	15,6	14,8	1 089 920	1 116 190	1 048 330	- 41 590	- 67 860
Weizen . . . . .	16,5	16,1	16,1	41 120	41 660	35 460	- 5 660	- 6 200
Roggen . . . . .	13,9	12,5	12,0	37 590	29 860	27 980	- 9 610	- 1 880
<b>Wintergetreide:</b>								
Weizen . . . . .	29,9	28,4	26,9	1 056 760	1 006 600	956 070	- 100 690	- 50 530
Spelz . . . . .	24,7	25,1	25,1	1 324 400	1 312 530	1 296 790	- 27 610	- 15 740
Roggen . . . . .	32,1	32,2	28,7	1 495 630	1 493 580	1 338 230	- 157 400	- 155 350
Weizen und Roggen) im	38,5	33,1	25,7	519 120	450 460	346 840	- 172 280	- 103 620
Spelz und Roggen) Gemenge	27,1	25,8	30,7	198 040	181 880	200 870	+ 2 830	+ 18 990
<b>Sommergetreide:</b>								
Gerste . . . . .	20,6	20,9	19,9	1 159 800	1 171 490	1 064 440	- 95 360	- 107 050
Hafer . . . . .	21,1	20,6	19,3	1 474 920	1 465 700	1 360 310	- 114 610	- 105 390
Weizen . . . . .	22,2	21,7	22,8	55 220	56 060	50 300	- 4 920	- 5 760
Roggen . . . . .	23,5	18,5	21,2	63 430	44 210	49 580	- 13 850	+ 5 370
<b>Knollen- und Wurzelgewächse:</b>								
Kartoffeln . . . . .	128,7	117,4	111,1	11 210 790	10 300 090	9 701 960	- 1 508 830	- 598 130
Runkelrüben . . . . .	251,9	312,5	310,3	7 302 930	9 177 120	9 289 490	+ 1 986 560	+ 112 370
<b>Futterkräuter und Gräser:</b>								
Klee } sämtliche	68,0	66,3	65,7	2 591 520	2 526 620	2 630 060	+ 38 540	+ 103 440
Luzerne } Schnitte	63,8	63,2	63,3	1 471 190	1 509 860	1 796 090	+ 324 900	+ 286 230
Wiesen } gehört	57,2	57,9	52,8	12 052 790	11 180 430	11 195 860	- 856 930	+ 15 430
<b>Handelsgewächse:</b>								
Tabak . . . . .	18,0	14,9	16,8	130 240	106 970	121 270	- 8 970	+ 14 300
Hopfen . . . . .	8,7	10,3	8,9	16 410	18 540	17 980	+ 1 570	- 560
Wein (Hektoliter) . . . . .	22,9	19,7	21,0	404 750	692 850	739 720	+ 334 970	+ 46 870

Das Jahr 1904 zeigt nach obiger Darstellung gegenüber den beiden Vorjahren bei sämtlichen Körnererträgen Abnahmen, auch hat der Strohertrag gegenüber 1903 nur bei Spelz und Roggen im Gemenge sowie bei Sommerroggen und gegenüber 1902 nur bei erstgenannter Frucht eine Zunahme aufzuweisen, während alle anderen Strohsorten zurückgingen. Die Kartoffeln zeigen

gegenüber den Vorjahren Abnahmen, die Runkelrüben, der Klee, die Luzerne und der Wein dagegen Zunahmen, die Wiesen erträge, der Tabak und die Hopfen teils Zu- und teils Abnahmen.

Von dem gesamten Kartoffelertrag des Jahres 1904 waren rund 4% krank.

Die besonderen Erhebungen über das Herbsttragnis des Jahres 1904 hatten folgende Ergebnisse:

Art der Angaben.	Weinbaugenden nach geographischen Gruppen der Reborte:										Großherzogtum
	I. Seegegend	II. Oberes Rheintal	III. Markgräfler Gegend	IV. Kaiserstuhl	V. Breisgau	VI. Ortenau und Süßler Gegend	VII. Unteres Rheintal	VIII. Kraichgau und Neckargegend	IX. Bergstraße	X. Rhein- und Taubergegend	
Zahl der Reborte, aus denen berichtet wurde, . . .	42	18	72	25	38	61	21	28	6	37	348
Ertragende Rebfläche (ha) . . .	1 062	274	2 689	2 717	1 578	2 900	802	1 084	396	1 603	15 105
Durchschnittsertrag vom Hektar (hl)	32,9	25,2	42,5	61,4	45,1	31,4	32,7	34,1	33,4	27,7	40,1
Dagegen 1903	38,1	70,2	33,6	46,3	45,9	43,1	29,7	31,4	24,4	11,0	36,8
Gesamtertrag hl . . .	34 910	6 910	114 380	166 860	71 200	91 400	26 190	36 950	13 240	44 340	606 380
Davon:											
Weißwein . . .	23 400	5 070	113 590	137 640	64 180	65 420	11 490	11 580	9 650	42 130	484 150
Rotwein . . .	8 840	1 020	790	12 970	3 010	14 630	8 700	9 550	3 590	1 740	64 840
Weißbierbst . . .	1 000	—	—	14 050	110	690	—	—	—	—	15 850
Schiller . . .	310	—	—	—	2 340	2 520	5 360	13 850	—	470	24 850
Gemischt . . .	1 360	820	—	2 200	1 560	8 140	640	1 970	—	—	16 690
Dagegen 1903	40 770	18 950	95 430	124 660	72 920	130 470	21 650	32 290	9 760	19 260	566 160

Das aus 348 Reborten (gegen 349 im Vorjahr) gewonnene Ergebnis erstreckt sich hiernach auf eine in Ertrag stehende Rebfläche von 15 105 ha, welche nach den Gemeinde-Ernteberichten für das Jahr 1904, in denen eine solche von 17 670 ha festgestellt ist, über vier Fünftel (85,5%) des gesamten ertragsfähigen Reblandes des Landes ausmacht.

### 3. Ernte- und Hagelschäden.

In den Jahren 1895 bis 1904 wurden die Ernteerträge durch folgende Schäden beeinträchtigt, wobei die Gemeinden so oft gezählt sind, als sie betroffen wurden:

Jahre	Witterungseinflüsse:				Pflanzenkrankheiten und schädliche Pflanzen:					Schädliche Tiere:			überhaupt
	Dürre und Trockenheit	Kälte und kalte Witterung	Hagelschläge	Sonstige Einflüsse	Traubenkrankheit	Wehl- und Honigtau	Kartoffelkrankheit	Brand und Rost	Sonstige	Mäuse und Engerlinge	Schnecken und Raupen	Sonstige	
1895	457	345	186	121	40	10	44	14	26	295	7	1	1546
1896	36	1178	222	103	32	18	217	30	11	208	10	13	2078
1897	140	755	239	236	88	50	303	42	24	142	35	3	2057
1898	133	513	161	92	198	77	189	26	14	64	17	12	1496
1899	337	148	161	62	214	103	44	32	20	138	4	17	1280
1900	153	97	316	111	128	36	498	32	1	77	1	8	1458
1901	455	515	253	147	226	76	696	25	5	210	8	8	2624
1902	282	159	288	377	104	77	373	26	42	124	33	8	1893
1903	211	321	210	134	204	98	640	75	53	144	15	8	2113
1904	927	47	240	68	53	42	338	33	8	93	4	5	1858
%	49,9	2,5	12,9	3,7	2,8	2,3	18,2	1,8	0,4	5,0	0,2	0,3	100,0
Durchschnitt													
1895/1904	313	408	228	145	129	59	332	34	21	150	13	8	1840
%	17,0	22,2	12,4	7,9	7,0	3,2	18,0	1,9	1,1	8,2	0,7	0,4	100,0

Darnach ist der Ernteertrag in einer ziemlich großen, den 10-jährigen Durchschnitt übersteigenden Zahl von Fällen mehr oder weniger durch abnorme Witterungseinflüsse, durch Pflanzenkrankheiten sowie durch schädliche Tiere ungünstig beeinflusst bzw. beeinträchtigt worden. Ins-