Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

c) Die Sand- und Geröllbildungendes Rheinthales

urn:nbn:de:bsz:31-217954

Visual Library

Sand und Kiesgruben südlich und südwestlich Buch bei Schachen und am Hohrain bei Birndorf durchzieht der Sand in Adern die Geröllablagerungen, die Gerölle sind dabei durchschnittlich nur Faustgroß. Im Dorfe Birndorf ist eine Sandschichte 40' mächtig aufgeschlossen. Wir gehen noch zurück auf die Bildungen von Hochgestaden in den Schwarzwaldthälern als: „in der Klemme" unterhalb der Schmelze und wieder unterhalb Unterkutterau im Albthale; hiebei wird oft ein feiner Sand von Geröllen bedeckt, eine Wirkung älterer ungleicher Strömungsstärke. Kleine Hochgestade finden wir an dem linken Ufer der Schwarza ober- und unterhalb Leinegg.

Es ist besonderer Hervorhebung werth, daß wir in diesen Bildungen der Schwarzwaldthäler noch keine Säugethierreste der Diluvialperiode angetroffen haben, es gewinnt deßhalb den Anschein, als hätten diese Thiere in unserem Lande die Bodenseegegend und das Rheinthal nicht verlassen.

c) Die Sand- und Geröllbildungen des Rheinthales oder das Alpendiluvium („geschichtetes Diluvium" der Schweizergeologen) bilden entweder einzelne oder treppenförmig übereinander gesetzte Hochgestade, deren Oberfläche sich eben verflächt, oder sie bedecken die Hügel und den Fuß des südlichen Schwarzwaldes bis zu beträchtlichen Höhen hinauf; der letztere Fall tritt namentlich zwischen Doggern und dem Albthale ein und seiner obersten Grenze folgt Schwarzwalddiluvium (Birndorf, Buch, Haite, Schachen). Beim Eingang von Hauenstein in das Mühlbachthälchen gegen Hochsal finden wir Alpendiluvium als eine feinsandige Erde mit kleinen Geröllen von rothem Sernifit und weißem Quarz bis beinahe auf die Höhe von Hochsal. Die hellgelbe Erde wird hiebei mehr grau oder stellenweise ockerfarbig, so daß man glauben möchte, man habe es schließlich mit verwittertem Gneise zu thun, dann erscheint aber höher grobes Schwarzwalddiluvium. Wenn uns Gelegenheit gegeben wäre, an einem Orte eine vollständige Aufeinanderfolge von Diluvialbildungen beobachten zu können, so würde zuerst über der älteren Formation die Alpengeröllbildung, darauf die des Schwarzwaldes (Gurtweil und unterhalb Bruckhaus, im Wald-Einschlag zwischen Murg und Harpolingen, östlicher Eisenbahneinschnitt vor dem Tunnel von Kleinlaufenburg u. s. w.), sodann feine Erden und Lehm oder Lößfelgen, welche wir sämmtlich zu den Diluvialbildungen zählen. So ist es auch im unteren Rheinthale von Basel bis Baden zu beobachten. Das Alter der einzelnen Ablagerungen richtet sich nach der Höhe ihres Vorkommens und dies gilt sowohl den Geröllbildungen des Schwarzwaldes als jenen des Rheinthales (vgl. Seite 15—17).

Die Höhendifferenzen der Ablagerungsorte des Alpendiluviums, vom Rheine aus gerechnet, betragen 700' und da, wo sich diese ergeben, ist dies Diluvium auf einen eine Stunde langen Querschnitt des Rheinthales (von Laibstadt bis Birkingen) ausgedehnt. Denkt man sich diese Verhältnisse als ein Stromprofil, so genügt dasselbe dem Durchgang einer größeren Wassermasse als der des Mississipi und diese müßte, um große Gerölle zu fördern, eine Strömungsgeschwindigkeit von wenigstens 2,55 Metres (Rhein bei Basel) gehabt haben. Wo ist aber der große Hintergrund in Mitteleuropa zu suchen, welcher einem solchen Stromriesen das Wasser gespendet hätte, das die Rheinströmung bis Reichenau im Bündtner Lande gestaut haben würde? Selbst nicht zur Zeit der großen Gletscherausdehnung war dies möglich; diese Diluvialbildung ist folglich, da kein Grund zur Annahme von Hebungen vorhanden, zum Theil eine ältere.

Der feine Löß geht nicht zu jenen bedeutenden Geröllhöhen hinauf, er überschreitet, wie Seite 26 erklärt wurde, den Rheinspiegel nicht höher als etwa 150' und seine Bildungsperiode gehört einem späteren und tieferen Rheinstande an und einer noch jüngeren jene der Hochgestade im Rheinthale (Seite 15). Diese Hochgestade erlitten wieder Veränderungen in noch jüngerer Zeit, durch die Waldflüsse, Bäche und Gießbäche; es entstanden Fluthgraben, so ist z. B. das Hochgestade östlich Thiengen, zwischen diesem Städtchen und der Steina, seitlich wiederholt eingekerbt, wodurch Configurationen hervorgehen, welche einen der Geologie unkundigen Archäologen zur Annahme von Hügelgräbern verleitet haben sollen. Diese Terrainformen unterscheiden sich aber von den Hügelgräbern durch ihre ebene Oberfläche, welche in den den Hochgestaden eigenthümlichen ebenen Boden in einer Horizontale übergeht. Man nennt solche Vorsprünge anderorts „Kanzeln". Zu dieser Art Bildungen gehört auch der Seite 6 u. 15 berührte tiefe Fluthgraben bei Waldshut und das Katzenthal oberhalb Laufenburg, sie sind in den Diluvialländern in der Nähe der Landseeen und Flüsse sehr häufig, so am Bodensee, längs der Donau, der Aare, dem Rheine u. s. w. Die großartigsten finden sich jedoch am Nordrande des Gebirges von Granada, in der Sierra Nevada nahe Porullena bei Quadix und wurden durch Roßmäßler (Geschichte der Erde I. S. 51) einem größeren Publikum verbildlicht.

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

Die Gesteinsnatur der Gerölle des Alpen- oder Rheinischen Diluviums der Hochgestade und der Höhen, abgesehen der neuesten oder Alluvialbildungen, ist überwiegend alpin, d. h. die Felsarten der Gerölle stammen in Mehrzahl von den Alpen und zwar aus dem Quellengebiete des Rheines ab; von diesen sind für die Geröllbildung folgende dadurch im Besondern leitend, indem sie sich allgemein vorfinden und leicht kenntlich sind: die Granite des Julier, Albula und Gotthard („Geisberger Stein"), der Epidot-reiche, graue Schiefer Mittelbündtens und dieser wieder mit rothem und grünem Jaspis, das Sernifitgestein oder der Quarzit des Vorderrheinthales als weiße, grüne und rothe Talkquarzite der Gegend von Tries, Ilanz, Trons, Summvir und vielleicht auch von Mels bei Sargans, endlich milchweiße, sehr spröde Quarze wohl aus den grünen Schiefern abzuleiten. Außer diesen Felsarten kennen wir noch einige andere, jedoch seltenere, aber sehr charakteristische, wie das schöne Diallaggesteine von Marmels in Oberhalbstein, Serpentin mit blättrigem Diallag von der Todte-Alp bei Davos und der Gotthardgranit mit großen Orthoklaskrystallen von Ponteljestobel oberhalb Trons, ferner ein Heer krystallinischer und Schiefergestein von unsteter in einander übergehender Ausbildung als Gneise, Glimmerschiefer, Bündtner- oder Anthrazitschiefer und dioritische Schiefergesteine, sodann Eklogit- und Hypersthenfels, quarzige, rauchgraue und weiße Talkschiefer von außerordentlicher Härte (wohl größtentheils aus dem Montafuner Thale abstammend), graue bis grauschwarze und schwarze, selten gut gerundete Kieselschiefergerölle (aus arkosenartigem Flyschconglomerat?). Zu diesen Felsarten gesellen sich als Gerölle der Ablagerungen, nahezu einen Halbtheil derselben ausmachend, verschiedene Kalksteine der Alpen und Voralpen aus der Jura- und Kreideformation und endlich der Flyschsandstein. Unterhalb dem Zusammenfluß der Aare, so im Hochgestade von Bernau, erscheinen äußerlich gelbe bis rothgelbe, im Innern graulichweiße Quarzitgerölle, welche sehr häufig Schwefelkies derb und in kleinen Würfeln eingesprengt enthalten, sie werden von schwarzen Kieseln begleitet und finden sich schon in den hohen Kiesterrassen bei Aarau, sowie in allen neuen Absätzen dieses Flusses in Häufigkeit. Zu den Gesteinen, welche nicht aus den Alpen stammen, aber die Vielartigkeit des Rheinischen Diluviums vergrößern, gehören die Schwarzwaldgesteine, sodann Kalksteine des Randen- und Schweizerjura, höchst selten, aber sehr wahrheitsprechend für die Theorie einer alten Rheinströmung durch den Kleckgau (Seite 15) und die Annahme, daß der Rhein am Bodensee seinen Ausfluß geändert habe (Schill, die Quartär- und Tertiärbildungen am Bodensee und im Höhgau S. 73) ist das Vorkommen von Phonolithgeröllen.

Die Gerölle des Alpendiluviums sind gut zugerundet, jedoch nicht so glatt wie jene der neuesten Bildungen in Rhein und Aare; ihre Größe ist sehr verschieden, Kopfgröße ist das durchschnittliche Maximum und dieses verringert sich bis zur Kleinheit des Sandes. Die Gerölle aus Schwarzwaldgesteinen erreichen bedeutendere Größen, man findet solche von 2' und mehr Durchmesser. Die Kiesgruben zwischen dem Küssaberge und Zurzacher Berge, also im heutigen Rheinthale ob der Aare, enthalten natürlich keine Schwarzwaldgeröllstücke, und ihr Material ist feiner, enthält mehr kleineren Kies und Sand.

Sehr häufig sind die Gerölle selbst da und dort, stellenweise in Kiesgruben der Niederung durch ein Kalkbindemittel zu Nagelfluhe verbacken und mit Sandzwischenlagen unvollkommen geschichtet (Begräbnißplatz der Juden und Burgerwald bei Thiengen, Rheinufer bei Waldshut und Hauenstein, Allmendwald bei Kleinlaufenburg).

Eine sehr mächtige und hochgelegene Nagelfluhe aus Rheinischem Diluvium bedeckt den Rücken des westlichen Ausläufers des Küssaberges zwischen dem Kleckgau und Rheinthal oberhalb der Aarmündung; sie beginnt schon im Burgerwald und Roßhau, setzt an Mächtigkeit zunehmend auf die Berche und bildet oberhalb dem Rohle, zwischen Kadelburg und Dangstetten, eine über 70' hohe Wand. Ihr Liegendes besteht aus dem eisenschüssigen Kalkstein des Ammonites Murchisonae mit Pecten personatus und jüngeren Schichten des braunen Juras. Jener Kalkstein bildet am Fuß der Felswand eine vorspringende Terrasse mit Steilrand, die in der Karte nicht angedeutet ist; auf dieselbe und tiefer fielen viele Nagelfluhefelsen von der Größe kleiner Häuser, öfter zu malerischem Gewirr angehäuft, hernieder. Auf der Höhe über der Nagelfluhewand liegt nur erdiges Diluvium, welches das kleine Plateau der Berche bedeckt und dem Wald einen fruchtbaren Boden darbietet; diese Erde geht bis zur Höhenzahl von 1789' also noch höher als das übrige Rheinische Diluvium hinauf und erstreckt sich längs dem Bergrücken bis Bechtersbohl.

Die Geröllablagerungen werden, wie allerorts, zur Sand-, Schotter- und Pflastersteingewinnung durch Kiesgruben ausgebeutet. Die im Kies des Kleckgau