

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

12. Typhus

[urn:nbn:de:bsz:31-218294](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-218294)

17. Blattern.

Die Blattern treten in der neueren Zeit nur in vereinzelten, von außen eingeschleppten Fällen auf und sind dieselben überhaupt seit den Kriegsjahren 1870/71 nicht mehr zahlreich aufgetreten. Im Jahre 1890 starben daran nur 2 Personen (wie im Durchschnitt der Jahre 1881—90).

8. Masern.

An Masern starben in den letzten 10 Jahren:

1881	268	1885	410	1889	363
1882	428	1886	248	1890	205
1883	163	1887	297		
1884	266	1888	973	Durchschnitt	362

Mit Ausnahme des Jahres 1883 forderte diese Krankheit im Jahre 1890 die wenigsten Opfer in den letztverflossenen 10 Jahren, auch ist die Zahl der Todesfälle erheblich geringer als der Durchschnitt des Jahrzehnts, sowie derjenigen der 50er, 60er und 70er Jahre (Durchschnitt 1880/89: 354, 1870/79: 494, 1860/69: 338, 1852/59: 330).

9. Scharlach.

An Scharlach erlagen im letzten Jahrzehnt:

1881	742	1885	127	1889	277
1882	722	1886	120	1890	178
1883	302	1887	129		
1884	219	1888	239	Durchschnitt	305

Auch an Scharlach starben verhältnismäßig weniger Kinder, weniger als in den meisten Jahren des Jahrzehnts und als im Durchschnitt desselben, sowie auch den vorhergehenden Jahrzehnten. (Durchschnitt 1880/89: 387, 1870/79: 1029, 1860/69: 487, 1852/59: 441).

10. Keuchhusten.

An Keuchhusten starben:

1881	600	1885	714	1889	452
1882	558	1886	475	1890	365
1883	324	1887	313		
1884	511	1888	407	Durchschnitt	472

(Durchschnitt 1880/89: 479, 1870/79: 509, 1860/69: 463, 1852/59: 554), im Jahr 1890 also erheblich weniger als im Vorjahr und im Durchschnitt.

11. Diphtheritis (Rachenbräune) und Krup.

Diese Krankheiten forderten folgende Opfer:

Diphtherie			Krup		
1881	1007	688	1885	576	514
1882	929	555	1886	434	383
1883	479	303	1887	407	369
1884	554	459	1888	537	349
				Durchschnitt	632
					442

Beide Krankheiten hatten eine mäßige Sterblichkeit, die erstere etwas über, die letztere etwas unter dem Durchschnitt.

Die Krankheiten bei Ziff. 9 bis 11 sind wesentlich Kinderkrankheiten; das 1te Lebensjahr ist an denselben in verschiedenem Maße beteiligt. Im Jahr 1890 starben Untereinjährige an Masern 65 (31,7% der an Masern Gestorbenen), an Scharlach 8 (4,5%), an Keuchhusten 216 (59,2%), an Diphtheritis 52 (7,6%), und an Krup 56 (13,2%).

12. Typhus.

An Abdominaltyphus starben:

1881	403	1885	230	1889	217
1882	313	1886	230	1890	147
1883	312	1887	226		
1884	305	1888	263	Durchschnitt	270

denselben erlagen durchschnittlich 1880/89: 304, 1870/79: 866, 1860/69: 1134, 1852/59: 1658 Personen. Während die Krankheit in früheren Jahren in den größeren Gemeinden weniger häufig war als in den kleineren, ist in der neueren Zeit das Umgekehrte der Fall. So auch im Jahre 1890, wo in den Gemeinden mit über 4000 Einwohner daran 47 (0,11 auf 1000 Einwohner), in den übrigen Gemeinden 100 (0,08) starben.