

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

I. Die Gestorbenen nach Todesursachen

[urn:nbn:de:bsz:31-220905](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220905)

Statistische Mittheilungen

über das Großherzogthum Baden.

Band XVIII.

Jahrgang 1901.

Nr. 4.

Inhalt: 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1900. — 2. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1900.

1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1900.

(Vergl. Band XVII, Jahrgang 1900, Nr. 3, S. 39 ff.)

Die Ergebnisse der jährlichen regelmäßigen statistischen Ermittlungen über die Todesursachen, die ärztliche Behandlung der Gestorbenen, die Infektionskrankheiten, die Krankenanstalten und das Impfgeschäft für das Jahr 1900 sind im Folgenden in üblicher Weise dargestellt. Und zwar bringt die Tabelle 1 (sog. medizinische Tabelle) für Bezirke und Kreise, sowie für die größeren Gemeinden zunächst einige allgemeine Zahlen der Sterblichkeitsstatistik, giebt dann den Umfang der ärztlichen Behandlung in den tödtlich verlaufenen Krankheitsfällen und die Zahl der Todesfälle in Krankenanstalten an, und führt schließlich in hergebrachter Ausdehnung die Sterbefälle an den verbreitetsten Infektionskrankheiten, an Lungenschwindsucht und -Entzündung, an Krebs und an Kindbett, sowie die gewaltsam Gestorbenen auf. Die Tabelle 2 enthält in einer Landesübersicht die Sterbefälle für die sämtlichen Todesursachen. Der Tabelle 1 ist eine Uebersicht der Gesamtzahlen des vorhergehenden Jahrzehnts angefügt; in Tabelle 2 wird eine auf alle einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts ausgedehnte Nachweisung gegeben. Die Tabelle 3 zeigt die Verbreitung der Erkrankungen an den anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken und in den einzelnen Monaten des Jahres. Die Ergebnisse des Impfgeschäfts und die Verhältnisse der Krankenanstalten und ihrer Insassen sind in den Tabellen 4 und 5 bzw. in den begleitenden textlichen Ausführungen zur Darstellung gebracht.

I. Die Gestorbenen nach Todesursachen.

Die obligatorische Leichenschau ist im Großherzogthum im Ganzen seit 1807 bzw. 1809 vorgeschrieben und dadurch die Feststellung der wichtigeren Todesursachen schon seit sehr langer Zeit eine thumlichst gleichmäßige. War der Verstorbene während der mit Tod ausgehenden Krankheit u. von einem Arzt behandelt, so ist dessen Angabe, andernfalls diejenige des für jede Gemeinde des Landes vorhandenen amtlichen Leichenschauers maßgebend. Ueber jeden Todesfall wird von dem Leichenschauer ein besonderes Formular (der Leichenschauchein) ausgefüllt, das dem Staatsarzt des betr. Verwaltungsbezirks (Bezirksarzt) zur Kontrolle vorzulegen ist. Von letzterem werden die bezüglichen Angaben in die von den Landesbeamten aufgestellten und durch die Amtsgerichte gesammelten Auszüge über die Sterbefälle aus den Landesregistern eingetragen und vierteljährlich dem Großst. statistischen Landesamte zur weiteren Bearbeitung übermittelt. Auf dieses Material gründet sich die Todesursachenstatistik Badens, welcher seit Ausgang der 70er Jahre das auch für die Statistik der Stadt Berlin angenommene Virchow'sche System der Bezeichnungen zu Grunde gelegt ist.

1. Die ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen.

Seit 1852 findet eine Ermittlung der in ärztlicher Behandlung Gestorbenen statt; dieselben machten damals 47,4 % aller Gestorbenen aus. Ihre Zahl nahm zunächst rasch zu; sie betrug 1863 bereits 58,2 %, stieg dann aber nur langsam weiter und erreichte erst im Jahr 1877 die Höhe von 60,3 %. Nach einigem Schwanken wuchs sie abermals rascher an und betrug 1888 erstmals mehr als 65 %, 1900 über 71 %. Für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts und dessen Durchschnitt lauten die Zahlen wie folgt:

Jahre	Zahl der Gestorbenen (ohne Todtgeb.)	Davon in ärztlicher Behandlung gewesen Personen	%	Jahre	Zahl der Gestorbenen (ohne Todtgeb.)	Davon in ärztlicher Behandlung gewesen Personen	%
1891	38762	25730	66,4	1897	37422	26234	70,1
1892	37474	25341	67,6	1898	38574	27140	70,4
1893	41437	28664	69,2	1899	37575	26716	71,1
1894	39583	28301	71,5	1900	41566	29646	71,3
1895	37513	25900	69,0	im Durchschnitt			
1896	34986	24738	70,7	1891/1900	38489	26841	69,7

(Fortsetzung des Textes auf Seite 92.)

Tabelle 1 a.

Medizinische Tabelle der Amtsbezirke bezw. Gemeinden

1 Amtsbezirke.	2 Gestorbene mit Todtgeborenen	3 Todtgeborene		4 Gestorbene ohne Todtgeborene	5 Davon starben						6 im ersten Lebensjahr (ohne Todtgeb.)			
		Zahl	%		ärztlich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich behandelt in % der Gestorbene	in Kranken- und Pfllege- und sonstigen Anstalten		Zahl	%	auf 1000 Einwohner	Zahl	%
								Zahl	%					
Engen	513	15	2,92	498	347	151	69,7	61	12,2	130	26,1	6,3	13	10,0
Konstanz	1060	33	3,11	1027	826	201	80,4	133	13,0	297	28,9	5,6	21	7,1
Meßkirch	334	9	2,69	325	189	136	58,5	12	3,7	99	30,5	7,1	10	10,1
Pfullendorf	263	7	2,66	256	196	60	76,6	33	12,9	68	26,6	6,9	15	22,1
Stodach	449	7	1,56	442	280	162	63,3	15	3,4	142	32,1	7,6	9	6,3
Ueberlingen	686	20	2,92	666	475	191	71,3	50	7,5	221	33,2	7,8	30	13,6
Donauwörth	616	13	2,01	603	477	156	75,4	77	12,2	158	25,0	6,8	11	7,0
Trüben	480	16	3,33	464	345	119	74,4	17	3,7	134	28,9	5,8	6	4,5
Willingen	669	24	3,59	645	477	168	74,0	32	5,0	211	32,7	7,6	12	5,7
Bomdorf	369	21	5,69	348	231	117	66,4	20	5,7	70	20,1	4,5	7	10,0
Sickingen	411	14	3,41	397	240	157	60,5	24	6,0	109	27,5	5,3	6	5,5
St. Blasien	242	10	4,13	232	141	91	60,8	15	6,5	52	22,4	5,3	5	9,6
Waldshut	784	21	2,68	763	539	224	70,6	101	13,2	154	20,2	4,7	9	5,8
Breisach	410	22	5,37	388	318	70	82,0	14	3,6	91	23,5	4,6	1	1,1
Emmendingen	1107	53	4,79	1054	787	267	74,7	69	6,5	297	28,2	6,0	24	8,1
Ettenheim	431	15	3,46	416	302	114	72,6	8	1,9	133	32,0	7,3	4	3,0
Freiburg	2119	73	3,46	2046	1721	325	84,1	591	28,9	575	28,1	6,4	150	26,1
Neustadt	400	15	3,75	385	305	80	79,2	36	9,4	86	22,3	5,4	11	12,8
Staufen	435	15	3,45	420	334	86	79,5	8	1,9	90	21,4	5,0	5	5,5
Waldkirch	582	12	2,06	570	359	211	63,0	18	3,2	168	29,5	7,2	27	16,1
Lörrach	847	48	5,67	799	671	128	84,0	113	14,1	203	25,4	4,6	17	8,4
Müllheim	890	15	1,68	875	326	49	87,0	17	4,5	87	23,2	4,2	8	9,2
Schönau	352	17	4,83	335	231	104	69,0	12	3,6	91	27,2	5,7	7	7,7
Schopfheim	496	19	3,83	477	383	94	80,3	95	19,9	97	20,3	4,4	16	16,5
Kehl	549	25	4,55	524	393	131	75,0	3	0,6	166	31,7	5,8	28	16,9
Lahr	888	31	3,49	857	649	208	75,7	40	4,7	298	34,8	7,2	23	7,7
Oberkirch	450	12	2,67	438	314	124	71,7	15	3,4	125	28,5	6,7	3	4,0
Offenburg	1365	51	3,74	1314	932	382	70,9	106	8,1	386	29,4	6,6	30	9,3
Wolfach	627	31	4,94	596	406	190	68,1	11	1,9	173	29,0	6,9	13	10,4
Achern	520	13	2,50	507	342	165	67,5	48	9,5	129	25,4	5,2	14	10,9
Baden	700	28	4,00	672	513	159	76,3	80	11,9	215	32,0	7,0	18	8,4
Bühl	727	25	3,44	702	453	249	64,5	102	14,5	208	28,9	6,6	9	4,4
Kastatt	1346	42	3,12	1304	819	485	62,8	46	3,5	446	34,2	7,2	35	7,8
Bretten	504	31	6,15	473	331	142	70,0	11	2,3	171	36,2	7,1	12	7,0
Bruchsal	1843	72	3,91	1771	1042	729	58,8	29	1,6	868	49,0	13,6	51	5,9
Durlach	939	48	5,11	891	539	352	60,5	5	0,6	421	47,3	10,7	50	11,9
Ettlingen	601	23	3,83	578	340	238	58,9	7	1,2	258	44,6	9,9	24	9,3
Karlsruhe	2804	126	4,49	2678	2128	550	79,5	431	16,5	1024	38,2	7,7	171	16,7
Karlsruhe	2092	95	4,54	1997	1349	648	67,6	211	10,6	859	43,0	10,5	90	10,5
Mannheim	3948	215	5,45	3733	2844	889	76,2	429	11,5	1851	49,6	11,0	286	15,5
Schweigen	895	49	5,47	846	477	369	56,4	6	0,7	493	58,3	15,4	51	10,3
Weinheim	622	31	4,99	591	449	142	76,0	60	10,2	238	40,3	9,7	23	9,3
Eppingen	398	24	6,03	374	247	127	66,0	7	1,9	140	37,4	7,6	22	15,7
Heidelberg	2280	117	5,13	2163	1636	477	77,9	447	20,7	747	34,5	8,3	124	16,7
Sinsheim	839	46	5,48	793	514	279	64,8	29	3,7	281	35,4	8,2	22	7,8
Wiesloch	680	31	4,56	649	357	302	54,2	5	0,8	321	48,7	13,4	17	5,3
Welsheim	306	14	4,58	292	181	111	62,0	2	0,7	86	29,5	6,4	8	9,3
Borberg	307	9	2,93	298	165	133	55,4	5	1,7	86	28,9	5,5	3	3,5
Buchen	601	14	2,33	587	362	225	61,6	7	1,2	184	31,3	7,0	8	4,3
Eberbach	359	13	3,62	346	223	123	64,4	6	1,7	117	33,8	7,5	10	8,5
Mosbach	683	27	3,95	656	405	251	61,7	13	2,0	223	34,0	7,3	23	10,3
Lanzenbach	556	17	3,06	539	362	177	67,2	8	1,5	151	28,0	5,1	11	7,3
Bertheim	441	15	3,40	426	324	102	76,1	6	1,4	112	26,3	5,8	6	5,4

*) Diese sowie die in Tab. 2 (Abth. III. und V., Krankheitsnummern 24-26 und 31 a-31 o) gemachten Angaben über gewaltsamen diejenigen Todesfälle als gewaltsame gerechnet, bei denen überhaupt eine äußere Einwirkung vorausging, gleichviel, ob der Tod durch eine andere

mit über 4000 Einwohnern für das Jahr 1900.

Tabelle 1a.

Nach Todesursachen: Geschlechter																						
an Mätern	an Scharlach	an Malaria	an Diphtheritis	an Krupp	an Keuchhusten	an Scharlach	an Kindbettfieber		an Typhus	an Ruhr	an sonstigen Infektionskrankheiten	im Ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 16-27)		gewaltfam durch		an Sepsis	an Lungenerkrankung und atakter Bronchitis	an Lungenschwindsucht	im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 16-34		insbesondere Grippe	
							überhaupt	davon in den ersten 3 Wochen				Schlaf	% der Gesamtsterben	Selbstmord	Verunglückung und Verbrechen				Babst	% der Gesamtsterben		in den ersten 3 Wochen
11	—	—	5	3	2	27	3	—	—	3	3	54	10,84	4	9	40	45	47	199	40,0	5	
17	1	—	8	4	13	40	4	2	—	9	9	96	9,35	9	29	62	103	131	430	41,9	3	
4	—	—	1	—	17	15	2	2	—	3	3	43	13,28	2	9	25	27	35	141	43,4	2	
11	—	—	1	—	11	2	2	—	—	—	—	25	9,77	—	8	4	27	21	85	33,2	2	
22,1	1	—	3	3	—	20	—	—	—	—	—	28	6,83	4	8	30	60	33	163	36,9	2	
6,3	—	—	3	2	—	20	1	—	—	—	—	45	6,76	7	20	34	66	48	220	33,0	4	
13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
7,0	—	—	5	2	1	18	—	—	—	1	—	59	9,32	5	7	29	80	39	219	34,6	2	
4,5	—	—	2	2	2	23	2	2	—	3	—	38	8,19	3	12	18	62	42	170	36,8	5	
5,7	3	—	3	3	30	18	1	1	—	6	—	68	10,54	8	10	32	104	50	272	42,2	5	
10,0	—	—	3	—	24	25	3	3	—	2	—	57	16,38	3	12	29	33	21	146	42,0	3	
5,5	—	—	7	1	4	6	1	1	—	1	—	28	7,05	1	16	28	41	39	153	38,5	3	
9,6	—	—	—	—	2	7	—	—	—	2	—	2	4,74	—	4	12	36	22	85	36,6	3	
5,8	3	—	12	1	15	33	—	—	—	6	—	75	9,83	5	18	39	88	59	284	37,2	1	
1,1	—	—	4	1	4	19	3	3	—	2	—	45	11,60	2	6	22	40	33	148	38,1	7	
8,1	1	—	9	4	4	24	4	4	—	2	—	59	5,60	8	26	56	119	121	389	36,9	7	
3,0	—	—	1	1	3	13	3	3	—	3	—	36	8,65	3	5	8	54	59	156	37,5	4	
26,1	1	—	13	—	16	72	2	2	—	19	—	153	7,48	24	39	137	142	336	731	35,7	2	
12,8	—	—	2	—	2	8	1	1	—	6	—	29	7,53	3	14	23	60	32	161	41,8	1	
5,5	—	—	1	1	5	29	1	1	—	4	—	38	9,05	2	3	26	30	49	148	35,2	2	
16,1	3	—	7	1	1	8	1	1	—	4	—	26	4,56	10	12	22	75	51	196	34,4	3	
8,4	—	—	19	17	3	8	3	3	—	8	—	67	8,39	9	24	35	110	77	322	40,3	6	
9,2	1	—	2	2	1	14	1	1	—	2	—	24	6,40	6	8	23	40	46	147	39,2	1	
7,7	—	—	5	1	7	6	3	3	—	1	—	26	7,76	1	11	14	42	17	111	33,1	4	
16,5	6	—	6	2	3	32	1	1	—	6	—	57	11,95	4	16	26	54	39	196	41,1	5	
16,9	8	—	3	—	1	20	1	1	—	3	—	39	7,44	7	11	30	33	59	179	34,2	4	
7,7	11	—	10	3	—	22	—	—	—	10	—	57	6,65	4	20	41	77	100	299	34,9	4	
4,0	10	—	1	—	8	28	2	1	—	1	—	51	11,84	7	10	25	43	40	176	40,2	2	
9,3	10	—	20	7	8	61	3	2	—	4	—	120	9,13	7	25	63	138	140	493	37,5	6	
10,4	7	—	7	7	—	44	5	5	—	4	—	74	12,42	4	21	31	59	52	241	40,4	5	
10,9	5	—	10	2	5	18	2	1	—	7	—	51	10,06	2	12	25	50	46	186	36,7	4	
8,4	19	—	5	4	1	13	3	2	—	4	—	46	6,85	10	9	31	59	78	233	34,7	4	
4,4	45	—	7	5	3	14	6	5	—	5	—	46	6,55	2	10	25	60	56	199	28,3	5	
7,8	3	—	3	7	9	8	1	1	—	1	—	34	7,19	4	10	20	47	27	142	30,0	3	
7,0	3	—	1	5	10	38	4	3	—	4	—	69	3,90	4	36	50	175	190	524	29,8	12	
5,9	4	—	14	6	3	16	1	1	—	2	—	49	5,50	10	12	17	81	86	255	28,6	2	
11,9	6	—	—	—	4	10	1	1	—	4	—	31	5,36	3	4	12	59	70	179	31,0	5	
9,3	15	—	6	1	10	8	7	53	12	12	7	37	145	5,42	34	54	122	259	331	945	35,3	15
16,7	4	—	40	35	42	25	11	10	—	36	—	17	228	11,32	26	38	71	181	177	721	36,1	13
10,5	15	—	16	—	12	36	13	11	—	18	—	42	233	6,24	44	103	108	320	438	1246	33,4	14
15,5	8	—	5	—	4	28	1	—	—	4	—	47	5,56	2	18	22	89	81	259	30,6	2	
10,3	5	—	3	3	4	13	4	3	—	3	—	4	7,95	7	10	24	59	65	212	35,9	3	
9,2	—	—	1	2	4	11	1	1	—	2	—	23	6,15	2	6	7	48	31	117	31,3	1	
15,7	6	—	19	5	4	19	12	11	—	9	—	38	119	5,50	35	61	146	199	277	837	38,7	13
16,7	5	—	4	10	7	34	2	2	—	4	—	5	71	8,05	3	13	36	90	55	268	33,8	3
7,8	9	—	2	—	7	9	2	2	—	3	—	2	35	5,81	2	6	23	78	82	226	34,3	5
5,3	1	—	4	—	1	10	—	—	—	6	—	23	7,88	—	4	8	20	21	76	26,0	1	
9,3	3	—	5	—	—	16	1	1	—	3	—	26	8,72	—	2	7	31	26	92	30,9	1	
3,5	—	—	3	4	3	36	1	1	—	2	—	3	55	9,37	3	3	36	41	48	186	31,7	2
4,3	—	—	6	2	5	6	—	—	—	4	—	25	7,23	3	6	8	36	41	119	34,3	2	
8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10,3	1	—	11	5	7	21	2	2	—	1	—	51	7,77	4	6	23	57	50	191	29,1	7	
7,3	1	—	3	—	3	21	—	—	—	4	—	3	35	6,49	5	11	30	68	53	202	37,5	4
5,4	28	—	3	—	1	7	18	—	—	2	—	4	65	15,26	2	8	26	55	41	197	46,2	—

Einzelfälle stimmen nicht überein. Dort werden auch Hitzschlag und Folgen von Operationen mitgezählt, hier dagegen nicht. Ferner werden hier alle eingetretene Krankheit berücksichtigt wurde oder nicht, während in Tab. 2 der letztere Umstand berücksichtigt ist. —**) an Krankheiten jeglicher Art.



Noch: Tabelle 1 a.

Noch: Medizinische Tabelle der Amtsbezirke bezw.

1 Amtsbezirke bezw. Gemeinden.	2 Gestor- bene mit Tobt- ge- borenen	3 Tobtge- geborene		4 Ge- storbene ohne Tobt- geborene	5 Davon starben													
		6 Zahl	7 % der Ge- storb- enen mit Tobtge- borenen		8 ärztl- ich be- handelt	9 nicht ärztl- ich	10 ärztlich be- handelt in % der Ge- storb- enen	11 in Kranken- und Pflege- und sonstigen Anstalten		12 im ersten Lebensjahr (ohne Tobtgeb.)								
								13 Zahl	14 % der Ge- storb- enen	15 Zahl	16 % der Ge- storb- enen ohne Tobtgeb.	17 auf 1000 Ein- wohner	18 Zahl	19 % der im ersten Lebensjahr Geborenen				
Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens:																		
Mannheim	799	34	4,26	765	478	287	62,5	7	0,9	408	53,3	14,7	64	15,7				
Karlsruhe	959	54	5,63	905	531	374	59,7	—	—	409	45,2	11,2	51	12,5				
Freiburg	581	11	1,89	570	425	145	74,6	—	—	158	27,7	5,5	21	13,3				
Pforzheim	1078	60	5,57	1018	523	495	51,4	—	—	468	46,0	12,3	33	7,1				
Heidelberg	1218	61	5,01	1157	757	400	65,4	9	0,8	503	43,5	10,1	63	12,5				
Konstanz	675	18	2,67	657	481	176	73,2	37	5,6	200	30,4	6,3	15	7,5				
Gemeinden:																		
Mannheim	3149	181	5,75	2968	2366	602	79,7	422	14,2	1443	48,6	10,2	222	15,4				
Karlsruhe	1845	72	3,90	1773	1597	176	90,1	431	24,3	615	34,7	6,3	120	19,5				
Freiburg	1538	62	4,03	1476	1296	180	87,8	591	40,0	417	28,3	6,8	129	30,9				
Pforzheim	1014	35	3,45	979	826	153	84,4	211	21,6	391	39,9	9,0	57	14,6				
Heidelberg	1062	56	5,27	1006	929	77	92,3	438	43,5	244	24,3	6,1	61	25,0				
Konstanz	385	15	3,90	370	345	25	93,2	96	25,9	97	26,2	4,5	6	6,1				
Baden	332	19	5,72	313	277	36	88,5	77	24,6	68	21,7	4,3	7	10,3				
Rastatt	193	7	3,63	186	158	28	85,0	33	17,7	65	35,0	4,7	6	9,2				
Offenburg	244	9	3,69	235	208	27	88,5	27	11,5	73	31,1	5,3	6	8,2				
Lahr	270	11	4,07	259	227	32	87,6	40	15,4	76	29,3	5,6	12	15,8				
Bruchsal	298	16	5,37	282	241	41	85,5	27	9,6	117	41,5	8,6	9	7,7				
Durlach	269	12	4,46	257	213	44	82,9	5	1,9	117	45,8	10,3	13	11,1				
Weinheim	292	18	6,16	274	221	53	80,7	60	21,9	101	36,9	9,0	9	8,9				
Lörrach	223	9	4,04	214	198	16	92,5	52	24,3	54	25,2	5,2	4	7,4				
Ettlingen	205	8	3,90	197	161	36	81,7	7	3,6	92	46,7	11,5	15	16,3				
Billingen	209	10	4,78	199	168	31	84,4	21	10,6	69	35,0	8,8	4	5,8				
Schweizingen	154	13	8,44	141	103	38	73,0	6	4,3	86	61,0	13,4	10	11,6				
Sodenheim, Vdg.	136	7	5,15	129	72	57	55,8	—	—	76	58,9	11,0	5	6,6				
Brüdingen, Vdg.	176	13	7,39	163	97	66	59,5	—	—	93	57,1	14,8	8	8,6				
Emmendingen	161	7	4,22	154	140	14	90,9	69	44,8	36	23,4	5,8	7	19,4				
Eberbach	136	3	2,21	133	105	28	78,9	4	3,0	41	30,8	7,0	4	9,8				
Sodenheim	166	5	3,01	161	74	87	46,0	—	—	91	56,5	15,7	11	12,1				
Sandhofen, Vdg.	211	9	4,27	202	103	99	52,0	—	—	125	61,9	23,5	21	16,8				
Furtwangen	107	3	2,80	104	90	14	86,5	6	5,8	37	35,6	7,4	1	2,7				
Waldfirch	119	2	1,68	117	93	24	79,5	18	15,4	40	34,2	8,0	4	10,0				
Bretten	109	6	5,50	103	82	21	79,6	11	10,7	36	35,0	7,5	2	5,6				
Heidenheim, Vdg.	137	3	2,19	134	86	48	64,2	—	—	81	60,5	18,0	16	19,8				
Heberlingen	128	2	1,56	126	112	14	88,9	31	24,6	26	20,6	6,1	2	7,7				
Lichtenthal, Vdg.	133	1	0,75	132	107	25	81,1	3	2,3	54	40,9	12,7	2	3,7				
Bühlertal, Vdg.	100	3	3,00	97	47	50	48,5	—	—	40	41,2	9,6	2	5,0				
Kehl-Dorf, Vdg.	75	8	10,67	67	56	11	83,6	—	—	27	40,3	6,5	9	33,3				
Kadolfzell	97	4	4,12	93	80	13	86,0	25	26,8	30	32,3	7,2	4	13,3				
Weingarten, Vdg.	84	4	4,76	80	66	14	82,5	—	—	32	40,0	7,6	4	12,5				
Säckingen	78	2	2,56	76	71	5	93,4	24	31,6	10	13,2	2,5	—	—				
Im Ganzen für diese Gemeinden	13835	635	4,59	13200	11015	2185	83,4	2735	20,7	5000	37,9	8,1	792	15,8				
Im Ganzen für die übrigen Gemeinden.	29510	1144	3,88	28366	18631	9735	65,7	1011	3,6	9535	33,6	7,6	830	8,7				

*) und **) Siehe die Anmerkungen *) und **) auf Seite 72.

Gemeinden mit über 4000 Einwohnern für das Jahr 1900. Nach: Tabelle 1a.

		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
		Nach Todesursachen: Gestorben																					
an Mätern	an Scharlach	an Malaria	an Diphtheritis	an Krupp	an Keuchhusten	an Influenza	an Kindbettfieber		an Typhus	an Ruhr	an sonstigen Infektionskrankheiten	in Ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 16-27)		gewaltjam*) durch		an Krebs	an Lungen-entzündung und an Bronchitis	an Lungen-schwindsucht	in Ganzen durch die Ursachen in Spalte 16-34		insbesondere Kinder betreuenden in der ersten 3 Wochen (**)		
							überhaupt	darvon in den ersten 3 Wochen				Zahl	% der Geborenen	Selbstmord	Berührung und Verbrechen				Zahl	% der Geborenen			
15,7	33	4	—	6	2	5	9	1	1	—	5	65	8,50	8	15	27	60	81	256	33,5	4		
12,5	1	1	1	2	6	5	19	2	2	1	8	46	5,08	5	10	23	80	109	273	30,2	5		
13,3	1	1	—	3	—	11	32	1	1	1	3	53	9,30	5	15	23	44	45	185	32,3	3		
7,1	5	—	—	18	15	12	17	6	5	17	6	96	9,43	13	15	26	107	75	332	22,8	8		
12,5	5	3	—	2	—	1	6	6	4	—	11	88	3,28	15	21	51	108	143	376	32,5	6		
7,5	6	—	—	8	4	10	29	2	1	—	6	65	9,89	5	22	42	70	76	280	42,6	2		
15,4	19	12	—	26	10	7	27	12	10	18	37	168	5,63	36	88	81	260	357	990	33,4	10		
19,5	3	5	—	8	2	2	34	10	10	6	29	99	5,68	29	44	99	179	222	672	37,9	10		
30,9	20	—	—	10	—	5	40	1	1	8	16	100	6,77	19	24	114	98	191	546	37,0	4		
14,6	10	7	—	22	20	30	8	5	5	19	11	132	13,48	13	23	45	74	102	389	39,7	5		
25,0	1	3	—	17	5	3	13	6	5	5	1	27	8,05	20	40	95	91	134	461	45,8	7		
6,1	11	1	—	—	—	3	11	2	1	—	3	31	8,38	4	7	20	33	55	150	40,5	1		
10,3	—	2	—	1	3	1	4	3	2	2	3	19	6,07	6	2	14	20	37	98	31,3	3		
9,2	1	1	—	—	—	4	1	1	6	—	1	14	7,53	3	3	8	16	26	70	37,6	1		
8,2	8	—	—	2	2	1	4	—	—	—	6	18	7,66	2	3	11	33	29	96	40,9	—		
15,8	—	—	—	3	3	—	7	—	—	—	6	19	7,34	3	8	17	18	38	103	39,7	1		
7,7	1	—	—	—	—	3	8	—	—	1	3	16	5,67	3	12	15	33	23	102	36,2	1		
11,1	2	2	—	2	4	—	5	—	—	—	—	15	5,84	6	5	3	15	24	68	26,5	—		
8,9	6	—	—	—	—	—	5	2	1	1	2	16	5,84	4	6	16	20	34	96	35,0	1		
7,4	4	—	—	7	5	3	1	2	2	1	4	27	12,62	—	6	11	26	19	89	41,6	2		
16,3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	8	4,06	2	2	3	26	21	62	31,5	—		
5,8	2	1	—	1	3	2	5	—	—	—	3	17	8,54	3	3	10	26	21	80	40,2	—		
11,6	—	—	—	—	1	5	1	—	—	—	1	8	5,68	—	4	2	14	8	36	25,5	—		
6,6	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	3	2,33	3	8	2	8	10	34	26,4	1		
8,6	3	—	—	—	2	1	—	—	—	5	—	11	6,75	4	—	5	15	18	53	32,5	—		
19,4	—	—	—	—	1	—	4	—	—	8	—	13	8,44	—	4	12	13	18	60	39,0	1		
9,8	—	1	—	3	—	1	1	—	—	—	4	10	7,52	3	2	1	9	19	44	33,1	—		
12,1	—	—	—	1	3	—	2	—	—	1	—	7	4,35	1	2	3	8	22	43	26,7	—		
16,8	5	3	—	1	—	5	1	—	—	—	1	16	7,92	2	2	5	32	18	75	37,1	—		
2,7	2	—	—	2	2	6	—	—	—	—	1	13	12,50	2	2	3	15	7	42	40,4	—		
10,0	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	3	2,56	2	3	2	16	7	33	28,2	—		
5,6	2	—	—	—	3	1	3	—	—	2	—	11	10,68	1	4	4	7	7	34	33,0	—		
19,8	25	—	—	3	—	—	2	—	—	—	—	30	22,39	1	—	3	4	12	50	37,3	—		
7,7	5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	8	6,35	3	4	6	10	10	41	32,5	—		
3,7	—	—	—	—	—	—	6	—	—	3	2	11	8,33	1	1	5	12	24	54	40,9	1		
5,0	8	—	—	—	2	4	—	—	1	1	—	16	16,49	—	1	1	7	9	34	35,1	—		
33,3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	2,09	—	1	4	4	5	16	23,9	—		
13,3	1	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	7	7,57	—	—	6	11	9	33	35,5	—		
12,5	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	3	3,75	—	2	6	11	6	28	35,0	—		
—	5	—	—	2	1	—	—	—	2	—	1	11	14,47	—	3	7	10	15	46	60,5	—		
15,6	148	38	—	113	70	71	222	46	39	92	1	162	963	7,30	176	319	639	1174	1557	4828	36,6	49	
8,7	304	33	1	231	122	271	936	89	81	75	1	167	2230	7,86	194	559	1243	3015	2699	9940	35,0	189	

Tabelle 1b. Medizinische Tabelle der Kreise, landeskommissarischen Bezirke, Landesgegenden

Kreise etc. und Großherzogthum.	Gestorbene mit Todesgeborenen	Todesgeborene		Gestorbene ohne Todesgeborene	Davon starben					(im ersten Lebensjahr ohne Todesgeb.)								
		Zahl	%		ärztlich behandelt	nicht ärztlich behandelt	in Kranken- und Pflanz- und sonstigen Anstalten		Zahl	%	auf 1000 Ein- woh- ner	Zahl	%					
							Zahl	%						Zahl	%			
Kreise:																		
Konstanz . . .	3 305	91	2,75	3 214	2 313	901	72,0	304	9,5	957	29,8	6,6	98	10,2				
Billingen . . .	1 795	53	2,95	1 742	1 299	443	74,6	126	7,2	503	28,9	6,8	29	5,8				
Balldorf . . .	1 806	66	3,65	1 740	1 151	589	66,1	160	9,2	385	22,1	4,9	27	7,0				
Freiburg . . .	5 484	205	3,74	5 279	4 126	1 153	78,2	744	14,1	1 440	27,3	6,1	222	15,9				
Lörrach . . .	2 085	99	4,75	1 986	1 611	375	81,1	237	11,9	478	24,1	4,7	48	10,0				
Offenburg . . .	3 879	150	3,87	3 729	2 694	1 035	72,2	175	4,7	1 148	30,8	6,6	110	9,6				
Baden . . .	3 293	108	3,28	3 185	2 127	1 058	66,8	276	8,7	993	31,2	6,7	76	7,7				
Karlsruhe . . .	8 783	395	4,50	8 388	5 729	2 659	68,3	694	8,3	3 601	42,9	9,8	398	11,1				
Mannheim . . .	5 465	295	5,40	5 170	3 770	1 400	72,9	495	9,6	2 582	49,9	11,4	360	13,9				
Heidelberg . . .	4 197	208	4,96	3 989	2 804	1 185	70,3	488	12,2	1 489	37,3	8,9	185	12,9				
Rosbach . . .	3 253	109	3,35	3 144	2 022	1 122	64,3	47	1,5	959	30,5	6,4	69	7,2				
Bezirke der Landeskommissare:																		
Konstanz . . .	6 906	210	3,04	6 696	4 768	1 933	71,1	590	8,8	1 845	27,6	6,2	154	8,3				
Freiburg . . .	11 448	454	3,97	10 994	8 431	2 563	76,7	1 156	10,5	3 066	27,9	6,0	380	12,9				
Karlsruhe . . .	12 076	593	4,17	11 573	7 856	3 717	67,9	970	8,4	4 594	39,7	8,9	474	10,3				
Mannheim . . .	12 915	612	4,74	12 303	8 596	3 707	69,9	1 030	8,4	5 030	40,9	9,3	614	12,2				
Landesgegenden.																		
I. See- und Donau- gegend u. Niddgau	4 989	149	2,99	4 840	3 498	1 342	72,3	433	8,9	1 396	28,8	6,6	128	9,2				
II. Hoher Schwarz- wald u. Schwarz- waldbühler . . .	4 824	167	3,46	4 657	3 263	1 394	70,1	344	7,4	1 180	25,5	5,7	110	9,2				
III. Obere Rheinebene u. gehörige Theile der betr. Bezirke	9 788	386	3,94	9 402	7 228	2 174	76,9	1 119	11,9	2 658	28,3	6,9	319	12,0				
IV. Untere Rheinebene und begleitendes Hügelland . . .	17 372	805	4,63	16 567	11 435	5 132	69,1	1 327	8,0	7 305	44,1	10,0	850	11,6				
V. Oberrhein, Neckar- und Tauber- gegend	6 372	272	4,27	6 100	4 222	1 878	69,2	523	8,6	1 987	32,6	7,2	215	10,8				
Großherzogthum	43 345	1 779	4,10	41 566	29 646	11 920	71,3	3 746	9,0	14 535	35,0	7,8	1 622	11,2				
1899 . . .	39 279	1 704	4,34	37 575	26 715	10 860	71,1	3 274	8,7	12 718	33,8	7,0	1 475	11,6				
1898 . . .	40 193	1 619	4,03	38 574	27 140	11 434	70,4	3 240	8,4	13 497	35,0	7,5	1 590	11,3				
1897 . . .	39 026	1 604	4,11	37 422	26 234	11 188	70,1	3 027	8,1	12 812	34,2	7,3	1 520	11,9				
1896 . . .	36 603	1 617	4,42	34 986	24 738	10 248	70,7	2 918	8,3	10 670	30,5	6,1	1 294	12,1				
1895 . . .	39 081	1 568	4,01	37 513	25 900	11 613	69,0	2 891	7,7	12 822	34,2	7,5	1 544	12,0				
1894 . . .	41 109	1 526	3,71	39 583	28 301	11 282	71,5	3 099	7,8	11 461	29,0	6,7	1 349	11,8				
1893 . . .	42 928	1 491	3,47	41 437	28 664	12 773	69,2	2 906	7,0	12 283	29,6	7,4	1 392	11,3				
1892 . . .	39 008	1 534	3,93	37 474	25 341	12 133	67,6	2 759	7,4	11 969	31,9	7,1	1 379	11,5				
1891 . . .	40 283	1 521	3,78	38 762	25 730	13 032	66,4	2 672	6,9	12 782	33,0	7,7	1 445	11,3				
Durchschnitte:																		
1891—1900 . . .	40 085	1 596	3,98	38 489	26 841	11 648	69,7	3 053	7,9	12 555	32,6	7,2	1 461	11,6				
1890—1899 . . .	39 716	1 563	3,94	38 153	26 470	11 683	69,4	2 944	7,7	12 226	32,0	7,1	1 427	11,6				
1880—1889 . . .	39 716	1 627	4,10	38 089	23 867	14 222	62,7	2 096	5,5	12 413	32,6	7,8	1 308	10,5				
1870—1879 . . .	44 157	2 006	4,54	42 151	24 968	17 183	59,2	1 589	3,8	15 615	37,0	10,4	1 721	11,0				
1860—1869 . . .	39 177	1 816	4,64	37 361	21 791	15 570	58,3	998	2,7	13 967	37,4	10,2	2 615	18,7				
1852—1859 . . .	36 927	1 615	4,37	35 312	18 227	17 085	51,6	765	2,3	11 428	32,4	8,6	2 254	19,7				

*) und **) Siehe die Anmerkungen *) und **) auf Seite 72.

und des Großherzogthums für das Jahr 1900 (unter Vergleichung mit den Vorjahren). Tabelle 1 b.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1900		Nach Todesursachen: G e s t a r b e n																			
an Malaria	an Scharlach	an Mattern	an Diphtheritis	an Krupp	an Keuchhusten	an Influenza	an Kindbettfieber		an Typhus	an Ruhr	an sonstigen Infektionskrankheiten	im Ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 16-27)		gewaltfam*) durch		an Krebs	an Vergiftungen und ataxischer Stomatitis	an Lungenschwindsucht	im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 16-34		insbesondere durch betriebl. Störungen in den ersten 3 Wochen
							überhaupt	davon in den ersten 3 Wochen				Zahl	% der Gestorbenen	Selbstmord	Verunglückung und Verbrechen				Zahl	% der Gestorbenen	
61	2	—	17	13	32	133	12	10	1	—	20	291	9,05	26	83	195	328	315	1 238	38,5	19
37	3	—	10	7	33	59	3	3	3	—	10	165	9,47	16	29	74	246	131	661	37,9	12
9	3	—	22	2	45	71	4	4	4	—	11	171	9,83	9	50	99	198	141	668	38,4	10
56	2	—	36	8	35	173	15	14	20	1	40	386	7,31	52	105	294	520	572	1 929	36,5	31
16	—	—	32	22	14	60	8	8	5	—	17	174	8,76	20	59	98	246	179	776	39,1	16
46	2	—	41	17	17	175	11	9	10	—	22	341	9,14	29	87	190	350	391	1 388	37,2	21
76	6	—	22	12	23	59	13	10	21	—	22	254	7,97	25	54	136	308	337	1 114	35,0	24
35	16	1	68	63	75	150	30	28	54	—	64	556	6,63	81	154	292	802	881	2 766	33,0	50
64	21	—	36	19	20	77	18	14	22	—	50	327	6,32	53	131	154	468	584	1 717	33,2	19
20	7	—	26	17	22	73	17	16	18	1	47	248	6,22	42	86	212	415	445	1 448	36,3	21
32	9	—	34	12	26	128	4	4	9	—	26	280	8,91	17	40	138	308	280	1 063	33,8	15
107	8	—	49	22	110	263	19	17	8	—	41	627	9,36	51	162	368	772	587	2 567	38,3	41
118	4	—	109	47	66	408	34	31	35	1	79	901	8,19	101	251	582	1116	1142	4 093	37,2	41
111	22	1	90	75	98	209	43	38	75	—	86	810	7,00	106	208	428	1110	1218	3 880	33,5	74
116	37	—	96	48	68	278	39	34	49	1	123	855	6,95	112	257	504	1191	1309	4 228	34,4	55
95	5	—	28	18	87	194	16	14	3	—	29	475	9,81	42	112	276	545	425	1 875	38,7	29
50	3	—	49	15	44	195	16	15	9	—	34	415	8,91	38	134	233	560	393	1 773	38,1	32
104	4	—	91	39	53	314	25	22	34	1	70	735	7,82	76	189	491	898	1013	3 397	36,1	57
160	44	1	119	93	121	274	60	52	99	—	127	1098	6,63	159	329	562	1594	1813	5 555	33,5	90
43	15	—	57	27	37	181	18	17	22	1	69	470	7,70	55	114	320	597	612	2 168	35,5	30
452	71	1	344	192	342	1158	135	120	167	2	329	3193	7,68	370	878	1882	4189	4256	14 768	35,5	238
225	35	—	311	236	466	301	122	106	194	—	292	2182	5,81	351	834	1858	4003	4144	13 372	35,6	241
182	41	—	378	188	533	285	99	87	135	3	280	2124	5,51	359	787	1841	4139	4334	13 584	35,2	214
487	54	—	489	219	397	180	92	82	192	4	261	2375	6,35	329	741	1750	3780	4433	13 408	35,8	196
416	96	—	543	257	264	161	83	76	134	2	279	2235	6,39	336	741	1824	3740	4557	13 433	38,4	194
377	62	—	676	320	209	231	122	106	123	2	260	2382	6,33	337	709	1719	3682	4571	13 400	35,7	250
685	134	—	1831	675	548	850	117	106	183	4	320	5347	13,51	337	621	1636	4586	4863	17 390	43,9	240
550	91	—	1911	816	294	850	151	139	192	—	384	5239	12,84	354	651	1643	4710	4654	17 251	41,6	339
469	92	—	1075	560	376	547	145	133	167	3	277	3711	9,90	359	554	1504	4161	4504	14 793	39,4	298
631	130	—	961	507	494	53	163	151	183	4	313	3439	8,87	353	637	1572	4124	4664	14 789	38,1	333
447	81	0,1	852	397	392	462	123	111	167	2	300	3223	8,37	349	715	1723	4111	4498	14 619	38,0	254
423	91	0,2	886	420	395	436	123	111	165	5	294	3238	8,49	339	692	1688	4128	4568	14 653	38,4	266
354	387	2	674	478	479	216	111	100	304	25	305	3224	8,46	317	596	1311	4462	4493	14 403	37,8	401
494	1029	410	509	509	509	509	509	509	866	92	3400	3400	3400	253	581	581	4628	8862	8862	8862	454
338	487	75	463	463	463	463	463	463	1134	228	2725	2725	2725	183	522	522	3430	3430	3430	3430	388
330	441	28	572	554	554	554	554	554	1658	1207	4790	4790	4790	148	435	435	5373	5373	5373	5373	320

Tabelle 2 a.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	im Ganzen.	davon				Nr. des Systems.	Todesursachen.	im Ganzen.	davon			
			männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.				männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.
I. Infektionskrankheiten.													
1	Masern	452	201	251	399	163	31n	Folgen der Operation . . .	5	2	3	5	1
2	Scharlach	71	33	38	69	8	31o	Hinrichtung	1	1	—	—	—
3a	Pocken (Blattern)	1	—	1	1	—	Summe V						
3b	Varicellen	5	2	3	5	3	32	Lebensschwäche d. Neugebor.	2164	1247	917	481	2164
4	Rose	55	33	22	52	19	33	Bildungsfehler	25	15	10	22	24
5a	Rachenbränne, Diphtheritis	344	169	175	332	32	34	Zahnen	34	14	20	13	19
5b	Diphtherie anderer Organe	3	2	1	3	—	35	Englische Krankheit	172	100	72	124	75
6	Krupp	192	112	80	185	34	36	Abzehrung der Kinder	1179	627	552	631	1098
7	Keuchhusten	342	157	185	248	227	37	Drüsenabzehrung	129	77	52	101	79
8	Grippe (Influenza)	1158	530	628	965	64	38	Erschöpfung (Peri. unter 60 J.)	76	26	50	40	—
9a	Eitervergiftung	137	81	56	136	17	39	Altersschwäche (Peri. ab 60 J.)	3240	1441	1799	1361	—
9b	Hospitalbrand	—	—	—	—	—	40	Brand der Alten	37	19	18	36	—
10	Kindbettfieber	135	—	135	134	—	41a	Brandgeschwür	5	3	2	5	2
11	Karbunkel	7	7	—	7	1	41b	Druckbrand	7	1	6	7	—
12	Abdominaltyphus	167	79	88	167	—	41c	Wasserkrebs	1	—	1	1	—
13	Fleckfieber	1	1	—	1	—	41d	Anderer Arten von Brand	6	4	2	6	1
14	Rückfallfieber	—	—	—	—	—	42	Krebs und Geschwülste	1882	819	1063	1813	5
15	Muhr	2	1	1	2	—	43	Kropf	10	3	7	9	1
16	Epidemische Cholera	—	—	—	—	—	44	Storbut	4	3	1	4	—
17	Mumps	—	—	—	—	—	44a	Blutfleckenkrankheit	14	6	8	13	2
18	Epidemische Genickstarre	6	6	—	6	—	44c	Bluterkrankheit	3	3	—	3	—
19	Beckelstieber	2	2	—	2	—	45	Blutmangel	44	17	27	39	1
20	Acuter Gelenkrheumatismus	57	36	21	53	—	46	Weißblütigkeit	22	9	13	22	1
21	Syphilis	49	23	26	40	41	47	Wassersucht	413	136	277	250	—
22	Sonst. Infektionskrankheiten	7	4	3	7	6	48	Zuckerkrankheit	121	74	47	117	—
Summe I		3193	1479	1714	2823	615	49	Gicht	42	13	29	22	—
II. Zoonosen.													
23a	Hundswuth	—	—	—	—	—	50	Bronchkrankheit	1	1	—	1	—
23b	Milzbrand	1	1	—	1	—	51	Sonstige Störungen d. Ent- wicklung und Ernährung	22	9	13	14	14
23c	Rogkrankheit	—	—	—	—	—	Summe VI						
Summe II		1	1	—	1	—	VII. Krankh. d. Werkzeuge.						
III. Vergiftungen*).													
24	Zhierische u. pflanzl. Gifte	13	8	5	11	1	A. Krankheiten der Haut und Muskeln.						
25a	Acute Art der mineral. Gifte	25	11	14	14	—	52	Blutschwärmrucht	23	11	12	20	18
25b	Chronische Art derselben	4	3	1	4	—	53	Zellgewebeerkrankung	29	22	7	27	15
26	Giftige Gase	4	1	3	3	—	54	Zellgewebeerhärtung der Neugeborenen	—	—	—	—	—
27	Trunksucht	51	44	7	38	—	55	Nabelentzündung	11	6	5	11	11
Summe III		97	67	30	70	1	56	Sonst. Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	38	18	20	29	20
IV. Parasiten.													
28	Wurmkrankheiten	—	—	—	—	—	57	Progressive Muskelentartung	4	1	3	4	—
29	Schwämmchen	20	9	11	11	20	Zusammen A						
30a	Trichinose	—	—	—	—	—	B. Krankheiten der Knochen und Gelenke.						
30b	Akinomykose	4	3	1	4	—	58	Knochen- u. Gelenkentzündg.	242	126	116	223	5
Summe IV		24	12	12	15	20	59	Knochenweichung	10	3	7	10	3
V. Tod durch äußere Ein- wirkungen, gewalts. Tod*).													
31a	Verbrennung u. Verbrühung	89	47	42	37	3	Zusammen B						
31b	Erfrierung	6	6	—	—	—	C. Krankheiten des Gefäß- systems.						
31c	Ertrinken	222	168	54	8	3	60a	Herzbeutelentzündung	39	21	18	39	—
31d	Erhängen	199	167	32	2	5	60b	Wassersucht des Herzbeutels	21	7	14	19	—
31e	Erfstiden	23	15	8	3	11	61	Herzvergrößerung	136	65	71	128	—
31f	Hitzschlag	20	14	6	15	—	62	Herzfehler	1318	505	813	1263	22
31g	Blitzschlag	12	8	4	2	—	63	Verreißung des Herzens	1	1	—	1	—
31h	Explosion	2	1	1	2	—	64	Herzlähmung	1067	527	540	808	45
31i	Ueberfahren	154	132	22	60	—	65	Arterienkrankheiten	170	83	87	167	—
31k	Sturz und Schlag	322	279	43	202	1	66	Venenkrankheiten	22	7	15	22	—
31l	Schusswunden	92	88	4	21	—	Zusammen C						
31m	Stich-, Schnitt-, Biß- und andere Wunden	43	36	7	22	—	2774	1216	1558	2447	70	—	

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 72.

Fälle im Jahr 1900.
Ärzte bezw. Leichenschauer.

Tabelle 2a.

Nr. des Systems	Todesursachen.	Im Ganzen.	Davon				Nr. des Systems	Todesursachen.	Im Ganzen.	Davon							
			männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	im 1. Lebens- jahr.				männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	im 1. Lebens- jahr.				
	D. Krankheiten des Nervensystems u. d. Sinneswerkzeuge.																
67	Hirnhautentzündung	531	289	242	514	170	112	Brechdurchfall	1853	1022	831	1207	1673				
68	Tuberk. Hirnhautentzündung	445	237	208	442	114	113	Magen- u. Darmentzündung	61	33	28	52					
69	Gehirnhöhlenwasser sucht	52	33	19	48	28	114	Darncrampf	10	4	6	5	3				
70a	Gehirnentzündung	109	51	58	107	25	115	Unterleibschwind sucht	86	48	38	80	12				
70b	Gehirnerweichung	95	61	34	91		116	Bekroschwind sucht	18	9	9	17	8				
71	Gehirn Schlag	1303	622	681	946	22	117	Sonst. Unterleibs krankheiten	12	4	8	12	3				
72	Sehtenlähmung u. Nervenschl.	67	35	32	67	1	118	Krankheiten der Milz	3		3	3	4				
73	Geisteskrankheit	120	69	51	110		119	Gallensteine	40	8	32	40					
74	Rückenmarksentzündung	51	29	22	47	5	120	Selbucht	56	28	28	33	29				
75	Rückenmarkschwind sucht	54	27	27	49		121	Leberentzündung	24	9	15	24					
76	Rückenmarkslähmung	31	19	12	24		122	Akute Leberatrophie	3	2	1	3					
77a	Klampsie der Kinder	8040	1737	1303	491	2851	123	Chronische Leberatrophie	201	140	61	193					
77b	" der Schwängern	7		7	7		Zusammen F.						7048	3815	3233	4983	5381
77c	" der Gebärenden und Wöchnerinnen	15		15	15			G. Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge.									
78	Kall sucht	91	42	49	72		124	Entzündung und Lähmung der Harnwege	75	70	5	74					
79	Starrkrampf	49	35	14	45	9	125	Sonst. Leiden der Harnwege	13	9	4	13					
80	Sonstige Krämpfe	30	11	19	18	12	126	Harnvergiftung	27	16	11	26					
81	Dyrenkrankheiten	5	3	2	5	4	127	Stein krankheit	2	1	1	2					
82	Augenkrankheiten	1	1	1	1		128	Nierenentzündung	632	337	295	620	8				
	Zusammen D.	6096	3301	2795	3099	3241	129	Nierenvereiterung	29	23	6	29					
	E. Krankheiten d. Athmungs- werkzeuge.							Zusammen G.	778	456	322	704	8				
83	Keckkopentzündung	65	40	25	62	21		H. Krankheiten der weiblichen Geschlechtswerkzeuge.									
84	Keckkopverengung	35	23	12	26	21	130a	Bauchschwangerschaft	3		3	3					
85	Keckkopschwind sucht	24	16	8	19		130b	Andere Schwangerschafts- krankheiten									
86	Akute Bronchitis	777	413	364	619	449	131	Fehlgeburt	6		6	5					
87	Chron. Bronchialkatarrh	680	343	337	575	90	132	Gebärmutterriß	6		6	6					
88a	Krupöse Lungenentzündung	1765	898	867	1727	244	133	Folgen der Entbindung	67		67	64					
88b	Katarrhal. "	1647	838	809	1564	680	134	Gebärmutterblutung*)	8		8	6					
89	Lungenschwind sucht	4256	2149	2107	4013	64	135	Gebärmutterentzündung*)	12		12	11					
90	Lungenblut sturz	46	25	21	29		136	Eierstockkrankheiten	18		18	17					
91	Lungenemphysem	484	275	209	442			Zusammen H.	120		120	112					
92	Lungenbrand	22	18	4	22		137	VIII. Unbestimmte u. nicht angegebene Krankheiten.	14	8	6	9	5				
93	Lungenlähmung	204	104	100	161	27		Zusammenstellung.									
94	Brustfellentzündung	205	110	95	202	10	I. Infektionskrankheiten	3193	1479	1714	2824	615					
95	Brustwasser sucht	9	1	8	9		II. Boonosen	1	1		1						
96	Aufstaustritt in d. Brusthöhle	2	1	1	2		III. Vergiftungen	97	67	30	70	1					
	Zusammen E.	10221	5254	4967	9472	1606	IV. Parasiten	24	12	12	15	20					
	F. Krankheiten der Ver- dauungswerkzeuge.						V. Tod durch äußere Einwir- kungen, gewaltthamer Tod	1190	964	226	399	24					
97	Krankheiten der Zunge						VI. Störungen der Entwick- lung und Ernährung	9653	4667	4986	5134	3486					
98a	Krankheit d. Ohrspeicheldrüse						VII. Krankheiten der Werkzeuge	27394	4149	4189	2194	4634					
99	Hal sentzündung	12	9	3	11	5	davon										
100	Krankheiten der Speiseröhre	10	5	5	8		A. der Haut und Muskeln	105	58	47	91	67					
101	Unterleibsentzündung	280	117	163	275	13	B. der Knochen und Gelenke	252	129	123	233	11					
102	Typhlitis	85	50	35	84		C. des Gefäßsystems	2774	1216	1558	2447	70					
103	Bauchwasser sucht	39	12	27	31		D. des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	6096	3301	2795	3099	3241					
104	Brüche	83	40	43	81	6	E. der Athmungs- werkzeuge	10221	5254	4967	9472	1606					
105	Darncrampf	42	20	22	30		F. der Verdauungs- werkzeuge	7048	3815	3233	4983	5381					
106	Magenkatarrh	84	36	48	75		G. d. Harn- u. Geschlechts- werkzeuge	778	456	322	704	8					
107	Magenverengung	32	17	15	23		H. d. weibl. Geschlechts- werkzeuge	120		120	112						
108	Magenverengung	12	8	4	12		VIII. Unbestimmte und nicht an- gegebene Krankheiten	14	8	6	9	5					
109	Bluterbrechen	18	9	9	16	6	Im Ganzen	41566	21427	20139	29648	4403					
110	Darmlähmung	16	9	7	14		Außerdem Todtgeborene	1779	990	788							
111	Durchfall	48	21	27	46												
111	Kinderdurchfall	3770	2091	1679	2458	3611											

*) außerhalb der Geburt und des Wochenbettes. 1) hierunter 1 Kind unbekanntes Geschlecht.
 Bd. XVIII. 1901.

Tabelle 2 b.

Todesursachen der Todesfälle

Nr. des Systems.	Todesursachen.	1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900										Im Durchschnitt der Jahre 1891-1900					
												in Ganzen.	davon				
													männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	in 1. Lebensjahre.
I. Infektionskrankheiten.																	
1	Malaria	681	469	550	685	377	416	487	182	225	452	447	219	228	375	270	155
2	Scharlach	130	92	91	134	62	96	54	41	35	71	81	40	41	74	57	7
3a	Bo den (Blattern)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,1	—	0,1	0,1	—	—
3b	Varicellen	2	1	2	2	2	2	2	—	4	5	2	1	1	2	—	2
4	Rose	97	84	102	104	55	61	49	47	63	55	72	37	35	70	12	26
5a	Rachenbräune, Diphtheritis	961	1075	1911	1881	676	543	489	378	311	344	852	421	431	805	47	74
5b	Diphtherie anderer Organe	33	15	42	14	9	8	8	8	6	3	15	8	7	14	1	1
6	Krupp	507	560	816	675	320	257	219	188	236	192	397	213	184	370	27	57
7	Keuchhusten	494	376	294	548	209	264	397	533	466	342	392	181	211	280	112	248
8	Grippe (Influenza)	53	547	850	850	231	161	180	285	301	1158	462	205	257	397	65	21
9a	Eitervergiftung	85	74	108	84	91	95	90	120	107	137	99	59	40	97	2	11
9b	Hospitalbrand	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,3	—	0,3	0,3	—	—
10	Kindbettfieber	163	145	151	117	122	83	92	99	122	135	123	—	123	121	—	—
11	Karbunkel	7	3	6	3	6	6	7	6	5	7	6	4	2	6	—	—
12	Abdominaltyphus	183	167	192	183	123	134	192	135	194	167	167	81	86	167	—	—
13	Fleckfieber	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,4	0,3	0,1	0,4	—	0,1
14	Rückfallfieber	—	1	—	1	2	—	—	1	—	—	0,5	0,3	0,2	0,4	0,1	—
15	Ruhr	4	3	—	4	2	2	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Epidemische Cholera	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	0,1	0,3	—	—
17	Mumps	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,1	0,4	0,4	0,1	0,1
18	Epidemische Genickstarre	5	15	28	19	20	6	25	16	12	6	15	9	6	15	—	—
19	Wechselfieber	4	2	3	4	2	5	2	—	1	2	3	2	1	2	1	0,1
20	Akuter Gelenkrheumatismus	31	38	60	60	30	51	23	30	38	57	42	24	18	39	3	32
21	Syphilis	36	33	30	24	37	40	51	49	51	49	39	22	17	38	1	2
22	Sonst. Infektionskrankheiten	9	9	2	5	4	4	3	1	4	7	5	3	2	4	1	2
Summe I		3439	3711	5289	5347	2382	2235	2375	2124	2182	3193	3223	1632	1691	2682	341	639
II. Zoonosen.																	
23a	Hundswuth	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,1	0,1	—	0,1	—	—
23b	Milzbrand	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	0,4	0,4	—	0,4	—	—
23c	Rothkrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe II		—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	0,5	0,5	—	0,5	—	—
III. Vergiftungen *).																	
24	Thierische u. pflanzl. Gifte	13	3	9	9	11	8	11	7	11	13	10	6	4	7	3	0,4
25a	Akute Art der mineral. Gifte	3	10	22	12	15	13	10	16	14	25	14	8	6	8	6	0,1
25b	Chronische Art derselben	3	2	1	2	1	1	3	3	4	4	2	2	—	2	—	—
26	Giftige Gase	1	1	2	3	8	1	9	1	9	4	4	3	1	2	2	—
27	Trunksucht	43	35	47	54	30	45	42	44	42	51	43	38	5	37	6	—
Summe III		63	51	81	80	65	68	75	71	80	97	73	57	16	66	17	0,3
IV. Parasiten.																	
28	Wurmkrankheiten	3	3	3	—	3	1	2	2	2	—	2	1	1	1	2	—
29	Schwämmchen	8	18	17	14	13	18	18	13	15	20	15	8	7	8	7	1,9
30a	Trichinose	1)	—	—	—	—	1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30b	Aktinomykose	1)	3	—	1	—	2)	3	1	3	—	4	2	1	1	2	—
Summe IV		14	21	21	14	18	22	21	18	17	24	19	10	9	12	7	1,3
V. Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltf. Tod *).																	
31a	Verbrennung u. Verbrühung	62	52	64	59	77	82	79	60	79	89	70	36	34	62	18	—
31b	Erfrierung	8	5	10	4	15	8	8	3	5	6	7	7	—	1	1	—
31c	Ertrinken	190	195	182	169	174	211	197	228	232	222	200	155	45	4	196	—
31d	Erhängen	202	187	184	188	186	188	178	185	193	199	189	164	25	2	187	—
31e	Ersticken	39	34	31	23	55	41	31	47	32	23	36	25	11	6	30	—
31f	Hirschschlag	9	12	2	8	2	2	2	9	2	20	7	4	3	4	3	—
31g	Blitzschlag	2	10	8	5	12	11	11	7	8	12	9	6	3	1	8	—
31h	Explosion	2	—	1	3	1	2	—	2	—	2	1	1	—	1	—	
31i	Uebersahren	92	86	100	108	111	119	128	140	147	154	118	102	16	48	70	—
31k	Sturz und Schlag	211	185	248	221	271	282	300	290	313	322	264	225	39	159	105	—
31l	Schusswunden	68	52	75	64	68	70	69	78	74	92	70	66	4	13	57	—
31m	Stich-, Schnitt-, Biß- und andere Wunden	40	37	43	27	38	31	29	34	37	43	36	31	5	17	19	—

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 72. 1) berichtete Zahlen.

in den Jahren 1891-1900.

Tab. 2 b.

Nr. des Systems	Im Durchschnitt der Jahre 1891-1900										im Ganzen.	davon				im Lebensjahr											
	Todesursachen.											männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.												
	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900																	
31n	Folgen der Operation . . .										13	6	6	8	1	5	4	6	3	5	6	1					
31o	Hirndurchschneidung . . .										1	1	1	—	—	1	—	—	2	1	1	—					
	S u m m e V . . .										934	862	955	887	1011	1053	1036	1089	1127	1190	1014	825	139	313	701	30	
	VI. Störungen der Entwicklung u. Ernährung.																										
32	Lebensschwäche d. Neugebor.										1839	1859	1951	1780	1925	1870	1882	1961	1994	2164	1923	1115	808	402	1521	1922	
33	Bildungsfehler . . .										32	16	29	26	25	22	36	28	37	25	28	15	13	22	6	25	
34	Rahnen . . .										46	24	37	38	30	32	35	38	29	34	34	18	16	13	21	23	
35	Englische Krankheit . . .										155	134	119	126	164	128	188	158	129	172	147	79	68	102	45	60	
36	Abzehrung der Kinder . . .										1012	1019	1000	984	1005	946	1174	1199	1022	1179	1052	575	477	531	521	961	
37	Drüsenabzehrung . . .										152	126	133	151	166	149	159	135	128	129	143	77	66	105	38	71	
38	Erschöpfung (Pers. unter 60 J.)										97	95	96	99	70	77	60	62	60	76	79	31	48	36	43	—	
39	Altersschwäche (Pers. ab 60 J.)										3311	3162	3512	3230	3132	2986	3106	3205	3100	3240	3199	1398	1801	1262	1937	—	
40a	Brand der Alten . . .										38	29	38	27	29	27	34	25	35	37	32	19	13	31	1	—	
41a	Brandgeschwür . . .										5	4	5	6	6	6	3	2	8	5	5	3	2	5	—	—	
41b	Druckbrand . . .										2	3	2	1	9	2	4	1	8	7	4	1	3	4	—	—	
41c	Wasserkrebs . . .										2	1	1	1	1	3	—	3	5	1	2	1	1	2	—	—	
41d	Andere Arten von Brand										—	5	7	9	8	6	4	9	8	6	6	3	3	6	—	—	
42	Krebs und Geschwülste . . .										1572	1504	1643	1636	1719	1824	1750	1841	1858	1882	1723	763	960	1058	65	—	
43	Kropf . . .										9	7	20	15	18	8	11	11	17	10	13	4	9	19	1	—	
44a	Storbut . . .										4	5	3	4	3	5	6	6	7	4	5	3	5	—	—	—	
44b	Blutsleukämie . . .										17	14	15	13	14	7	5	11	12	14	12	7	5	12	—	—	
44c	Bluterkrankheit . . .										6	1	3	3	4	6	6	8	8	3	4	8	1	4	—	—	
45	Blutmangel . . .										41	51	39	38	39	37	35	29	49	44	40	14	20	35	5	—	
46	Weißblütigkeit . . .										20	33	23	23	14	27	34	15	31	22	24	11	13	24	—	—	
47	Wassersucht . . .										426	418	394	366	437	395	403	423	416	413	409	131	278	255	134	—	
48	Juckerkrankheit . . .										73	55	83	64	71	75	83	92	95	121	81	49	32	79	—	—	
49	Gicht . . .										38	33	37	38	27	33	36	23	34	42	34	10	23	19	115	—	
50	Bronchitis . . .										6	4	6	6	2	5	3	4	7	11	4	3	3	4	—	—	—
51	Sonstige Störungen d. Entwicklung und Ernährung										8	11	18	18	10	9	11	16	17	22	14	7	7	10	6	4	—
	S u m m e VI . . .										8911	8613	9214	8632	8928	8685	9068	9305	9109	9653	9017	4340	4677	4638	4379	3080	
	III. Krankheit. d. Werkzeuge.																										
	A. Krankheiten der Haut und Muskeln.																										
52	Blutschwärmigkeit . . .										5	12	16	21	10	13	14	12	17	23	14	7	7	13	1	—	
53	Zellgewebeerkrankung . . .										29	48	35	45	43	24	34	37	34	29	36	21	15	34	2	—	
54	Zellgewebeerhärtung der Neugeborenen . . .										4	6	2	3	—	4	2	2	4	—	3	2	—	—	—	—	
55	Nabelentzündung . . .										3	10	11	6	11	9	2	6	7	11	8	4	4	7	—	—	
56	Sonst. Krankheiten der Haut und des Zellgewebes . . .										21	10	22	29	24	32	27	23	26	38	25	13	12	19	6	—	
57	Progressive Muskelentartung										3	—	1	2	2	1	2	4	2	4	2	—	—	—	—	—	—
	Zusammen A . . .										65	86	87	106	90	83	81	84	90	105	88	48	46	77	11	—	
	B. Krankheiten der Knochen und Gelenke.																										
58	Knochen- u. Gelenkentzündung . . .										247	208	246	235	203	200	190	216	191	242	218	107	117	108	20	—	
59	Knochenweichung . . .										10	7	12	4	12	13	4	7	5	10	8	—	—	—	—	—	—
	Zusammen B . . .										257	215	258	239	215	213	194	223	196	252	226	107	117	208	21	—	
	C. Krankheiten des Gefäßsystems.																										
60a	Herzbeutelentzündung . . .										50	33	50	34	44	43	25	56	42	39	42	22	26	44	—	—	
60b	Wassersucht des Herzbeutels										11	13	16	8	14	5	9	10	11	21	12	5	7	10	2	—	
61	Herzvergrößerung . . .										114	99	104	122	126	117	90	73	118	136	110	50	60	106	4	—	
62	Herzfehler . . .										988	1023	1136	1225	1207	1261	1265	1247	1263	1318	1193	467	726	1146	44	—	
63	Zerreißen des Herzens . . .										10	6	2	3	3	2	4	4	4	1	4	2	2	3	—	—	
64	Herzlähmung . . .										565	589	709	668	748	806	814	973	987	1067	793	393	400	567	226	—	
65	Arterienkrankheiten . . .										111	114	113	85	112	109	109	120	157	170	120	68	57	138	—	—	
66	Venenerkrankheiten . . .										24	18	17	16	12	16	19	23	28	22	19	8	11	19	—	—	
	Zusammen C . . .										1873	1895	2147	2161	2266	2359	2335	2506	2610	2774	2293	1010	1293	2015	280	—	

Noch: Tabelle 2b.

Noch: Todesursachen der Todesfälle

Nr. des Systems.	Todesursachen.	1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900										Im Durchschnitt der Jahre 1891-1900					
												im Ganzen.	davon				
													männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.
D. Krankheiten des Nervensystems u. d. Sinneswerkzeuge.																	
67	Hirnhautentzündung	471	460	522	550	461	404	457	414	449	531	472	257	215	459	13	127
68	Tuberf. Hirnhautentzündung	480	399	453	469	439	427	498	464	389	445	446	234	212	441	15	106
69	Gehirnhöhlenwasserjucht	55	41	47	46	30	44	51	28	28	52	42	24	16	38	4	19
70a	Gehirnentzündung	105	81	105	82	102	76	92	109	93	109	95	52	43	91	4	15
70b	Gehirnerweichung	85	83	83	60	70	71	91	66	98	95	80	50	30	75	5	21
71	Gehirnschlag	1207	1149	1241	1118	1243	1220	1255	1208	1281	1303	1223	598	625	878	345	7
72	Gehirnlähmung u. Nervenschl.	57	63	56	56	70	64	67	91	58	67	65	32	33	58	7	3
73	Geisteskrankheit	116	108	88	88	108	102	105	101	113	120	105	60	43	92	13	2
74	Rückenmarksentzündung	59	56	55	68	39	51	59	47	49	51	53	26	27	49	7	0,1
75	Rückenmarkschwindsucht	65	56	42	47	60	51	61	65	53	54	55	32	23	48	4	1
76	Rückenmarkslähmung	43	35	40	49	49	54	46	37	51	31	44	22	22	38	6	1
77a	Eklampsie der Kinder	4146	3541	3538	3218	3492	2915	3354	3262	3286	3040	3379	1902	1477	427	2952	3159
77b	" der Schwangeren	2	8	5	5	7	7	4	4	5	7	5	—	5	—	—	—
77c	" der Gebärenden und Wöchnerinnen	8	8	12	10	11	12	13	19	11	15	12	—	12	11	1	—
78	Fallsucht	59	52	68	61	79	52	67	79	69	91	68	37	31	49	9	1
79	Starrkrampf	56	34	51	48	40	44	44	56	34	49	46	31	15	39	7	1,6
80	Sonstige Krämpfe	69	27	39	44	25	36	41	34	38	30	38	17	21	21	17	8
81	Dhnenkrankheiten	4	4	6	6	6	5	4	5	5	5	5	3	2	5	—	—
82	Augenkrankheiten	—	2	1	—	1	5	—	4	3	1	2	1	1	1	1	0,6
Zusammen D.		7087	6207	6452	6025	6332	5640	6309	6093	6113	6096	6235	3378	2857	2825	3410	3479
E. Krankheiten d. Athmungs- werkzeuge.																	
83	Kehlkopfsentzündung	48	66	71	66	64	43	47	57	63	65	59	33	26	53	6	22
84	Kehlkopfverengung	33	25	27	37	23	18	11	31	27	35	27	16	11	22	5	1,9
85	Kehlkopfschwindsucht	39	22	28	34	25	32	35	46	29	24	31	21	10	27	4	—
86	Acute Bronchitis	1032	1017	1075	1021	863	766	777	794	667	777	879	445	434	707	172	500
87	Chron. Bronchialkatarrh	650	603	771	632	567	601	551	585	502	680	614	301	313	517	97	52
88a	Krupöse Lungenentzündung	1854	1887	2288	1971	1686	1674	1513	1798	1802	1765	1824	907	917	1763	161	237
88b	Katarrhal.	1238	1257	1347	1594	1133	1300	1490	1547	1534	1647	1408	699	709	1217	91	584
89	Lungenschwindsucht	4664	4504	4654	4863	4571	4557	4433	4334	4144	4256	4498	2249	2240	4029	469	69
90	Lungenblutsturz	50	67	66	65	75	64	61	73	59	46	63	36	27	44	19	—
91	Lungenemphysem	451	458	473	419	406	439	423	437	460	484	445	233	192	415	30	—
92	Lungenbrand	20	23	26	32	31	26	27	18	30	22	26	18	8	25	1	—
93	Lungenlähmung	220	186	236	207	198	183	186	221	220	204	206	191	105	158	46	27
94	Brustfellentzündung	187	164	161	164	170	172	177	162	190	205	175	102	73	109	6	12
95	Brustwasserjucht	27	27	18	22	13	8	12	14	12	9	16	6	10	11	5	—
96	Luftröhre in d. Brusthöhle	3	5	6	4	3	3	3	2	4	2	4	3	1	3	1	0,2
Zusammen E.		10516	10311	11247	11131	9828	9886	9746	10119	9743	10221	10275	5190	5085	9260	1015	1536
F. Krankheiten der Verdauungswerkzeuge.																	
97	Krankheiten der Zunge	4	—	2	1	1	—	1	—	—	—	1	0,5	0,5	1	—	—
98a	Krankheit d. Ohrspeicheldrüse	1	3	3	1	2	1	3	2	1	—	2	1	1	2	—	0,6
98b	Halssentzündung	7	4	15	10	7	18	14	12	11	12	11	7	4	10	1	—
99	Krankheiten der Speiseröhre	8	7	6	4	5	7	9	2	8	10	7	5	2	16	1	—
100a	Unterleibsentzündung	353	316	298	293	276	253	292	295	289	280	294	123	168	285	9	1,9
100b	Typhlitis	35	48	65	54	63	58	64	67	68	85	61	33	28	60	1	0,2
101	Bauchwasserjucht	78	52	44	49	54	46	47	56	49	39	51	17	34	43	8	0,5
102	Brüche	65	75	71	81	85	69	74	78	80	83	76	33	43	72	4	5
103	Darmverschluss	105	111	120	110	127	112	116	146	118	150	121	59	62	120	1	—
104	Magenkatarrh	58	48	54	57	44	34	49	34	48	42	47	25	22	36	11	—
105	Magengeschwüre	102	92	90	98	115	75	82	87	92	84	92	49	43	86	6	0,1
106	Magenverengung	33	34	41	39	51	34	32	33	32	32	36	20	16	24	12	—
107	Bluterbrechen	20	13	23	16	16	26	26	16	24	12	19	12	7	17	2	—
108	Darmblutung	17	13	8	13	17	7	13	15	20	18	14	8	6	13	1	—
109	Darmzerreißung	17	10	17	12	14	19	13	8	13	16	14	9	5	13	1	0,3
110	Durchfall	48	62	43	47	60	56	54	53	46	48	52	26	26	45	7	—
111	Kinderdurchfall	1858	1941	2222	1685	2207	1569	2132	2613	2498	3770	2249	1219	1030	1494	755	2144

in den Jahren 1891—1900.

Noch: Tabelle 2 b.

Nr. des Systems.	Lodesursachen.										Zur Durchschnitt der Jahre 1891—1900						
	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	im Ganzen.	davon					
												männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.	
112	Brechdurchfall	1505	1370	1347	1058	1988	1108	1844	2111	1570	1853	1575	860	715	1023	552	1423
113	Magen- u. Darmentzündung	53	77	70	59	60	55	66	57	77	61	64	29	35	58	6	—
114	Darmkrampf	22	9	13	18	11	15	10	9	10	10	13	7	6	8	5	3
115	Unterleibschwindel	99	72	74	70	88	73	90	101	74	86	83	43	40	78	5	12
116	Befröschtelung	21	12	23	15	10	7	8	23	15	18	15	8	7	14	1	6
117	Sonst. Unterleibsfrankheiten	20	18	13	10	10	15	11	12	17	12	14	6	8	12	2	1
118	Krankheiten der Milz	3	5	3	1	3	2	3	3	4	3	3	2	1	3	—	0,2
119	Gallensteine	15	21	23	22	28	30	30	24	38	40	27	5	22	27	—	—
120	Gelbsucht	43	61	53	46	54	34	36	48	53	56	48	26	22	33	15	23
121	Leberentzündung	25	18	27	31	25	17	21	18	34	24	24	11	13	23	1	0,1
122	Akute Leberatrophie	10	8	3	5	3	9	9	8	9	3	7	3	4	7	—	0,1
123	Chronische Leberatrophie	142	141	155	187	165	188	198	179	182	201	174	110	64	168	6	1
	Zusammen F.	4767	4641	4926	4092	5589	3937	5347	6110	5480	7048	5194	2759	2435	3781	1413	3646
	G. Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge.																
124	Entzündung und Lähmung der Harnwege	84	76	72	99	100	84	79	84	88	75	84	75	9	81	3	—
125	Sonst. Leiden der Harnwege	18	15	12	15	3	10	10	8	15	13	12	10	2	11	1	0,1
126	Harnvergiftung	14	17	11	15	19	26	27	35	22	27	21	14	7	21	—	0,1
127	Steinkrankheit	6	4	3	5	6	2	1	6	1	2	4	2	2	4	—	—
128	Nierenentzündung	463	477	521	520	489	543	574	548	533	632	530	283	247	521	9	8,3
129	Nierenvereiterung	14	16	9	13	15	20	18	29	41	29	20	12	8	20	—	0,1
	Zusammen G.	599	605	628	667	632	685	704	710	700	778	671	396	275	658	13	9
	H. Krankheiten der weiblichen Geschlechtswerkzeuge.																
130a	Bauchschwangerschaft	1	3	3	3	1	2	2	6	6	3	3	—	3	3	—	—
130b	Andere Schwangerschaftskrankheiten	1	3	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—
131	Fehlgeburt	5	2	4	9	6	2	—	4	1	6	4	—	4	4	—	—
132	Gebärmutterriß	5	7	6	7	8	6	5	11	9	6	7	—	7	7	—	—
133	Folgen der Entbindung	75	89	87	65	77	56	73	72	75	67	73	—	73	65	8	—
134	Gebärmutterblutung *)	9	13	7	3	14	11	6	2	3	8	8	—	8	6	2	—
135	Gebärmutterentzündung *)	13	14	9	14	13	20	13	9	14	12	13	—	13	12	1	—
136	Eierstockkrankheiten	22	19	15	14	10	15	18	9	12	18	15	—	15	15	—	—
	Zusammen H.	131	150	132	116	130	112	117	114	120	120	124	—	124	113	11	—
137	VIII. Unbestimmte u. nicht angegebene Krankheiten.	106	106	50	36	27	8	11	7	8	14	37	19	18	8	29	10
	Zusammenstellung.																
I.	Infektionskrankheiten	3439	3711	5239	5347	2382	2235	2375	2124	2182	3193	3223	1532	1691	2882	341	639
II.	Zoonosen	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	0,5	—	—	0,5	—	—
III.	Bergiftungen	63	51	81	80	65	68	75	71	80	97	73	57	16	56	17	0,5
IV.	Parasiten	14	21	21	14	18	22	21	18	17	24	19	10	9	12	7	15
V.	Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltsamer Tod	934	862	955	887	1011	1053	1036	1089	1127	1190	1014	825	489	313	701	30
VI.	Störungen der Entwicklung und Ernährung	8911	8613	9214	8682	8928	8685	9068	9305	9109	9653	9017	4340	4677	4638	4379	3080
VII.	Krankheiten der Werkzeuge	25295	24110	25877	24537	25082	22915	24833	25959	25052	27394	25106	12890	12216	18932	6474	8780
	davon																
A.	der Haut und Muskeln	65	86	87	106	90	83	81	84	90	105	88	48	40	77	11	51
B.	der Knochen und Gelenke	257	215	258	239	215	213	194	223	196	252	226	109	117	205	21	9
C.	des Gefäßsystems	1873	1893	2147	2161	2368	2359	2335	2506	2610	2774	2298	1010	1283	2013	289	50
D.	des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	7087	6207	6452	6025	6332	5640	6309	6093	6113	6096	6285	3378	2857	2825	3410	3470
E.	der Atmungswerkzeuge	10516	10311	11247	11131	9828	9886	9746	10119	9713	10221	10275	5190	5085	9260	1015	1586
F.	der Verdauungswerkzeuge	4767	4641	4926	4092	5589	3937	5347	6110	5480	7048	5194	2759	2485	3781	1413	3646
G.	d. Harn- u. Geschlechtswerkzeuge	599	605	628	667	632	685	704	710	700	778	671	396	275	658	13	9
H.	d. weibl. Geschlechtswerkzeuge	131	150	132	116	130	112	117	114	120	120	124	—	124	113	11	—
VIII.	Unbestimmte und nicht angegebene Krankheiten	106	106	50	36	27	8	11	7	8	14	37	19	18	8	29	10
	Im Ganzen	38762	37474	41437	39383	37513	34986	37422	38574	37575	41566	38489	19673	18816	26841	11648	12555
	Außerdem Todtgeborene	1521	1534	1491	1526	1568	1617	1604	1619	1704	1779	1596	895	701	—	—	—

*) außerhalb der Geburt und des Wochenbettes. 1) berichtete Zahlen.

Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken

Tabelle 3 a.

Nach den Angaben

Amtsbezirke.	Typhus.												Kindbettfieber.											
	Januar	Februar	März	April	Mat	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mat	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
	Engen	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	3	2	1	1	—	1	—	—	1
Konstanz	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Messkirch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Pfullendorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stodach	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ueberlingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Donaueschingen	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Eriberg	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Billingen	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—
Bonnndorf	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säckingen	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
St. Blasien	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Waldshut	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Breisach	—	—	—	—	—	—	2	5	1	—	4	1	1	2	3	1	—	—	1	1	—	—	—	—
Emmendingen	—	—	1	2	—	—	—	—	—	6	50	2	1	1	2	3	3	2	2	—	—	—	—	—
Ettenheim	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Freiburg	2	1	—	2	4	5	4	3	3	6	2	1	2	1	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—
Neustadt	—	—	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Staufen	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Waldkirch	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lörrach	—	—	1	—	2	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Müllheim	—	—	—	—	—	2	4	2	1	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schnau	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schopfheim	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stehl	1	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lahr	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oberkirch	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Offenburg	12	9	5	4	2	—	1	4	1	12	9	5	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Wolfach	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Achern	—	—	—	—	1	1	3	2	1	—	9	23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Baden	2	—	1	—	4	4	6	1	4	8	3	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bühl	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rastatt	3	8	6	5	—	1	2	2	1	1	4	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bretten	—	—	1	1	—	1	1	1	1	1	4	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruchsal	2	1	—	1	1	—	—	1	2	3	2	—	3	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Durlach	1	1	—	5	6	—	—	4	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ettlingen	—	2	—	—	—	—	1	—	1	3	1	10	—	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—
Karlsruhe	9	1	1	—	1	3	1	3	14	9	10	15	3	—	5	3	6	4	6	1	6	4	6	4
Pforzheim	38	29	8	8	11	11	7	6	33	6	11	13	—	1	1	2	4	1	4	1	1	—	—	—
Mannheim	3	2	1	1	3	2	5	12	12	15	8	7	1	2	3	4	5	1	1	1	5	1	3	6
Schwezingen	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Weinheim	—	1	—	—	1	—	—	—	3	2	3	3	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eppingen	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heidelberg	9	2	1	5	5	9	11	9	11	8	6	1	4	1	1	1	3	1	—	—	3	2	—	—
Sinsheim	—	1	1	1	—	—	—	—	1	5	1	4	1	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—
Wiesloch	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Abelsheim	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Borberg	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Buchen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eberbach	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rosbach	5	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tauberbischofsjh.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bertheim	1	2	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Original gedruckt in Stuttgart bei der Buchdruckerei von G. Neumann, Neudammstr. 10.

bezw. Gemeinden mit über 4000 Einwohnern im Jahr 1900.

der Bezirksärzte.

Tabelle 3 a.

Scharlach.													Diphtheritis.												
Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	7	16	20	13	16	27	19	6	5	3	7		
2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	3	13	11	8	6	11	18	2	13	8	4	10	31	37		
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1	3	14	2	1	1	1	3		
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

Noch: Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken

Tabelle 3 a.

Amtsbezirke bez. Gemeinden.	Typhus.												Kindbettfieber.											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens:																								
Mannheim . . .						2	1	4	1			1			1		1	1			2	1		1
Karlsruhe . . .	6							2	1						2	1						1		4
Freiburg . . .						2		2	1					1		1						1		
Horsheim . . .	9	14	8	4	5	4	4	3	8	2	4	4			1		3	1	3	1	1		1	1
Heidelberg . . .	5	2		3	4		1	5	8	6	4	4		1	1				1	1		2	2	1
Konstanz . . .																			1					
Gemeinden:																								
Mannheim . . .	3	2	1	1	3		4	8	11	15	8	6	1	2	2	4	5	1	1	3			3	5
Karlsruhe . . .	3	1	1		1	3	1	3	14	7	8	13	3	4	2	5	3		5		5	4	2	1
Freiburg . . .	2	1		2	4	3	4	1	2	6	2	1	1		1	1		1	4				1	1
Horsheim . . .	29	15	5	4	6	7	3	3	25	4	7	9		1		1		1		1	1	1		1
Heidelberg . . .	4		1	2	1	8	6	1	5	4	2	1	3											1
Konstanz . . .							2													1				1
Baden . . .	2					2	3	1		1					1				1				1	1
Rastatt . . .	3	7	3	1			1	1	1		2	2							1					
Offenburg . . .	1	1						3		1	1							2	1					
Lahr . . .	1														3									
Bruchsal . . .	1															1								
Durlach . . .		1						1			1		1											
Weinheim . . .		1						2	1	2	3							1	1					
Lörrach . . .											3		2		1					1				
Ettlingen . . .						1		1															1	1
Billingen . . .														1										
Schwezingen . . .								3	1									1				1		
Sedenheim, Landg.										1														
Brösingen, Landg.	2	6	1	3	1	1			1	1	2	3					1				1			
Ennendingen . . .			1	1						4	50	2					1	1						
Eberbach . . .								1				1				1								
Hodenheim . . .								1																
Sandhofen, Landg.								1																
Furtwangen . . .						1								1	1		1							
Waldfirdich . . .																								
Bretten . . .							1		1	1														
Feudenheim, Landg.																						1		
Heberlingen . . .											6	1	3											
Lichtenthal, Landg.					2	2																		
Büchelthal, Landg.																								
Kehl-Dorf, Landg.																					1	1		
Radolfzell . . .																1		1	1			1		1
Weingarten, Landg.					5	5							1											
Säckingen . . .																								
Im Ganzen für diese Gemeinden	51	35	13	19	24	28	24	31	62	52	90	43	16	6	10	12	22	7	15	9	13	7	10	11
Im Ganzen f. die übrigen Gemeinden	52	28	20	24	29	21	31	47	49	40	59	47	36	27	42	25	19	22	26	17	17	15	35	26

Noch: Tabelle 3a. Noch: Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amt

Amtsbezirke.	Krupp.												Im ganzen Jahr.					
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ep- phus	Kind- bett- fieber	Schar- lach	Diph- theri- tis	Krupp	Wat- tern (Waf- fen)
Engen	2	—	—	—	1	1	—	—	1	3	2	3	—	12	3	145	13	—
Konstanz	1	3	2	1	1	1	—	—	—	1	—	2	2	10	26	159	12	—
Messkirch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	33	32	—	—
Pfullendorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	4	39	13	—
Stodach	4	—	3	—	4	—	—	—	1	—	—	—	1	2	2	15	2	—
Ueberlingen	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	3	7	52	4
Donauessingen	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	7	22	10	—
Trübingen	3	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—	2	2	10	65	101	20	—
Willingen	7	3	1	—	1	—	1	1	—	2	2	2	2	2	—	—	—	—
Bomdorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	8	1	9	3	—
Säckingen	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3	2	—	22	3	—
St. Blasien	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	2	34	153	1	—
Waldshut	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Breisach	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	9	3	7	1	—
Emmendingen	1	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	61	18	9	106	7	—
Ettenheim	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	6	2	17	4	—
Freiburg	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	33	16	61	101	2	—
Neustadt	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	5	2	1	15	2	—
Staufen	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	4	7	1	27	3	—
Waldkirch	—	—	—	2	—	—	—	1	1	5	1	1	1	11	6	24	11	—
Lörrach	1	4	6	2	—	—	—	1	3	4	5	5	6	4	13	124	32	—
Müllheim	1	—	1	1	2	—	1	1	1	—	1	4	11	4	12	76	13	—
Schönau	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	3	6	5	20	3	—
Schopfheim	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	6	15	40	5	—
Kehl	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	6	7	69	34	4	—
Lahr	1	1	1	—	—	—	1	—	2	1	1	3	2	12	31	84	11	—
Oberkirch	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	6	10	4	1	—
Offenburg	5	3	4	3	3	1	—	1	4	5	3	4	64	9	54	315	36	—
Wolfach	3	—	—	1	2	1	—	—	2	—	—	2	2	9	3	84	11	—
Achern	—	—	—	2	—	—	2	—	—	1	2	—	40	6	—	75	7	—
Baden	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	36	8	61	25	7	—
Bühl	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	4	27	1	—
Rastatt	—	2	2	8	3	—	1	1	—	1	2	1	36	13	23	67	21	—
Bretten	4	1	6	3	2	—	—	1	1	4	6	4	12	2	6	77	32	—
Bruchsal	—	2	—	—	1	2	—	1	—	1	3	4	13	14	28	24	14	—
Durlach	1	4	1	1	—	—	—	—	—	3	2	2	25	8	43	91	14	—
Ettlingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	18	8	10	11	4	—
Karlsruhe	3	3	7	—	7	3	—	2	—	2	3	5	67	48	140	208	35	—
Pforzheim	3	3	6	8	7	1	10	1	1	7	6	8	181	17	102	541	61	—
Mannheim	2	2	1	2	1	—	—	3	3	2	8	10	71	33	443	184	34	—
Schweiningen	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1	3	4	9	20	5	—
Weinheim	—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	15	12	69	37	6	—
Eppingen	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	—	7	1	21	14	5	—
Heidelberg	—	2	3	—	—	—	—	—	4	4	—	1	77	23	170	182	14	—
Heidelberg	4	1	1	2	2	—	—	1	2	1	2	—	15	11	6	56	16	—
Wiesloch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	5	6	11	12	3	—
Abelsheim	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	24	7	—
Worberg	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	15	14	1	—
Buchen	—	1	3	1	1	—	—	—	—	2	4	2	3	8	10	54	14	—
Eberbach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	7	2	27	35	3	—
Mosbach	—	—	4	3	—	—	—	—	—	1	3	4	12	5	46	55	19	—
Tauberbischofsb.	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	5	6	47	5	—
Wertheim	1	—	1	1	1	—	—	—	—	2	—	1	9	4	9	20	7	—

1) im November; 2) 3 Hälte im Juli, 2 im August und 1 im September.

Bezirken bzw. Gemeinden mit über 4000 Einwohnern im Jahr 1900. Nach: Tabelle 3a.

Amtsbezirke bzw. Gemeinden.	Grupp.												Im ganzen Jahr.					
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Typhus	Kindbettfieber	Scharlach	Diphtheritis	Grupp	Stat-tern (Pol-len)
Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens:																		
Mannheim . . .	—	—	1	1	—	—	—	—	3	2	2	2	9	5	119	26	11	—
Karlsruhe . . .	—	—	4	—	2	2	—	—	1	2	2	2	12	13	8	30	13	*)5
Freiburg . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	5	10	21	1	—
Brozheim . . .	2	2	2	3	3	1	3	—	1	2	4	4	64	12	10	194	27	—
Heidelberg . . .	—	2	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	42	13	40	38	5	—
Konstanz . . .	—	2	1	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	8	8	113	7	—
Gemeinden:																		
Mannheim . . .	2	2	—	1	1	—	—	3	—	—	6	8	62	28	324	158	23	—
Karlsruhe . . .	3	3	3	—	5	1	—	2	—	1	1	3	55	35	132	178	22	*)1
Freiburg . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	11	51	80	1	—
Brozheim . . .	1	1	4	5	4	—	7	1	—	5	2	1	117	5	92	347	34	—
Heidelberg . . .	—	—	3	—	—	—	—	—	2	3	—	1	35	10	130	144	9	—
Konstanz . . .	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	2	18	46	5	—
Baden . . .	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	6	58	17	4	—
Rastatt . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	1	11	4	—	—
Offenburg . . .	3	3	2	1	2	—	—	—	—	3	3	2	7	3	30	185	19	*)1
Lahr . . .	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	8	10	41	4	—
Bruchsal . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	4	—	—
Durlach . . .	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	28	14	5	—
Weinheim . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	9	2	22	13	2	—
Oberrach . . .	1	1	—	—	—	—	1	1	3	1	2	2	—	2	3	47	12	—
Ettlingen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	4	3	4	1	—
Willingen . . .	5	2	—	—	—	—	1	1	—	1	2	1	—	2	33	48	13	—
Schweisingen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	3	1	—
Sedenheim, Ddgem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	6	—	—	—
Pröbigen, Ddgem.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	2	21	1	—	8	6	—
Emmendingen . . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	3	—	5	2	—
Eberbach . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	20	24	—	—
Hochenheim . . .	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	3	3	—	—
Sandhofen, Ddgem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	77	3	3	—
Furtwangen . . .	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	3	—
Waldkirch . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	1	3	—	6	—	—
Bretten . . .	1	1	2	1	2	—	—	1	1	2	2	2	3	—	4	30	15	—
Heidenheim, Ddgem.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	8	11	1	—
Heberlingen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—
Nichtenthal, Ddgem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	3	—	—
Bühlertal, Ddgem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	—	—
Rehl, Dorf, Ddgem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	4	2	—
Radolfzell . . .	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	4	64	3	—
Weingarten, Ddgem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4	1	—	—	—
Säckingen . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	2	—
Im Ganzen für diese Gemeinden	19	20	23	10	15	3	11	9	8	25	26	32	472	138	1088	1508	201	*)2
Im Ganzen f. die übrigen Gemeinden	34	32	41	44	33	10	8	9	23	29	45	53	447	307	657	2236	361	*)5

1) im Juli; 2) im November; 3) je ein Fall im Juli und November; 4) je 2 Fälle im Juli und August und 1 Fall im September.

Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Kreisen, landeskommissarischen Bezirken, Tabelle 3b.

Kreise: und Großherzogthum.	Typhus.												Kindbettfieber.											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Kreise:																								
Konstanz . . .	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	3	2	8	3	5	2	4	4	—	1	3	2
Billingen . . .	2	—	2	1	—	4	—	2	—	—	—	—	4	1	—	2	1	2	1	1	—	2	1	
Waldshut . . .	—	1	—	2	3	—	1	—	2	—	—	—	1	—	2	—	1	2	1	—	1	2	3	
Freiburg . . .	3	1	3	5	6	5	8	11	4	12	57	4	7	10	10	10	4	3	4	6	3	3	7	
Lörrach . . .	1	1	1	1	3	2	6	4	1	3	2	—	3	2	1	3	1	3	3	—	1	—	1	
Offenburg . . .	15	9	5	5	4	1	1	5	2	13	10	5	10	5	10	5	1	3	4	1	3	3	2	
Baden . . .	8	8	7	5	5	6	11	5	6	9	17	32	4	3	1	—	3	4	2	2	2	3	4	
Karlsruhe . . .	50	34	10	15	19	20	9	16	54	21	38	30	9	3	11	8	11	6	14	3	9	5		
Mannheim . . .	3	3	1	1	6	2	5	16	14	17	11	10	2	2	6	4	7	2	3	2	6	2		
Heidelberg . . .	14	3	2	6	6	9	11	10	17	10	13	3	7	2	4	5	3	1	4	5	2	3		
Rosbach . . .	7	3	2	2	1	—	1	8	10	7	1	6	2	3	4	1	2	—	4	—	2	1		
Bezirke der Landeskommissäre:																								
Konstanz . . .	2	1	2	3	3	4	3	3	3	—	—	—	8	3	10	5	7	6	6	5	2	3		
Freiburg . . .	19	11	9	11	13	8	15	20	7	28	69	9	20	17	16	14	8	10	8	9	7	5		
Karlsruhe . . .	58	42	17	20	24	26	20	21	60	30	55	62	13	6	12	8	14	10	16	5	11	8		
Mannheim . . .	24	9	5	9	13	11	17	34	41	34	25	19	11	7	14	10	12	3	11	7	10	6		
Landesgegenden:																								
I. See- u. Donau- gegend u. Klettgau	2	—	2	1	—	—	3	3	1	—	—	—	7	3	10	5	6	4	5	5	2	1		
II. Ober Schwarzwald u. Schwarzwaldhöfer	2	2	2	4	6	4	2	2	3	1	1	—	8	4	6	3	3	7	3	—	1	4		
III. Obere Rheinebene u. gebirgige Ebene der betr. Bezirke	20	10	7	9	11	9	16	20	7	27	78	35	15	14	10	11	6	8	6	10	8	5		
IV. Untere Rheinebene u. begleitendes Hügelland	63	45	18	21	30	27	22	35	74	48	59	47	15	7	19	12	22	9	19	7	16	8		
V. Oberrheinwald, Neckar- u. Lanbergegend	16	6	4	8	6	9	12	18	26	16	11	8	7	5	7	6	4	1	8	4	3	4		
Großherzogthum	103	63	33	43	53	49	55	78	111	92	149	90	52	33	52	37	41	29	41	26	30	22		
1899	67	38	25	34	51	35	56	229	340	141	108	68	31	40	35	57	39	34	35	25	31	34		
1898	66	52	38	26	24	58	60	86	170	111	83	65	45	48	35	29	18	20	17	27	26	19		
1897	64	28	22	39	85	63	210	433	206	162	94	105	37	38	42	21	23	20	29	14	18	32		
1896	70	40	39	29	60	58	83	103	94	88	88	59	48	32	37	25	28	19	13	23	34	26		
1895	47	32	41	47	72	38	72	90	121	128	139	76	58	31	26	33	20	28	28	20	27	27		
1894	52	124	153	100	227	95	82	81	95	73	83	40	44	55	46	52	36	18	23	25	20	32		
1893	63	57	51	69	54	47	73	121	148	132	134	84	58	49	35	41	26	28	25	26	29	48		
1892	108	53	63	50	53	53	78	114	153	143	122	87	42	46	35	37	29	39	22	38	27	22		
1891	49	76	84	66	55	56	101	179	254	178	154	140	48	58	66	34	33	27	27	32	25	35		
Durchschnitte:																								
1891—1900 . . .	69	56	55	50	73	55	87	152	169	125	116	81	46	43	41	37	29	26	26	25	27	30		
1890—1899 . . .	64	55	61	52	76	61	89	162	172	129	110	80	44	43	39	37	29	25	24	26	27	29		
1882—1889 . . .	120	80	83	73	83	114	141	154	154	176	157	129	51	46	51	50	35	24	24	26	28	37		

Landesgegenden und im Großherzogthum im Jahr 1900 (unter Vergleichung mit den Vorjahren). Tabelle 3 b.

Scharlach.													Diphtheritis.												
Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
5	1	—	3	5	5	—	2	1	1	14	31	30	21	26	36	40	27	57	31	14	16	44	61		
3	4	2	11	10	3	4	4	4	16	9	9	40	13	20	13	24	4	8	12	8	12	12	9		
2	1	8	6	9	2	3	—	—	4	1	—	23	26	11	8	12	8	4	4	5	15	27	45		
5	6	6	3	5	6	10	7	6	9	9	11	25	15	16	10	25	33	13	22	57	37	20	24		
16	5	—	—	3	4	1	3	4	2	2	5	30	28	19	12	9	13	13	22	16	23	39	36		
18	11	14	12	11	3	16	13	22	27	11	9	77	53	45	42	38	18	32	17	30	54	56	59		
—	5	10	13	15	10	4	8	15	1	1	6	8	8	5	16	9	1	9	19	33	28	37	21		
27	15	19	25	24	21	32	15	28	24	52	47	107	125	146	91	60	44	38	37	63	76	92	73		
16	37	18	34	60	77	48	33	43	70	36	49	19	20	25	11	16	25	16	16	28	19	27	19		
30	24	18	9	8	17	8	18	30	11	16	19	19	15	20	15	22	9	7	5	25	37	46	44		
4	10	2	2	6	3	7	12	19	18	22	6	14	28	26	14	22	8	10	9	13	21	29	55		
8	6	10	20	24	10	7	6	5	21	24	40	98	60	57	57	76	39	69	47	27	43	83	115		
11	22	20	15	19	13	27	23	32	38	22	25	132	96	80	64	72	64	58	61	103	114	115	119		
14	20	29	38	39	31	36	23	43	25	53	53	115	133	151	107	69	45	47	56	96	104	129	94		
12	60	71	38	45	74	97	63	63	92	99	74	74	52	63	71	40	60	42	33	30	66	77	102	118	
7	3	1	14	15	8	4	5	3	18	23	40	68	35	47	44	59	31	67	42	21	27	55	69		
7	9	13	8	12	5	5	6	5	4	4	—	53	48	21	18	24	20	7	22	19	31	52	73		
5	17	16	13	16	10	25	18	30	37	19	27	111	75	71	63	69	52	59	58	108	109	112	106		
20	44	65	48	73	100	109	84	56	90	96	92	128	152	179	121	83	70	57	58	108	113	136	106		
6	43	25	19	10	13	19	15	30	44	28	35	16	32	42	41	22	42	17	17	14	36	58	74	92	
136	119	97	118	156	151	133	115	172	183	173	192	392	352	359	268	277	190	207	194	292	338	429	446		
96	62	93	81	62	94	62	85	69	117	104	108	400	299	338	290	210	204	183	262	289	287	333	380		
101	94	94	63	96	110	74	54	40	69	66	82	519	368	476	353	337	222	180	213	327	323	303	399		
139	140	99	104	97	100	60	97	86	60	75	88	538	389	393	284	333	227	212	340	377	383	482	520		
202	186	185	195	174	214	180	139	132	101	106	120	494	523	466	375	299	322	281	351	334	315	446	547		
75	42	75	70	91	87	47	93	81	112	147	180	670	460	485	354	298	259	288	319	340	432	551	545		
143	139	163	132	86	87	56	71	82	88	70	78	709	751	732	686	621	369	380	422	421	633	662	816		
118	83	81	86	135	139	115	111	144	154	168	138	626	404	409	432	453	452	401	655	801	825	910	1001		
140	102	150	87	123	115	88	72	73	71	111	88	376	338	365	217	270	263	146	225	305	371	469	442		
161	194	207	225	203	171	142	102	102	134	151	176	384	370	258	359	344	297	201	169	192	308	318	373		
131	116	125	116	122	127	91	94	98	108	117	125	511	425	428	362	344	280	248	315	368	422	490	547		
135	121	143	147	146	141	94	95	95	110	114	123	486	407	416	355	339	282	242	316	363	413	478	538		
254	237	275	248	266	200	178	175	165	166	171	175	273	276	277	227	209	176	137	162	174	184	207	253		

Noch: Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Kreisen, landeskommissarischen Bezirken, Landesgegenden und im Großherzogthum im Jahr 1900 (unter Vergleichung mit den Vorjahren).

Noch: Tabelle 3b.

Kreise etc. und Großherzogthum.	Grupp.												Im ganzen Jahr.					
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Thyphus	Kindbett- fieber	Schar- lach	Diph- theri- tis	Strupp	Wate- tern (Eof- ten)
Kreise:																		
Konstanz	7	3	6	1	6	2	—	—	2	5	3	5	4	37	68	403	40	—
Billingen	10	3	5	3	1	—	—	1	—	2	3	4	11	16	79	175	34	—
Waldshut	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	3	9	14	36	188	7	—
Freiburg	3	5	1	5	3	—	—	2	1	1	5	4	119	69	83	297	30	—
Öbrach	3	6	8	4	3	—	—	2	3	5	4	9	25	20	45	260	53	—
Offenburg	9	4	5	4	7	2	2	1	8	6	4	11	75	43	167	521	63	1)1
Baden	—	5	3	11	3	—	3	1	—	2	5	3	119	33	88	194	36	—
Karlsruhe	11	13	20	12	17	6	10	5	2	18	21	25	316	97	329	952	160	2)6
Mannheim	2	4	3	2	1	1	—	3	4	3	10	12	89	49	521	241	45	—
Heidelberg	4	3	4	3	2	1	—	2	7	7	4	1	104	41	208	264	38	—
Rosbach	4	6	8	9	4	—	—	—	2	5	10	8	48	26	121	249	56	—
Bezirke der Landeskommissäre:																		
Konstanz	17	6	12	4	8	3	2	1	2	8	6	12	24	67	183	766	81	1)1
Freiburg	15	15	14	13	13	2	4	6	14	11	15	24	219	132	295	1078	146	2)6
Karlsruhe	11	18	23	23	20	6	13	6	2	20	26	28	435	130	417	1146	196	—
Mannheim	10	13	15	14	7	2	—	5	13	15	24	21	241	116	850	754	139	—
Landesgegenden:																		
I. See- und Donau- gegend und Klett- gau	14	6	8	3	7	2	1	1	2	7	6	10	12	58	141	565	67	—
II. Hoher Schwarz- wald u. Schwarz- waldhöfeler	7	2	5	5	6	2	1	3	4	2	5	5	29	49	82	388	47	—
III. Obere Rheinebene u. gebirgige Theile der betr. Bezirke	11	13	13	12	8	1	6	3	10	11	12	21	249	104	259	993	121	1)1
IV. Untere Rheinebene und begleitendes Hügelland	13	22	26	23	21	8	11	10	7	24	36	40	489	174	966	1311	241	2)6
V. Oberrhein- und Taubergegend	8	9	12	11	6	—	—	1	8	10	12	9	140	60	297	487	86	—
Großherzogthum:	53	52	64	54	48	13	19	18	31	54	71	85	919	445	1745	3744	562	2)7
1899	52	55	46	50	37	21	21	20	34	62	57	93	1192	446	1033	3475	548	—
1898	58	44	39	40	38	26	14	14	28	38	46	68	839	363	943	4020	453	—
1897	74	48	39	19	28	20	13	23	44	68	73	43	1511	344	1145	4478	492	—
1896	73	69	52	34	31	30	19	17	34	47	54	85	811	362	1884	4753	545	—
1895*)	84	63	76	42	36	19	20	17	27	50	41	63	903	379	1100	5001	538	—
1894	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1205	413	1190	7202	—	—
1893	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1033	457	1472	7369	—	—
1892	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1077	413	1220	3787	—	—
1891	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1392	470	1968	3573	—	—
Durchschnitte:																		
1891—1900*)	66	55	53	40	36	21	18	18	33	53	57	73	1088	409	1370	4740	523	2
1890—1899	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1111	401	1464	4635	—	3
1882—1889	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1464	454	2510	2555	—	17

1) im November; 2) 3 Fälle im Juli, 2 im August und 1 im September; 3) 3 Fälle im Juli, 2 im August und je 1 im September und November. *) erstes Erhebungsjahr, daher Durchschnitt 1895—1900.

(Fortsetzung des Textes von Seite 71.)

Demnach waren von den 41 566 Gestorbenen des Berichtsjahrs 29 646 oder 71,3 % ärztlich behandelt worden, während bei 11 920 oder 28,7 % keine ärztliche Thätigkeit stattgefunden hatte. Und zwar waren von den 14 535 im 1. Lebensjahr Gestorbenen nur 7 507 oder 51,7 %, von den 27 031 über 1 Jahr alten Gestorbenen aber 22 139 oder 81,9 %, von den 21 427 männlichen Personen 14 959 oder 69,8 %, von den 20 139 weiblichen dagegen 14 687 oder 72,9 % ärztlich behandelt worden.

Diese Verschiedenheit der Antheile der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen für jedes der beiden Geschlechter ist von jeher vorhanden gewesen; im letzten Jahrzehnt haben von je 100 Gestorbenen ärztliche Behandlung erfahren

im Jahr	Männl.	Weibl.	im Jahr	Männl.	Weibl.	im Jahr	Männl.	Weibl.
1891	65,0	67,8	1895	67,5	70,7	1899	69,5	72,8
1892	66,2	69,1	1896	69,2	72,3	1900	69,8	72,9
1893	67,7	70,7	1897	68,7	71,6	im Durchschnitt		
1894	70,6	72,4	1898	69,1	71,7	1891/1900	68,3	71,2.

Das Verhältniß der in ärztlicher Behandlung gewesenen Gestorbenen zur Gesamtzahl der Gestorbenen könnte noch ein viel günstigeres sein und zeigt, daß immer noch ein großer Theil der Erkrankten, von denen voraussichtlich viele bei sachgemäßer Behandlung zu retten wären, ohne ärztliche Hilfe bleibt. Es trifft das besonders häufig bei Erkrankungen von Kindern im ersten Lebensjahre zu, von denen im Jahrzehnt 1891/1900 durchschnittlich 47,3 % in ärztlicher Behandlung waren. Vielfach herrscht noch unter dem Landvolke, aber auch in den unteren Schichten der städtischen Bevölkerung die auf Gleichgültigkeit oder auf Sparsamkeitsrücksichten zurückzuführende üble Gewohnheit, das Leben erkrankter Säuglinge nicht allzu hoch zu veranschlagen, ihre Wiedergenesung von der Bethätigung der Natur zu erwarten oder aber die Heilung mit allerlei Hausmitteln zu versuchen, deren Wirkung auf den Organismus vielfach eine indifferente, noch häufiger aber eine schädliche ist. Wirft man einen Blick auf die Zahl der im ersten Lebensjahre gestorbenen Kinder, so muß man es lebhaft bedauern, daß gegenwärtig nur bei etwa der Hälfte derselben ein Arzt zu Rathe gezogen zu werden pflegt. Und dabei hat das Verhältniß im Laufe der letzten 20 Jahre sich um vieles gebessert. Während die ärztlich Behandelten von den im ersten Lebensjahre Gestorbenen Ausgangs der 70er Jahre nur etwa $\frac{1}{3}$ ausmachten, erreichte deren Antheil, wenn auch mit einigen Schwankungen, anfangs der 90er Jahre etwa $\frac{2}{5}$ und stellt sich gegenwärtig auf fast 52 %. Die ärztliche Behandlung der Gestorbenen im Allgemeinen hat seit Anfang der 80er Jahre um 10 % zugenommen; bei den tödlich verlaufenen Erkrankungen der Kinder, vollzog sich erfreulicher Weise dieser Fortschritt etwas rascher, indem hier die Zunahme seit 1879 etwa 14 % beträgt. Von einer aufmerksameren Behandlung der Säuglingskrankheiten durch häufigere Beiziehung von Ärzten ist demnach noch viel für die Herabminderung der allgemeinen Sterbeziffer zu erwarten.

Ebenso wie bei den Geschlechtern bzw. bei Kindern und Erwachsenen wurde die ärztliche Hilfe in den verschiedenen Gegenden des Landes wie gewöhnlich auch im Jahr 1900 in ungleichem Maße in Anspruch genommen. Die Verhältnißzahl schwankte in den Amtsbezirken zwischen 54,2 % aller Todesfälle im Amtsbezirk Wiesloch und 87,0 % im Bezirk Müllheim; noch günstigere Verhältnißzahlen als dieser Amtsbezirk wiesen unter anderen die Städte Konstanz mit 93,2 %, Heidelberg mit 92,3, Karlsruhe mit 90,1 und Freiburg mit 87,8 % aller Gestorbenen auf.

Von den Gestorbenen der Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren im Ganzen 83,4 % (1899: 85,1 %), in den übrigen Gemeinden nur 65,7 % (1899: 65,2 %) ärztlich behandelt worden. Es ist auffällig, daß der Antheil der ärztlich behandelten Gestorbenen gerade in den größeren Gemeinden, wo doch ärztliche Hilfe reichlich vorhanden ist, im Berichtsjahr abgenommen hat. Schuld daran dürften die in dieser Klasse von Gemeinden häufigeren plötzlichen Todesfälle (Selbstmorde, Verbrechen und Unfälle) tragen, deren Zahl im Jahr 1900 erheblich gestiegen ist. In Säckingen stieg der Antheil der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen auf 93,4 % und in Konstanz auf 93,2 %; dagegen betrug er in Hockenheim nur 46,0 %, in Bühlertal 48,5 %.

2. Die in Anstalten Gestorbenen.

Die Zahl der in den Krankenanstalten (einschl. der Anstalten für Geisteskrante) Gestorbenen und deren Verhältniß zur Zahl aller Gestorbenen wurde im Großherzogthum zum ersten Mal im Jahr 1852 ermittelt; sie betrug damals 694 oder 1,8 % aller Gestorbenen und stieg auf 973 oder 2,6 % im Jahr 1864, 1406 oder 3,5 % im Jahr 1876, 2439 oder 6,3 % im Jahr 1888 und 3746 oder 9,0 % im Jahr 1900. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts betrug dieselbe

im Jahr	Zahl	%	im Jahr	Zahl	%	im Jahr	Zahl	%
1891	2672	6,9	1895	2891	7,7	1899	3274	8,7
1892	2759	7,4	1896	2918	8,3	1900	3746	9,0
1893	2906	7,0	1897	3027	8,1	im Durchschnitt		
1894	3099	7,8	1898	3240	8,4	1891/1900	3053	7,9

Die Krankenanstalten befinden sich vornehmlich in größeren Gemeinden; in Folge dessen macht die Zahl der darin Gestorbenen in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern einen weit höheren Antheil aller Gestorbenen (20,7%) aus, als in den übrigen Gemeinden des Landes (3,6%). Auch in den Bezirken ist die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen — je nach der Zahl der vorhandenen Krankenhäuser — sehr verschieden. Höchste Zahlen einer- und geringste oder Fehlzahlen andererseits kamen 1900 in folgenden Bezirken vor: Es starben in Krankenanstalten

über 10 % der Gestorbenen:			unter 1 % der Gestorbenen:				
in		in	in		in		
Freiburg	28,9	Vorrach	14,1	Donauessingen	12,2	Wiesloch	0,8
Heidelberg	20,7	Waldshut	13,2	Baden	11,9	Schwezingen	0,7
Schopfheim	19,9	Konstanz	13,0	Mannheim	11,5	Altsheim	0,7
Karlsruhe	16,5	Pfullendorf	12,9	Pforzheim	10,6	Rehl	0,6
Bühl	14,5	Engen	12,2	Weinheim	10,2	Durlach	0,6

In den Anstalten für Geisteskranke, Idioten, Epileptiker etc. insbesondere starben 258 oder 5,9% aller im Laufe des Berichtsjahrs vorhanden gewesenen Pflinglinge gegen 226 oder 5,4% im Jahr 1899; in den Kreispflegeanstalten kamen 415 Sterbefälle vor oder 13,5 auf 100 Verpflegte gegen 384 oder 12,8% im Jahr 1899.

3. Die im ersten Lebensjahre Gestorbenen im Allgemeinen.

Eine Gegenüberstellung der Zahl der im 1. Lebensjahre gestorbenen Kinder und der Zahl der Gestorbenen überhaupt bzw. der Einwohner ergibt in ähnlicher Weise, wie bei der Vergleichung der Zahl der im 1. Lebensjahre Gestorbenen mit derjenigen der Geborenen (vergl. Tabelle 2a der Bewegung der Bevölkerung, Seite 48 ff.), daß die in früheren Jahren so erschreckend hohe Kindersterblichkeit langsam, aber fast ständig zurückgeht. Während von 100 überhaupt Gestorbenen in den Jahren 1860—1879 nicht weniger als 37 im 1. Lebensjahre standen, belief sich der Antheil der Säuglinge im Durchschnitt der letzten 10 Jahre nur noch auf 32,6%, im Berichtsjahr leider auf 35,0%, und hat im Vergleich zum Vorjahre (33,8%) wieder zugenommen.

Dabei weisen die Gegenden, die regelmäßig den größten Antheil der Kindersterblichkeit stellen, auch 1900 ungünstige Verhältniszahlen auf. Im Amtsbezirke Schwezingen waren 58,9% sämtlicher Todesfälle solche von Kindern im 1. Lebensjahre, in Mannheim 49,0%, in Bruchsal 49,0%, in Wiesloch 48,7% und in Durlach 47,3%. Es sind dieselben stark industriellen Bezirke, in denen auch die Lungenschwindsucht die meisten Opfer fordert. Dazu kommt, daß eben diese genannten Kreise, wie bereits in der Mittheilung über die Bewegung der Bevölkerung nachgewiesen ist, zu denjenigen gehören, welche eine starke Bevölkerungszunahme haben; der Tod hält unter der großen Zahl von Neugeborenen eine reiche Ernte. Auf die Höhe der Kindersterblichkeit haben die berufliche Thätigkeit der Mütter und natürliche Verhältnisse zweifellos erheblichen Einfluß; es wird Aufgabe einer späteren, sich auf einen längeren Zeitraum erstreckenden Untersuchung sein, diese Verhältnisse im Einzelnen genauer festzustellen.

Die Kindersterblichkeit im Großherzogthum in den letzten 10 Jahren gestaltete sich wie folgt: Es starben im 1. Lebensjahre

im Jahr	überhaupt	% der Geborenen	% der Gestorbenen	im Jahr	überhaupt	% der Geborenen	% der Gestorbenen	im Jahr	überhaupt	% der Geborenen	% der Gestorbenen
1891	12 782	23,1	33,0	1895	12 822	22,6	34,2	1899	12 718	20,4	33,8
1892	11 969	21,8	31,9	1896	10 670	18,4	30,5	1900	14 535	22,9	35,0
1893	12 283	22,1	29,6	1897	12 812	21,7	34,2	im Durchschnitt			
1894	11 461	21,1	29,0	1898	13 497	22,3	35,0	1891/1900	12 555	21,7	32,6

4. Die Kindersterblichkeit im Besonderen.

Die Bedeutung einiger wichtiger Todesursachen, welche vorwiegend bei Kindern auftreten und alljährlich zahlreiche Opfer zu fordern pflegen, wird im Folgenden im Einzelnen nachgewiesen.

a. Masern. Zugenommen gegen das Vorjahr haben im Jahr 1900 die Todesfälle an Masern. Es starben daran im letzten Jahrzehnt, und zwar

im Jahr	Personen	davon im 1. Lebensjahr	im Jahr	Personen	davon im 1. Lebensjahr	im Jahr	Personen	davon im 1. Lebensjahr
1891	631	211	1895	377	126	1899	225	73
1892	469	174	1896	416	145	1900	452	163
1893	550	185	1897	487	181	im Durchschnitt		
1894	685	229	1898	182	65	1891/1900	447	155.

Die Kinder im ersten Lebensjahre machten im Berichtsjahre 36,1 % und im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts 34,7 % der an Masern gestorbenen Personen aus.

b. Scharlach.

Die Todesfälle an Scharlach haben seit 1896 zum ersten Mal wieder an sich und im Verhältnis zur Zahl der Erkrankten eine Zunahme erfahren. Es starben nämlich daran von 1745 Erkrankten 71 oder 4,1 % gegen 35 von 1033 Erkrankten (3,4 %) im Vorjahre. Schon die Zahl der von der Krankheit Befallenen ist um 70 % gestiegen, die Zahl ihrer Opfer doppelt so groß als im Vorjahre. Auch räumlich hat der Scharlach zugenommen: statt 33, wie im Vorjahre, waren nur 30 Amtsbezirke verschont. Die Amtsbezirke Mannheim mit 16, Pforzheim mit 7 und Karlsruhe und Heidelberg mit je 6 weisen die meisten Sterbefälle an Scharlach auf. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts fielen dieser Krankheit zum Opfer

im Jahr	Personen	% der Erkrankten	im Jahr	Personen	% der Erkrankten	im Jahr	Personen	% der Erkrankten
1891	130	6,6	1895	62	5,6	1899	35	3,4
1892	92	7,5	1896	96	5,1	1900	71	4,1
1893	91	6,2	1897	54	4,7	im Durchschnitt		
1894	134	11,3	1898	41	4,3	1891/1900	81	5,9.

c. Blattern (Pocken).

An Blattern erkrankten im Berichtsjahre 7 Personen, davon 6 im N.-B. Karlsruhe (Knielingen) und eine in Offenburg; ein Fall, der erste seit 9 Jahren, verlief tödtlich. Seit 1871, wo die Epidemie 3184 Personen wegraffte, treten sie nur noch in vereinzelt, vom Auslande eingeschleppten Fällen auf. Die strenge Durchführung der Impfpflicht hat hiernach im Großherzogthum, wie überall in Deutschland, gute Früchte getragen.

d. Diphtheritis (Rachenbräune) und Krupp.

Während die Zahl der Todesfälle an Diphtherie in den Jahren 1892—94 eine recht erhebliche Steigerung erfahren hatte, zeigte das Jahr 1895 eine sehr starke Besserung, die auch bis 1899 anhielt, augenscheinlich eine Folge der immer häufigeren Serumbehandlung; im Jahr 1900 dagegen ist die Zahl der Todesfälle wieder etwas gestiegen. Die Zahl der an Krupp Gestorbenen ist seit 1893 von 816 auf 192 im Jahr 1900 gesunken, womit die zweitniedrigste Zahl in den letzten 10 Jahren erreicht wurde. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben

im Jahr	an Diphtherie	% der Erkrankten	an Krupp	im Jahr	an Diphtherie	% der Erkrankten	an Krupp	im Jahr	an Diphtherie	% der Erkrankten	an Krupp
1891	961	26,9	507	1895	676	13,5	320	1899	311	8,9	236
1892	1075	28,4	560	1896	543	11,4	257	1900	344	9,2	192
1893	1911	25,9	816	1897	489	10,9	219	im Durchschnitt			
1894	1831	25,4	675	1898	378	9,4	188	1891/1900	852	18,0	897.

Die meisten Opfer forderte die Diphtheritis in den Amtsbezirken Pforzheim (40 Fälle), Mannheim (32 Fälle), Offenburg (20 Fälle), Lörrach und Heidelberg (je 19 Fälle); es kommen auf diese 5 Amtsbezirke allein fast zwei Fünftel aller im Lande an dieser Krankheit Gestorbenen. Die Zahlen der an Krupp Gestorbenen sind im Berichtsjahre verhältnismäßig hoch in Pforzheim mit 35 und in Lörrach mit 17 Fällen. Der Amtsbezirk Pforzheim stand auch im Jahre vorher mit der Zahl der an beiden Krankheiten Gestorbenen an der Spitze.

e. Keuchhusten.

Erheblich zurückgegangen gegen das Vorjahr ist die Sterblichkeit an Keuchhusten im Jahr 1900; sie steht seit 1896 zum ersten Mal wieder unter dem Durchschnitt des letzten Jahrzehnts. Es starben daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1891	494	1894	548	1897	397	1900	342
1892	376	1895	209	1898	533	im Durchschnitt	
1893	294	1896	264	1899	466	1891/1900	392.

Im Durchschnitt 1880/89 waren 479, 1870/79: 509, 1860/69: 463, 1852/59: 554 Todesfälle an Keuchhusten zu verzeichnen. Von den Amtsbezirken weisen im Berichtsjahre Pforzheim mit 42, Billingen mit 30 und Bommendorf mit 24 Todesfällen an dieser Krankheit die ungünstigsten Verhältnisse auf, während 6 Amtsbezirke von Todesfällen an Keuchhusten verschont blieben.

Von den oben genannten Krankheiten (Masern, Scharlach, Diphtherie, Krupp und Keuchhusten) waren demnach im Jahr 1900 nur Krupp und Keuchhusten weniger gefährlich, während die drei übrigen, besonders Masern und Scharlach, erheblich größere Opfer an Menschenleben verlangten, als in den beiden Vorjahren. An diesen 5 Krankheiten zusammen genommen sind im letzten Jahrzehnt 21 693 Personen gestorben, und zwar

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1891	2723	1894	3873	1897	1646	1900	1402
1892	2572	1895	1644	1898	1322	Durchschnitt	
1893	3662	1896	1576	1899	1273	1891/1900	2169.

Hiernach ist das Jahr 1900 immer noch das drittglücklichste in dem letzten 10-jährigen Zeitraum. Das erste Lebensjahr ist an diesen fünf Todesursachen in recht ungleichem Maße beteiligt. Im Jahr 1900 starben Untereinfährige an Masern 163 (36,1 % der an Masern Gestorbenen), an Scharlach 8 (11,3 %), an Diphtheritis 32 (9,3 %), an Krupp 34 (17,7 %) und an Keuchhusten 227 (66,4 %). Letztere Krankheit ist demnach für Säuglinge die verhängnisvollste unter den fünf Infektionskrankheiten.

5. Die wichtigsten Todesursachen der Erwachsenen.

a. Grippe (Influenza).

Früher kam die Influenza nur in vereinzelt Fällen vor; seit ihrem epidemischen Zuge durch Europa im Jahr 1890 hat sie jedoch auch in Baden eine größere Zahl von Personen hinweggerafft. Nachdem sie im Jahr 1896 ihren niedrigsten Stand erreicht hatte, ist sie wieder im Zunehmen begriffen und zeigte sich im Berichtsjahr 1900 besonders gefährlich, noch weit gefährlicher als 1890. Damals raffte sie im ganzen Jahr 907 Personen in Baden dahin, davon im Januar 629, im Februar 176, im März 62, im April 17, im Mai 8, im Juni 4, dann in allen Monaten nur vereinzelte Fälle; diesmal trat die Krankheit später auf und die Gefahr erreichte ihren Höhepunkt im März, zog sich aber durch das ganze Jahr hin. Es starben daran im Februar 155, März 579, April 274 Personen, zusammen 1008 in den 3 Monaten. Während 1890 von den Amtsbezirken nur Freiburg mit 55, Tauberbischofsheim mit 52 und Karlsruhe mit 47 Todesfällen mehr als 40 aufwiesen, wurden diesmal die Amtsbezirke Freiburg mit 72, Offenburg mit 61, Karlsruhe mit 53, Wolfach mit 44 und Konstanz mit 40 Todesfällen besonders heimgesucht. Noch 1899 blieben 6 meist oberländische Amtsbezirke von Influenzafällen verschont, im Jahr 1900 kein einziger. In den letzten 10 Jahren starben im Großherzogthum im Ganzen 4616 Personen an Influenza, und zwar

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1891	53	1894	850	1897	180	1900	1158
1892	547	1895	231	1898	285	im Durchschnitt	
1893	850	1896	161	1899	301	1891/1900	462.

b. Gestorbene Wöchnerinnen.

Es starben Wöchnerinnen überhaupt in den ersten drei Wochen nach der Entbindung nach den Angaben der Hebammen

im Jahr	Zahl	% der Niedergelommenen	im Jahr	Zahl	% der Niedergelommenen	im Jahr	Zahl	% der Niedergelommenen
1891	333	0,59	1895	250	0,43	1899	241	0,38
1892	298	0,54	1896	194	0,33	1900	238	0,37
1893	339	0,60	1897	196	0,33	im Durchschnitt		
1894	240	0,43	1898	214	0,34	1891/1900	254	0,43.

Hiernach ist die Sterblichkeit im Wochenbett im Jahr 1900 etwas geringer gewesen als im Vorjahre. Erkrankungen an Kindbettfieber wurden 445 zur Anzeige gebracht, d. h. fast ebensoviel wie im Vorjahr, aber mehr als je seit 1893; 135 oder 30,3 % verliefen tödtlich. Im letzten Jahrzehnt gingen die Sterbefälle an Kindbettfieber von 34,7 % der Erkrankten im Jahr 1891 auf 30,3 % im Berichtsjahre zurück. Die Erkrankungen selbst haben gegen den Anfang des Jahrzehnts wesentlich nachgelassen; im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts starben von den an Kindbettfieber erkrankten Frauen nicht ganz ein Drittel. Folgende Uebersicht giebt nähere Auskunft darüber:

im Jahr	an Kindbettfieber	% der Erkrankten	im Jahr	an Kindbettfieber	% der Erkrankten	im Jahr	an Kindbettfieber	% der Erkrankten
1891	163	34,7	1895	122	32,2	1899	122	27,2
1892	145	35,1	1896	83	22,9	1900	135	30,3
1893	151	33,6	1897	92	26,3	im Durchschnitt		
1894	117	23,3	1898	99	27,3	1891/1900	123	30,1.

Im Verhältnis zur Gesamtzahl der Wöchnerinnen (65 135) ist sowohl die Zahl der Erkrankungen wie die der Todesfälle an Kindbettfieber (0,68 bzw. 0,21 %) im Berichtsjahr erfreulich gering.

c. Typhus.
 Von den 919 Erkrankungen an Typhus, die im Jahr 1900 zur Anzeige gelangten, hatten 167 oder 18,2% einen tödtlichen Ausgang, gegen 194 oder 16,3% von 1192 Erkrankungen im Vorjahr. In den letzten 10 Jahren starben an Abdominaltyphus

im Jahr	Personen überhaupt	% der Erkrankten	im Jahr	Personen überhaupt	% der Erkrankten	im Jahr	Personen überhaupt	% der Erkrankten
1891	183	13,2	1895	123	13,6	1899	194	16,3
1892	167	15,5	1896	134	16,5	1900	167	18,2
1893	192	18,6	1897	192	12,7	im Durchschnitt 1891/1900		167
1894	183	15,0	1898	135	16,1			

Gegenüber dem Vorjahre hat die Zahl der Erkrankungen und der Todesfälle eine recht erfreuliche Abnahme erfahren, dagegen hat ihre Gefährlichkeit gegenüber dem Vorjahre zugenommen. Immerhin ist in den letzten 50 Jahren eine gewaltige Besserung zu beobachten: während im Durchschnitt der Jahre 1852/59 noch 1658 Personen an Typhus gestorben sind, ist die Zahl der Todesfälle daran für das letzte Jahrzehnt auf 167 herabgesunken.

d. Ruhr (Dysenterie).

Noch mehr als beim Typhus scheint die Kraft der Ruhr (Dysenterie) wie schon in früheren Jahren hervorgehoben wurde, in den letzten Jahrzehnten gebrochen, dank hauptsächlich der Einwirkung vervollkommener sanitärer Einrichtungen, sowie sorgfältiger ärztlicher Behandlung und diätetischer Lebensweise. Es starben daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1891	4	1894	4	1897	4	1900	2
1892	3	1895	2	1898	3	im Durchschnitt 1891/1900	
1893	—	1896	2	1899	—		

e. Selbstmorde.

Die Zahl der Selbstmorde ist im Jahr 1900 weiter gestiegen; sie war um 19 größer als im Vorjahre und betrug

im Jahr	Fälle	im Jahr	Fälle	im Jahr	Fälle	im Jahr	Fälle
1891	353	1894	337	1897	329	1900	370
1892	359	1895	337	1898	359	im Durchschnitt 1891/1900	
1893	354	1896	336	1899	351		

Wie gewöhnlich waren in den größeren Gemeinden die Selbstmorde verhältnismäßig häufiger als in den übrigen Gemeinden und im Großherzogthum im Ganzen. Von den 370 Selbstmördern des Jahres 1900 kamen 176 auf die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern, 121 auf die Städte mit mehr als 20000 Einwohnern insbesondere. Auf 1000 Einwohner entfielen in der erstgenannten Gruppe von Gemeinden 0,29, in der zweiten Gruppe 0,30, in den übrigen Gemeinden 0,16, im ganzen Lande 0,20 Selbstmorde. Im Durchschnitt des Jahrzehnts 1891/1900 legten 289 Männer und 60 Frauen Hand an sich; das weibliche Geschlecht machte also ein Sechstel (genauer 17,2%) der Selbstmörder aus. Im Jahr 1900 war der Antheil der weiblichen Personen noch größer: von den 370 Selbstmördern waren 74 oder 20,0% Frauen. Als Todesart wählten die Selbstmörder, wie stets in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts, auch 1900 am häufigsten das Erhängen (190), Erschießen (77) und Ertränken (53); Tod durch Gift kam 26mal vor. Von den männlichen Selbstmördern (296) starb weit über die Hälfte (164) durch Erhängen und über ein Fünftel (77) durch Erschießen; von den weiblichen Personen suchten je etwa ein Drittel (26) den Tod durch Erhängen und im Wasser (24).

Nach der Jahreszeit vertheilen sich die Selbstmorde meist derart, daß sie gegen den Sommer zu- und danach abnehmen. Im Jahr 1900 fiel die Höchstzahl in den Mai, die Mindestzahl in den Februar, im Durchschnitt des ganzen Jahrzehnts in den Juni bezw. Februar.

f. Todesfälle durch Verunglückung und Verbrechen etc.

Auf gewaltthame Weise (durch Verbrechen, Vergehen, Unfall, Verunglückung) starben im Jahr 1900 insgesamt 878 Personen; es ist das die höchste Zahl seit 50 Jahren. In den letzten 10 Jahren kamen gewalttham ums Leben

im Jahr	Personen	auf 1000 Einwohner	im Jahr	Personen	auf 1000 Einwohner	im Jahr	Personen	auf 1000 Einwohner
1891	637	0,39	1895	709	0,41	1899	834	0,46
1892	554	0,33	1896	741	0,43	1900	878	0,47
1893	651	0,39	1897	741	0,42	im Durchschnitt 1891/1900		
1894	621	0,37	1898	787	0,45			

Und zwar kamen in den Gemeinden von mehr als 4000 Einwohnern 319, in den übrigen Gemeinden 559 gewaltthame Todesfälle, auf 1000 Einwohner dort 0,52, hier 0,46 vor. Von den

gewaltigen Todesfällen waren 75 die Folge von Verbrechen und Vergehen, 803 von Verunglückung; letztere geschah durch Sturz in 237, Ertrinken in 169, Ueberfahren von Fuhrwerk in 74, Verbrühen in 36 Fällen, auf der Eisenbahn verunglückten 52 Personen. Des Weiteren wurde der Tod durch Verbrennen in 47, Erschlagen in 42, durch Stoß oder Schlag von Pferden und Rindvieh in 26, durch Maschinen ebenfalls in 26, durch Vergiftung in 17, Erstickten in 11 und auf sonstige Weise in 66 Fällen herbeigeführt.

Nach den beiden Hauptgruppen kamen in den einzelnen Jahren des Jahrzehnts um

	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	im Durchschnitt
durch Verbrechen z.	39	48	43	52	59	67	50	79	58	75	57
Verunglückung	598	506	608	569	650	674	691	708	776	803	658
oder in Prozenten											
durch Verbrechen z.	7,0	6,1	6,6	8,4	8,3	9,0	6,7	10,0	7,0	8,5	8,0
Verunglückung	93,0	93,9	93,4	91,6	91,7	91,0	93,3	90,0	93,0	91,5	92,0

Von den im Jahr 1900 durch Verbrechen und Vergehen Getödteten waren 38 Männer, 15 Frauen und 22 Kinder, unter den Verunglückten waren 537 Männer, 79 Frauen und 187 Kinder. Die Kinder machten bei den ersteren 29,3%, bei den letzteren 23,3% aus gegen 36,8 bzw. 25,4% im Durchschnitt des Jahrzehnts 1891/1900. Auffallend ist, daß die Prozentzahl der Verunglückungen von Kindern nur geringen jährlichen Schwankungen unterliegt, während der Anteil der Kinder an der Zahl der durch Verbrechen z. Getödteten von Jahr zu Jahr sich viel erheblicher ändert, wie ein Blick auf die nachstehende 10jährige Zusammenstellung zeigt.

Unter je 100 an den beiden Hauptgruppen der gewaltigen Todesfälle Gestorbenen waren Kinder

im Jahr	bei Verbrechen und Vergehen	bei Unglücksfällen	im Jahr	bei Verbrechen und Vergehen	bei Unglücksfällen
1891	51,3	27,3	1896	36,7	23,6
1892	57,5	26,1	1897	37,0	25,8
1893	30,2	26,8	1898	41,4	23,7
1894	51,9	27,1	1899	38,9	25,7
1895	40,7	27,1	1900	29,3	23,3

g. Krebs.

An Krebs und Geschwülsten (böartigen Neubildungen) starben

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1891	1572	1894	1636	1897	1750	1900	1882
1892	1504	1895	1719	1898	1841	im Durchschnitt	
1893	1643	1896	1824	1899	1858	1891/1900	1723

Die Zahl dieser Todesfälle nimmt mit einigen Schwankungen ziemlich stetig zu und hat im Berichtsjahr den Höchststand des Jahrzehnts erreicht.

6. Die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht und Lungenentzündung insbesondere.

Im Jahr 1900 starben an Lungenschwindsucht 4256, an krupöser und katarrhalischer Lungenentzündung einschl. akuter Bronchitis 4189, somit an diesen Todesursachen zusammengenommen 8445 Personen, d. i. 20,3% oder mehr als ein Fünftel sämtlicher Gestorbenen. Nachdem die Sterblichkeit an beiden Krankheiten in den letzten Jahren vorher abgenommen hatte, trat sie im Jahre 1900 wieder verstärkt auf. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts erlagen

im Jahr	der Lungenschwindsucht		einschl. Kinder im 1. Jahre		Personen über 1 Jahr		der Lungenentzündung z. zusammen		einschl. Kinder im 1. Jahre	
	überhaupt	auf 1000 Einw.	im 1. Jahre	auf 1000 Einw.	über 1 Jahr	auf 1000 Einw.	überhaupt	auf 1000 Einw.	im 1. Jahre	auf 1000 Einw.
1891	4664	2,81	4124	2,49	2892	1,74	8788	5,30	8788	5,30
1892	4504	2,71	4161	2,50	2879	1,73	8665	5,21	8665	5,21
1893	4654	2,81	4710	2,84	3731	2,28	9364	5,65	9364	5,65
1894	4863	2,93	4586	2,76	3348	2,02	9449	5,69	9449	5,69
1895	4571	2,66	3682	2,14	2425	1,41	8253	4,80	8253	4,80
1896	4557	2,62	3740	2,18	2483	1,43	8207	4,77	8207	4,77
1897	4433	2,51	3780	2,14	2421	1,37	8213	4,65	8213	4,65
1898	4334	2,41	4139	2,31	2781	1,55	8473	4,72	8473	4,72
1899	4144	2,27	4003	2,20	2728	1,50	8147	4,47	8147	4,47
1900	4256	2,29	4189	2,26	2816	1,52	8445	4,55	8445	4,55
im Durchschnitt	4498	2,58	4111	2,35	2850	1,63	8609	4,93	8609	4,93

Nebst der Eklampsie der Kinder und der Altersschwäche fordern diese zwei Krankheiten bezw. Krankheitsgruppen zahlreichere Opfer als irgend welche anderen Todesursachen.

Nachstehend ist in üblicher Weise die Sterblichkeit an diesen beiden wichtigen Krankheitsformen in den einzelnen Amtsbezirken und in den größeren Städten dargestellt. Dabei sind die Amtsbezirke bezw.

Städte und Landbezirke nach der Häufigkeit der Sterbfälle an beiden Krankheiten geordnet; mit einem * sind die Bezirke versehen, in denen beide Krankheiten, jede für sich, hinsichtlich der Zahl der Todesfälle über, mit einem † diejenigen, in denen beide unter dem Landesdurchschnitt stehen.

Table with columns for 'an Lungen- und Schwindsucht' and 'an Lungenentzündung'. Rows list various locations like Wiesloch, St. Blasien, Neustadt, etc., with corresponding mortality rates for 1900 and 1899.

In nachstehender Uebersicht werden die Amtsbezirke in der Ordnung der 1900 stattgehabten Sterblichkeit an jeder einzelnen der beiden Krankheiten aufgeführt, unter Beifügung der Biffern des Vorjahrs. Darnach starben von 1000 Einwohnern

Table with columns for 'an Lungenentzündung (einschl. akuter Bronchitis)'. Rows list various locations with mortality rates for 1900 and 1899.

Auch im Berichtsjahre haben wie gewöhnlich die Lungenerkrankheiten in den einzelnen Amtsbezirken ihre Opfer in verschiedener Menge gefordert. Im Bezirk Wiesloch starben im Jahr 1900 an beiden Todesursachen zusammengenommen 6,67, im Bezirk Bretten nur 2,06 von 1000 Einwohnern; der Schwindsucht für sich erlagen ebenfalls im Bezirk Wiesloch 3,42, im Bezirk Schönau nur 1,06, den entzündlichen Brustkrankheiten im Bezirk Neustadt 3,77, im Bezirk Kehl 1,15 von 1000 Einwohnern. Dabei weist wie alljährlich ein Theil der Bezirke für beide Krankheitsarten eine große, ein anderer Theil eine geringe, ein dritter Theil aber eine verschieden hohe Sterblichkeit auf. Die Sterbeziffer eines und desselben Bezirks ist in den beiden Jahren nicht selten recht erheblichen Schwankungen unterworfen. Unterschiede von $\frac{1}{2}\%$ und mehr finden sich bei der Sterblichkeit an Schwindsucht in folgenden 16 Amtsbezirken bezw. Städten: Ettenheim, Stausen, Meßkirch, Konstanz Land, St. Blasien, Pfullendorf, Stodach, Ueberlingen (Zunahme); Heidelberg Land, Baden, Schwetzingen, Mannheim Stadt, Waldkirch, Achern, Tauberbischofsheim, Schönau (Abnahme). Bei der Lungentzündung sind die Differenzen noch häufiger; sie betragen $\frac{1}{2}\%$ und mehr in folgenden 24 Bezirken: Neustadt, Billingen, St. Blasien, Donaueschingen, Wiesloch, Stodach, Waldshut, Schönau, Einsheim, Lörrach, Weinheim, Ueberlingen (Zunahme); Schwetzingen, Emmendingen, Ettlingen, Säckingen, Meßkirch, Mannheim, Lahr, Mannheim Stadt, Freiburg, Freiburg Land, Bretten, Kehl (Abnahme).

Nach der Sterblichkeit an Schwindsucht bilden die Amtsbezirke größere natürliche Gebiete von im Allgemeinen gleichartiger und stetiger Sterblichkeit, während für die Lungentzündung die Bezirke sich von Jahr zu Jahr weniger bestimmt und dabei anders gruppieren. So lassen sich für die Lungenschwindsucht im Jahre 1900 folgende Gebiete unterscheiden mit einer den allgemeinen Landesdurchschnitt zum Teil erheblich übersteigenden Sterbeziffer: die untere Rhein- und Neckar- gegend bis herauf zur Murg und Dos (Bezirke Mannheim, Schwetzingen, Weinheim, Heidelberg, Eberbach, Wiesloch, Bruchsal, Karlsruhe, Ettlingen, Rastatt und Baden), während der östlich von jenem Gebiet gelegene Landestheil (das Neckarhügel- und Bauland sowie ein Theil des Pfingz- und Kraichgaus) fast durchgängig mäßig hohe und geringe Sterbeziffern hat; im Süden des letzteren macht nur die Stadt Pforzheim eine Ausnahme. In Mittelbaden bilden die Amtsbezirke Offenburg und Lahr und weiter nach Süden Emmendingen, Ettenheim, Freiburg und Stausen neuerdings Gebiete hoher Sterblichkeit an Schwindsucht. Der sich daran anschließende südliche Theil der Rheinebene aufwärts bis Säckingen, auffallender Weise unter Einfluß des stark entwickelten Industriezentrums des Textilgewerbes, mit seitlicher Ausdehnung über Theile des nördlichen, über den südöstlich sich anschließenden hohen und südlichen Schwarzwald, ferner die Baar, das obere Rheinthal sowie die Donau- und Seegegend weisen im Ganzen eine geringe oder mäßige Sterblichkeit auf. Ausnahmen machen nur die zwischen diesen Gebieten gelegenen Bezirke Konstanz, Meßkirch und Engen, deren Sterblichkeit an Schwindsucht über dem Landesdurchschnitt steht.

7. Allgemeine Uebersicht der Todesursachen.

In den vorstehenden Uebersichten und Bemerkungen ist nur eine beschränkte Zahl von Todesursachen berücksichtigt worden, durch die im Jahr 1900 nur 14768 oder 85,5% aller Todesfälle verursacht wurden; in der folgenden Uebersicht werden sämtliche Sterblichkeitsergebnisse des Jahres 1900 und des Durchschnitts der 10 Jahre 1891/1900 für die Abtheilungen und Gruppen der Todesursachen zusammengefaßt, und zwar in der weiteren Ausführung, daß einerseits die im 1. Lebensjahr und im Alter von 1 Jahr und darüber Gestorbenen und die männlichen und weiblichen Personen gesondert angegeben sind, andererseits neben der Darstellung aller Gestorbenen eine besondere für die in ärztlicher Behandlung Gestorbenen gegeben ist. Den Zahlenreihen der überhaupt Gestorbenen sind die prozentualen Antheile der einzelnen Krankheitsgruppen an deren Gesamtzahl, den einzelnen Zahlen der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen das Verhältniß derselben zu den an den Krankheiten der Abtheilung überhaupt Gestorbenen beigelegt.

Nach dieser Tabelle haben die Abtheilungen der Krankheiten zc. sehr ungleich zu der Gesamtzahl der Sterbefälle beigetragen und in denselben die ärztliche Behandlung in ungleichem Maße stattgefunden. Während auf die Krankheiten der Organe im Berichtsjahre wie im zehnjährigen Durchschnitt etwa $\frac{2}{3}$ (65,91 bezw. 65,23%) aller Gestorbenen kommen, erscheinen die Zoonosen 1900 mit 0,002 und im Durchschnitt mit 0,001, die Parasiten mit 0,06 bezw. 0,03 und die Vergiftungen mit 0,24 bezw. 0,19% der Todesfälle. Unter den Krankheiten der Organe verursachten die der Athmungsorgane mit 24,59% im Jahr 1900 und 26,70% im Durchschnitt des Jahrzehnts 1891/1900 die größte Zahl an Sterbefällen; alsdann folgen die Krankheiten des

Nervensystems und der Sinneswerkzeuge mit 14,67 bzw. 16,20 %, sowie die der Verdauungswerkzeuge mit 16,96 bzw. 13,49 %. Und zwar stellten bei den beiden letztgenannten Gruppen die Säuglinge mit zusammen 59,32 bzw. 56,75 vom Hundert, bei den Krankheiten der Athmungsorgane die Uebereinjährigen mit 31,87 bzw. 33,70 vom Hundert die größten Anttheile an den Todesfällen. Von den an Erkrankungen des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge Gestorbenen waren nur 50,84 bzw. 45,31 %, von den an Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge Gestorbenen dagegen 98,20 bzw. 98,06 % ärztlich behandelt. Ebenso tritt die ungleiche Häufigkeit des Sterbens und der ärztlichen Behandlung der Unter- und der Uebereinjährigen, sowie der beiden Geschlechter bei den einzelnen Krankheitsgruppen hervor. So starben z. B. an Störungen der Entwicklung und Ernährung von den Männern 21,78 bzw. 22,06 %, von den Frauen 24,79 bzw. 24,86 %; von den daran gestorbenen Untereinjährigen waren 41,34 bzw. 33,70, von den Uebereinjährigen 63,13 bzw. 60,64 %, von den Männern 52,65 bzw. 50,92, von den Frauen 53,69 bzw. 51,91 % ärztlich behandelt worden. Ueberhaupt hatten im Jahr 1900 bzw. durchschnittlich 51,65 bzw. 47,48 % der Unter- und 81,90 bzw. 80,51 % der Uebereinjährigen, 69,81 bzw. 68,33 % der Männer und 72,93 bzw. 71,21 % der Frauen ärztliche Behandlung erfahren. Die Zuanpruchnahme ärztlicher Hilfe, die früher bei den Uebereinjährigen nahezu noch einmal so groß war, als bei den Kindern im 1. Lebensjahr, gestaltet sich für die letzteren von Jahr zu Jahr günstiger, ist aber bei den weiblichen Personen immer noch etwas häufiger als bei den männlichen.

Noch größere Verschiedenheiten treten bei den in Tabelle 2 b aufgeführten 160 einzelnen Todesursachen hervor. Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre sowie im Jahr 1900 kommt nahezu die Hälfte aller Gestorbenen (48 %) auf folgende 6: Lungenschwindsucht, Eklampsie der Kinder, Lungenentzündung, Altersschwäche, Kinderdurchfall und Lebensschwäche der Neugeborenen. Die nachstehenden 41 Ursachen, auf die zusammen 91,91 % aller Sterbefälle entfallen, fordern jährlich im Durchschnitt 100 und mehr Gestorbene, davon 4 mehr als 3000, weitere 7 mehr als 1000 und fernere 5 mehr als 500.

Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle
89	Lungenschwindsucht	4498	87	Chron. Bronchialkatarrh	614	31 e	Ertrinken	200
77 a	Eklampsie der Kinder	3379	128	Nierenentzündung	530	31 d	Erhängen	189
88	Lungenentzündung	3232	67	Hirnhautentzündung	472	94	Brustfellentzündung	175
39	Altersschwäche	3199	8	Grippe	462	123	Chron. Leberatrophie	174
111	Kinderdurchfall	2249	1	Masern	447	12	Abdominaltyphus	167
32	Lebensschwäche	1923	68	Tuberk. Hirnhautentzdg.	446	35	Englische Krankheit	147
42	Krebs und Geschwülste	1723	91	Lungenemphysem	445	37	Drüsenabzehrung	143
112	Brechdurchfall	1575	47	Wassersucht	409	10	Kindbettfieber	123
71	Gehirnschlag	1223	6	Krupp	397	103	Darmverschluss	121
62	Herzfehler	1193	7	Kenchspulen	392	65	Arterienkrankheiten	120
36	Abzehrung der Kinder	1052	100 a	Unterleibsentzündung	294	31 i	Ueberfahren	118
86	Akute Bronchitis	879	31 k	Sturz und Schlag	264	61	Herzvergrößerung	110
5 a	Diphtheritis	852	58	Knochen- u. Gelenkentzdg.	218	73	Geisteskrankheit	105
64	Herzlähmung	793	93	Lungenlähmung	206			

II. Die Erkrankungen an Infektionskrankheiten.

An den sechs Infektionskrankheiten, über welche regelmäßig Anzeige zu erstatten ist, erkrankten nach Tabelle 3 (Seite 84/92) im Berichtsjahre 7422 Personen, und zwar an Diphtherie 3744, Scharlach 1745, Typhus 919, Kindbettfieber 445, Krupp 562, Blattern 7. Von diesen Erkrankten starben an Diphtherie 344, Scharlach 71, Typhus 167, Kindbettfieber 135, Krupp 192, Blattern 1, oder vom Hundert der Erkrankten an Diphtherie 9,2, Scharlach 4,1, Typhus 18,2, Kindbettfieber 30,3, Krupp 34,2, Blattern 14,3. Die Zahl der angemeldeten Erkrankungen an Scharlach, Diphtheritis und Krupp ist 1900 größer, die der Typhus- und Kindbettfieberfälle geringer als im Vorjahr; die Typhus- und Diphtherie-Erkrankungen des Berichtsjahrs bleiben auch hinter dem Durchschnitt des letzten Jahrzehnts zurück, während Scharlach und Krupp und leider auch das Kindbettfieber im Jahr 1900 stärker auftraten als im Durchschnitt 1891/1900.

Bezüglich der Bezirke ergab sich Folgendes:

Keine Erkrankungsfälle wurden gemeldet: an Typhus in den Bezirken Engen, Pfullendorf, Stodach und St. Blasien, an Kindbettfieber in Abelsheim, an Scharlach in Pfullendorf, Säckingen und Achern, an Krupp in Neßkirch, Pfullendorf und St. Blasien; dagegen kamen Erkrankungen an Diphtherie in allen Bezirken des Landes vor. Höchste Erkrankungszahlen wurden in folgenden Bezirken bzw. Städten ermittelt: