

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

## **Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

### 11. Keuchhusten

[urn:nbn:de:bsz:31-220833](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220833)

Die Sterblichkeit an der Krankheit hat also 1885 gegen die letzten Jahre zugenommen und eine nicht gewöhnliche Höhe erreicht. (Durchschnitt 1870/79: 494, 1860/69: 338, 1852/59: 330).

10. Scharlach.

An Scharlach starben im letzten Jahrzehnt:

|      |      |      |      |              |     |
|------|------|------|------|--------------|-----|
| 1876 | 842  | 1880 | 1036 | 1884         | 219 |
| 1877 | 1452 | 1881 | 820  | 1885         | 100 |
| 1878 | 1371 | 1882 | 741  |              |     |
| 1879 | 1247 | 1883 | 338  | Durchschnitt | 817 |

(Durchschnitt 1870/79: 1029, 1860/69: 487, 1852/59: 441). Die Sterblichkeit an Scharlach nimmt den tiefsten bekannten Stand ein; ob damit auch der Wendepunkt zu einer zunehmenden Phase eingetreten ist, bleibt abzuwarten.

11. Keuchhusten.

Der Keuchhusten hatte einen tödtlichen Verlauf in

|      |     |      |     |              |     |
|------|-----|------|-----|--------------|-----|
| 1876 | 694 | 1880 | 426 | 1884         | 511 |
| 1877 | 487 | 1881 | 629 | 1885         | 714 |
| 1878 | 621 | 1882 | 555 |              |     |
| 1879 | 529 | 1883 | 300 | Durchschnitt | 547 |

forderte also im Jahre 1885 vergleichsweise viele Opfer. (Durchschnitt 1870/76: 509, 1860/69: 463, 1852/59: 554).

12. Diphtherie (Rachen- und Mandelbräune) und Krup.

Daran starben:

|      | Diphtherie | Krup | Diphtherie | Krup         | Diphtherie | Krup |
|------|------------|------|------------|--------------|------------|------|
| 1876 | 378        | 424  | 1880       | 1014         | 870        | 552  |
| 1877 | 558        | 570  | 1881       | 806          | 839        | 559  |
| 1878 | 650        | 515  | 1882       | 736          | 777        | 517  |
| 1879 | 937        | 594  | 1883       | 372          | 464        |      |
|      |            |      |            | Durchschnitt | 656        | 603  |

Beide Krankheiten hatten im Jahre 1885 einen mäßigen Stand.

Die Krankheiten bei Ziff. 9 bis 12 sind wesentlich Kinderkrankheiten. Sie treffen aber das zarteste Lebensalter bezw. das 1te Lebensjahr in verschiedenem Maße. Im Jahr 1885 starben Untereinjährige an Masern 156 (34,9 % der an Masern Gestorbenen), an Scharlach 16 (16,0 %), an Keuchhusten 403 (56,4 %), an Diphtherie 71 (12,7 %), und an Krup 76 (14,7 %); an Scharlach also absolut und verhältnismäßig am wenigsten, an Keuchhusten am meisten.

13. Typhus.

Dem Typhus erlagen:

|      |     |      |     |              |     |
|------|-----|------|-----|--------------|-----|
| 1876 | 734 | 1880 | 467 | 1883         | 309 |
| 1877 | 625 | 1881 | 402 | 1884         | 306 |
| 1878 | 548 | 1882 | 322 | 1885         | 280 |
| 1879 | 566 |      |     | Durchschnitt | 456 |

während 1870/79: 866, 1860/69: 1134, 1852/59: 1658 daran starben. Die Krankheit ist seit 1871, abgesehen von einigen geringen Schwankungen, in steter Abnahme begriffen und es scheint sich die Annahme, daß es sich nicht um die abnehmende Phase einer Umlaufperiode, sondern um einen Erfolg der Heilkunst und gesündlichen Fürsorge handelt, immer mehr zu bestätigen.

Dies gilt sowohl für die größeren Gemeinden bezw. Städte, als für die kleineren Gemeinden. Wenn früher der Typhus in den letzteren besonders häufig beobachtet wurde (vgl. die Darstellung für 1882), so hat sich in den letzten Jahren im Ganzen eine Ausgleichung zwischen den größeren und kleineren Gemeinden vollzogen. In den Gemeinden mit mehr als 4000 Einw. starben am Typhus 1882: 71 (auf 1000 Einw. 0,20), 1883: 82 (0,25), 1884: 65 (0,20), 1885: 55 (0,15); in den übrigen Gemeinden bezw. 251 (0,20), 227 (0,18), 241 (0,19), 225 (0,18).

14. Ruhr (Dysenterie).

Auch bei dieser Krankheit hält der in den letzten Jahrzehnten eingetretene erhebliche Rückgang an. 1885 lieferte sie nur 19 Todesfälle, während früher jährlich Tausende oder Hunderte daran