

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

10. Scharlach

[urn:nbn:de:bsz:31-220844](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220844)

8. Blattern.

An Blattern starben im J. 1886 nur 2 Personen (im Durchschnitt der J. 1877—86: 3); diese Krankheit hat seit dem feuchenartigen Auftreten in den Kriegsjahren 1870/71 bald nachgelassen und tritt seither nur vereinzelt auf.

9. Masern.

An Masern starben in den letzten 10 Jahren:

1877	1540	1881	324	1885	448
1878	153	1882	444	1886	248
1879	308	1883	164		
1880	212	1884	266	Durchschnitt	411

Die Sterblichkeit an der Krankheit hat also 1886 gegenüber 1885 (448) abgenommen und nimmt im Jahrzehnt, wie im Vergleich zu den früheren Jahrzehnten, ab. (Durchschnitt 1870/79: 494, 1860/69: 338, 1852/59: 330.)

10. Scharlach.

An Scharlach starben im letzten Jahrzehnt:

1877	1452	1881	820	1885	100
1878	1371	1882	741	1886	120
1879	1247	1883	338		
1880	1036	1884	219	Durchschnitt	744

(Durchschnitt 1870/79: 1029, 1860/69: 487, 1852/59: 441). Die Sterblichkeit an Scharlach hat 1886 gegenüber dem Vorjahre etwas zugenommen, ist aber im Vergleich zu weiteren Vorjahren sehr gering gewesen.

11. Keuchhusten.

Der Keuchhusten führte zum Tode in folgender Zahl von Fällen:

1877	487	1881	629	1885	714
1878	621	1882	555	1886	475
1879	529	1883	300		
1880	426	1884	511	Durchschnitt	525

Die Zahl der daran Gestorbenen blieb 1886 hinter dem Durchschnitt zurück, war namentlich erheblich geringer als im Vorjahr. (Durchschnitt 1870/76: 509, 1860/69: 463, 1852/59: 554.)

12. Diphtherie (Rachen- und Mandelbräune) und Krup.

Daran starben:

	Diphtherie		Krup		Diphtherie		Krup	
1877	558	570	1881	806	839	1885	559	517
1878	650	515	1882	736	777	1886	434	385
1879	937	594	1883	372	464			
1880	1014	870	1884	552	462	Durchschnitt	662	599

Beide Krankheiten forderten im Jahre 1886 eine verhältnismäßig geringe Zahl von Opfern. Die Krankheiten bei Ziff. 9 bis 12 sind wesentlich Kinderkrankheiten; das 1te Lebensjahr ist an den Todesfällen in verschiedenem Maße beteiligt. Im Jahr 1886 starben Untereinjährige an Masern 79 (31,9 % der an Masern Gestorbenen), an Scharlach 11 (2,2 %), an Keuchhusten 286 (60,2 %), an Diphtherie 48 (11,1 %), und an Krup 46 (11,9 %); an Scharlach also absolut und verhältnismäßig am wenigsten, an Keuchhusten am meisten.

13. Typhus.

An Typhus starben:

1877	625	1881	402	1884	306
1878	548	1882	322	1885	280
1879	566	1883	309	1886	229
1880	467			Durchschnitt	405

während ihm 1870/79: 866, 1860/69: 1134, 1852/59: 1658 Personen erlagen. Die Todesfälle am Typhus sind seit 1871, abgesehen von einigen geringen Schwankungen, in steter Abnahme begriffen, und es gewinnt die Annahme, daß es sich nicht um die abnehmende Phase einer Umlauf-