

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

10. Scharlach

[urn:nbn:de:bsz:31-220817](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220817)

9. Masern.

An Masern starben im letzten Jahrzehnt:

1875	237	1879	308	1882	444
1876	373	1880	212	1883	164
1877	1540	1881	324	1884	266
1878	153				

Die Krankheit hat also 1884 gegen das vorige Jahr zugenommen, ohne jedoch eine besondere Ausdehnung oder Bösartigkeit zu gewinnen.

10. Scharlach.

Dagegen ist Scharlach 1884 noch weiter zurückgegangen und hat nahezu den tiefsten Stand von 1865 (132) wieder erreicht. Es starben daran:

1875	936	1879	1247	1882	741
1876	842	1880	1036	1883	338
1877	1452	1881	820	1884	219
1878	1371				

im Durchschnitt des Jahrzehnts 900, gegen 1029 im Jahrzehnt 1870/79, 487 im Jahrzehnt 1860/69, 441 in den Jahren 1852/59. Maxima erreichten die Todesfälle an Scharlach in den Jahren 1856, 1863, 1871, 1877; darnach wäre auf einen 7- bis 8jährigen Rundlauf der Krankheit zu schließen und würde nunmehr wieder ein Ansteigen derselben zu erwarten sein.

11. Keuchhusten.

Diese Krankheit verlief tödtlich:

1875	332	1879	529	1882	555
1876	694	1880	426	1883	300
1877	487	1881	629	1884	511 mal;
1878	621				

im zehnjährigen Durchschnitt forderte sie 508, im Durchschnitt der J. 1870/79: 509, 1860/69: 463, 1852/59: 554 Opfer. Die Schwankungen in den Zahlen sind nicht so erheblich wie in denen der an Masern und Scharlach Gestorbenen, auch lassen sie wie die Masern keine bestimmte Periodizität des Steigens und Fallens erkennen. 1884 hatte eine mittlere Zahl von Gestorbenen.

12. Diphtherie und Krup

welche 1880 einen höchsten Stand erreicht hatten, verhalten sich ähnlich; sie tödteten

	Diphtherie	Krup	Diphtherie	Krup	Diphtherie	Krup		
1875	373	429	1879	937	594	1882	736	777
1876	378	424	1880	1014	870	1883	372	464
1877	558	570	1881	806	839	1884	552	462
1878	650	515						

Der Durchschnitt des Jahrzehnts war 638 für Diphtherie, 594 für Krup. Die Häufigkeit der Todesfälle war 1884 für Diphtherie unter und für Krup über dem Durchschnitt.

13. Typhus.

Der Typhus forderte Opfer:

1875	788	1879	566	1882	322
1876	734	1880	467	1883	309
1877	625	1881	402	1884	306
1878	548				

im zehnjährigen Durchschnitt 507, während 1870/79: 866, 1860/69: 1134, 1852/59: 1658 daran starben. Die Krankheit fährt fort gegen früher an Bedeutung zu verlieren; seit 1871 befindet sie sich, abgesehen von einigen geringen Schwankungen, in steter Abnahme. Es scheint sich immer mehr zu bestätigen, daß es sich nicht um die abnehmende Phase einer langen Periode handelt, sondern um den glücklichen Erfolg der Heilkunst und sanitären Fürsorge.

Auch im J. 1884 trifft die Beobachtung früherer Jahre (vgl. die Darstellung für 1882), wonach der Typhus vornehmlich in den kleineren Gemeinden auftrat nicht mehr zu. Es starben daran 1884 in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einw. 65 oder auf 1000 Einw. 0,20, in den übrigen Gemeinden 241 oder auf 1000 Einw. 0,19.