Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Die Bildung der Hochgestade oder Stromterrassen

urn:nbn:de:bsz:31-217954

Visual Library

ger, höchster Punkt, oder die Schwelle des Wasserfalles, nur 23′ tiefer als der Wasserspiegel liegt, wo sich die Alb in den Rhein ergießt; mit jedem Fortschritte in dem Eingrabungsgeschäfte des Stromes in das Gneisripp wurde die Thalsohle über demselben vertieft und die Stromgeschwindigkeit entsprechend vergrößert. Jene Riesentöpfe und Wasserschliffe in verschiedenen Höhen des Gneises dieser Umgebung dürfen wir heute mit den geologischen Pegelzeichen vergleichen, deren Nullpunkt für uns in dem Zustande der gegenwärtigen Verhältnisse der Stromschnelle anzunehmen ist. Höchst wahrscheinlich öffnete sich hier das Rheinthal lange Zeit hindurch enge oder klammartig nach einem weiteren Thalstücke abwärts, verlangsamte die obere Strömung und begünstigte den Absatz von Geröllen in derselben.

Mit der fortschreitenden Hinwegräumung dieses Widerstandes verstärkte sich die Strömung von Periode zu Periode, das Flußbett grub sich darnach in den Thalboden ein und hinterließ so die Hochgestade beiderseitlich dem Strome. In der Bucht zwischen Grunholz und Luttingen setzen sich Thone und feine Erden und in ruhigem, moorigem Flußgrunde jener (Seite 16 genannten) Reste des Urochsen und Mammuthelephanten ab, wir mögen diese Absätze als die Vertreter des Löß für diese Gegend hinnehmen, der sich, obschon er im St. Gallischen Rheinthale schon vorkömmt, mit seinen charakteristischen Conchylien erst unter dem Laufenfalle bei Murg wieder findet.

Die Bildung der Hochgestade oder Stromterrassen, eine allverbreitete Terraingestaltung, erstreckt sich nicht allein auf das Rheinthal, sondern auch in das Kleckgau- und Aarthal, in welch letzterem von Morlot 4—5 terrassenförmig übereinander folgende Gestade beobachtete, ebenso Zollikofer (Beiträge zur Geologie der Lombardei) im Poothale und seinen Seitenthälern des Oglio, der Adda und des Tessin; ein solches bei Tornavento im Tessin erreicht 360′ relative Höhe. Beide Geologen schreiben die Bildung dieser Hochgestade einer gleichförmigen Erhebung des Continentes zu seiner jetzigen Höhe zu, wodurch sich die Flüsse in ihren eigenen Ablagerungen ein tieferes Bett eingegraben haben.

Tulla, der Schöpfer der Rheinrektifikation, ermittelte durch geschickte Aufsuchung der entsprechenden Hochgestade die älteren Rheinläufe; seine Erklärungen über ihre Bildung (Aeußerungen über die in der Großh. Badischen Ständeversammlung im Jahr 1821 vorgekommene Behandlung dieses Gegenstandes) beruhen in der Wirkung der Vertiefung des Durchflusses des Rheines zwischen Biengen und Königswinter auf den oberen Rheinlauf.

Ueber das Verhältniß der großen Uebergletscherungen der Nordschweiz zu unserem Gebiete, welche durch A. Escher's lichtbringende Forschungen (Geolog. Vortrag, gehalten von A. Escher von der Linth in Zürich im März 1852, gedruckt bei E. Kiesling) zu Tage kamen, und neuestens durch Oswald Heer in ihrer Beziehung zu Klima und organischem Leben (Urwelt der Schweiz S. 509—561) zu einer bewunderungswürdigen Lehre erhoben wurden, läßt sich nur so viel mit einiger Bestimmtheit angeben, daß der Rhein- und Linth-Gletscher, welche noch bis Zurzach und an die Anhöhen, südöstlich Thiengen im Kleckgau im Rheinthale und der Reußgletscher bis Klingnau im Aarthale ihr erratisches Steinmaterial vorgeschoben haben, nicht mehr in unser Rheinthal hinabreichten; so schließen wir aus dem Mangel des Vorkommens erratischer, alpiner Gesteine, denn wenn sich solche in dieser Gegend finden, so tragen sie die Wirkung des Transportes durch Strömung an sich und sind daher zugerundet. Der Rhein entsprach aber in jener (und zwar ersten) Eiszeit dem den heutigen Gletschern abfließenden Bach im riesigen Maßstabe, und als die Eismassen abschmolzen, schwoll er zu einem trüben, schlamm- und geröllbeladenen großen Strome an.

Angesichts dieser Lehren über den Bestand der großen Alpengletscher wäre es vermessen, zu behaupten, daß nicht auch der Schwarzwald während der allgemeinen Temperaturerniedrigung zum Theil übergletschert gewesen sein konnte, wie dieß auch Frommherz (in seinen Diluvialgebilden des Schw.-W. S. 98) und Walchner (in seinem Handbuche der Geogn. 2. Auflage S. 642) zugegeben und sodann für die nachbarlichen Vogesen von Renoir, Hogard und Collomb (Preuves de l'existence d'anciens glaciers dans les vallées des Vosges, Paris 1847) begründet dargestellt wurde. Obgleich ich diesen Darstellungen mit den Ergebnissen meiner Beobachtungen über den Bestand eines Wutachgletschers an dem Nordabfall des Haupthöhenkammes (= 4200′) beizutreten im Stande bin, so gelang es mir doch nicht, irgend welche klare Anzeichen einer ehemaligen Uebergletscherung des südlichen Abfalles oder unseres Sectionsgebietes aufzufinden.

Nachdem ich mich im Vorausgegangenen bestrebte, die Thalbildungen des südlichen Schwarzwaldes mit der Bildung des jetzigen hydrographischen Systems zu