

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

**Dissertationem De Coeliaca Passione, Gratiissimae
Facultatis Medicae Indultu**

Kummer, Johann Gabriel

Basileae, 1709

Thesis VIII., IX.

[urn:nbn:de:bsz:31-41461](#)

affectionem hunc inter symptomata recensendum esse, & quoniam haec triplicia habemus, actionis sc. laxæ, qualitatis mutatæ, excretorum atque retentorum, præcipue ad primum, tum etiam tertium illorum, passionem cœliacam referendam esse arbitramur: cum vero omnis actio iterum tripliciter lœdi possit, dicimus hac in affectione secretionem chyli à fæcibus alvinis, vel ejusdem in vasalactea distributionem, vel tantum non aboleri, vel graviter imminui, dum non omnis chylosa portio in vasa lactea recipitur, & propellitur. Neutquam vero omnem chylum cum fæcibus excidere, sed quoque insignes portiones adhuc dum Massæ sanguineæ (nisi malum gravissimum fuerit) infundi, probant habitus corporis tractu temporis demum consumi incipiens, vires ad deambulandum aliasque actiones perficiendas aliquandiu sufficienes, urina naturali similis, aliaque his affinia. Potest etiam dici symptoma in excretis, quia alvus frequentius, quam par est dejicitur, praeterea tale quid excernitur, quod naturaliter deberet retineri.

THESES VIII.

Symptoma hoc morbum organicum ut plurimum pro matre agnoscit, videlicet obstruktionem ductuum, præprimis bilarii, vel pancreatici, vel glandularum intestinalium, vel coalescentiam heic illic vasorum lacteorum: ab obstruktione supra dictorum ductuum, bilis & lymphæ pancreaticæ in intestinum duodenum influxus necessarius impeditur, siveque separatio utilium ab inutilibus minus ritè procedit: ab obstruktione vero vel coalitione vasorum lacteorum, chylus omnis uti deberet non distribuitur, unde fieri aliter nequit, quin vel materia chylosa fæculenta confusa, vel particula fæcibus alvinis solidiusculis innatantes vel permixta excernantur.

THESES IX.

Ut proin in hac affectione chylum ipsum plus minus substantialiter, sive à fæcibus alvinis solutum & separatum, cum iisdem per alvum excerni firmiter afferam, succum nimirum illum lacteum, qui in materiam & fomentum succi nutriti

ritii pro toto corpore faciliere deberet , ut mirum non sit si ab ejusdem majore defectu facies pallescere , corpus emaciari , viresque labascere soleant , ceu in causarum examine magis patebit.

THESSIS X.

Causas hujus affectus despescimus in proximam & immediatam , & hinc in remotiorem seu antecedentem & proctarcticas . Causa immediata chyli à facultibus alvinis secretioris lascæ & hinc cœliacæ passionis proxima , est in primis chyli , imò & bilis viscositas & inertia aut etiam lymphæ pancreaticæ & intestinalis , vel eorundem influxus in intestina tenuia præpeditus , ob mucaginem viscidam , vel glandularum poros , vel etiam dictorum ductuum orificia obturantem : distributionis verò chyli sufflaminata causa proxima , vel in obstructione orificiorum vasculorum lacteorum , à materiâ tenaci , vel eorundem coalitione post præviam exulcerationem quærenda est : in primis autem magna est supra dictorum in intestinum tenue humorum affluentium utilitas , ut pote à quibus alimenta , inventriculo soluta magis diluntur , & ab eorundem particulis activis continuatâ intestinâ agitatione magis subiguntur , & præcipue particulae chylosæ dulces & oleosæ interventu bilis blandè volatilis & oleosæ cum aqueis & terrestribus , legitimè combinantur ; unde hac actione præpeditâ ac fatiscente , neque particulis homogeneis ab heterogeneis , uti decet secretis , ab istarum acri moniâ fibræ intestinales facile vellicantur , & inde fluxui huic janua aperitur : ubi verò vasculum unum alterumve vel obstructum est , vel coaluit , etiam si sanguinentæ invicem continentur & consistentiam aliquam nanciscantur , chyli tamen particulæ , dicta orificiola præter labentes , iisdem in natare ac misceri , & cum illis excerni posse evidens est.

THESSIS XI.

Inter causas antecedentes numeranda est , partim Humoralis Massæ discrasia acido-viscida , ob quam particulae seroso-viscidæ in sanguine cumulantur & copiosè ad supra dictas glandulosas partes ablegantur , hepar nempe , pancreas & in testinales glandulas : partim etiam morbi præcedanei , uti