

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

**Dissertationem De Coeliaca Passione, Gratiissimae
Facultatis Medicae Indultu**

Kummer, Johann Gabriel

Basileae, 1709

Thesis X., XI.

[urn:nbn:de:bsz:31-41461](#)

ritii pro toto corpore faciliere deberet , ut mirum non sit si ab ejusdem majore defectu facies pallescere , corpus emaciari , viresque labascere soleant , ceu in causarum examine magis patebit.

THESSIS X.

Causas hujus affectus despescimus in proximam & immediatam , & hinc in remotiorem seu antecedentem & proctarcticas . Causa immediata chyli à facultibus alvinis secretioris lascæ & hinc cœliacæ passionis proxima , est in primis chyli , imò & bilis viscositas & inertia aut etiam lymphæ pancreaticæ & intestinalis , vel eorundem influxus in intestina tenuia præpeditus , ob mucaginem viscidam , vel glandularum poros , vel etiam dictorum ductuum orificia obturantem : distributionis verò chyli sufflaminata causa proxima , vel in obstructione orificiorum vasculorum lacteorum , à materiâ tenaci , vel eorundem coalitione post præviam exulcerationem quærenda est : in primis autem magna est supra dictorum in intestinum tenue humorum affluentium utilitas , ut pote à quibus alimenta , inventriculo soluta magis diluntur , & ab eorundem particulis activis continuatâ intestinâ agitatione magis subiguntur , & præcipue particulae chylosæ dulces & oleosæ interventu bilis blandè volatilis & oleosæ cum aqueis & terrestribus , legitimè combinantur ; unde hac actione præpeditâ ac fatiscente , neque particulis homogeneis ab heterogeneis , uti decet secretis , ab istarum acri moniâ fibræ intestinales facile vellicantur , & inde fluxui huic janua aperitur : ubi verò vasculum unum alterumve vel obstructum est , vel coaluit , etiam si sanguinentæ invicem continentur & consistentiam aliquam nanciscantur , chyli tamen particulæ , dicta orificiola præter labentes , iisdem in natare ac misceri , & cum illis excerni posse evidens est.

THESSIS XI.

Inter causas antecedentes numeranda est , partim Humoralis Massæ discrasia acido-viscida , ob quam particulae seroso-viscidæ in sanguine cumulantur & copiosè ad supra dictas glandulosas partes ablegantur , hepar nempe , pancreas & in testinales glandulas : partim etiam morbi præcedanei , uti

uti pertinax icterus , interdum disenteria aut ulcus intestini tenuis , consolidatum quidem , sed ita , ut à cicatrice induc̄ta , plura vascula oblitterentur & coalescant . In ictericis res evidens est , ductus extremitate vel mucagine viscidâ obducta , vel bile viscidâ , in ipso ductu moram gerente , & cum particulis suis salino-terrestribus in calculos non raro concrecente : post dysenteriam verò exquisitam & diuturnam , vasorum ejusmodi coalescentiam vel obliterationem subsecutam fuisse , cum chyloso ejusmodi fluxu , experientia sèpius comprobavit.

T H E S I S XII.

Inter causas procatarcticas , omnia ea recenseri merentur , quæ mucaginem viscidam in Massâ Humorali adaugeare , bilem in ertem reddere , vel ejus , simulque pancreatici succi & lymphæ intestinalis excretionem , in intestinum tenui sufflammare possunt : qualia sunt aér nebulosus , crassus , frigidior , cibi frigi , humidi , viscidii , duri , flatulentii , facile corruptibiles , difficilis concoctionis e. gr. citrulli , cucumeres , melones , poma , pyra , pruna cruda comesta , item caro vetusta , salsa , fumo indurata , pisces , ostreæ , cochleæ , ova frixa , pasta farinacea , acetaria , laeticinia , caseus , nimis pinguis , &c. Cujusmodi cibi omnes , quatenus vel mox corrumpuntur , vel ad crassorum viscidorumque humorum generationem multum faciunt huic affectui ansam præbere possunt. Neque hic silentio prætereundum censemus Saccharum & Saccharata omnia , utpote quæ ad generandos in corpore nostro humores viscidos sunt aptissima ; hinc etiam est quod in Anglia Rachitis tam sit familiaris , ob solum sacchari abusum , omnibus enim pultibus magnam sacchari quantitatem immiscere solent. A frigidæ copiosâ potatione affectum hunc illico produci testatur Aretæus de morbis diuturnis libr. 2. c. 7. item à carnis suilla & vervecina pinguioris esu largiore , & superingesto potu frigidiore , passionem hanc subsecutam esse , observavit Clariss. Mæbius in Epist. Institut. Medicinal. libr. 2. p. 3. c. 5. p. 188. Suprademus hic recensere , quæcunque huic malo pabulum subministrare possunt ex causis non naturalibus , uti otium , vitam sedentariam , nimium somnum , mœstitudinem