

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

**Dissertationem De Coeliaca Passione, Gratioussimae
Facultatis Medicae Indultu**

Kummer, Johann Gabriel

Basileae, 1709

Thesis XIII., XIV., XV.

[urn:nbn:de:bsz:31-41461](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-41461)

fitiam, curas & sollicitudines, item potum paucum, mustum recens, vinum minus probè defœcatum, potum aquæ paludosum, spirituum ardentium crebram ingurgitationem.

T H E S I S XIII.

Affectus nostri differentias quod concernit, desumimus eas vel à genere, ratione cujus vel multum vel parum chyli, cum alvinis sacibus dejicitur. Vel à materiâ quæ excernitur, & est chylus nunc simplex, nunc mistus vel alio modo se habens, Vel à causis, quæ nunc radicata est, ceu supra innuimus, nunc mitior, uti cum, ex ingestione nimia fructuum horariorum malum hoc subito infestat. Vel à duratione, cum alia diu, alia brevi temporis spatio affligit.

T H E S I S XIV.

Signa diagnostica coeliacæ passionis, sequentia sunt: tales appetitu fruuntur, more sanorum, in primis ab initio morbi, & nisi Ventriculus per *συνπάθειαν* sit coaffectus, de die ter vel quater dejiciunt, excreta nunc pultacea sunt, nunc magis solidiuscula, nunc cinericei nunc gryseicoloris, vel albicantia aut etiam confusa, quandoque faeces solidæ sunt, sed chyli particulis hic illic innatantibus perspersæ progressu temporis virium sentitur jactura, vertigo, corporis emaciatio, inde pallidi redduntur, & imbecilles, neque munera sua peragere possunt, sicuti robusti, & sani solent, ob succi alimentaris & hinc etiam spirituum defectum ingravescentem.

T H E S I S XV.

Signa causarum, utrum ab assumtis seu alimentis seu medicamentis hic affectus fuerit productus, aut num alius morbus præcesserit nec ne? partim ab ægro, partim ab iis qui præsto sunt sciscitari oportet. Utrum autem à distributione chyli in vasa lactea læsa, & hinc obstructione vel occlusionem totali vasculorum lacteorum aliquot, an vero à secretionem chyli à materiâ sæculentâ læsâ malum procedat, inde dignoscimus: in posteriori casu excrementa pul-

B

tacea

tacea magis sunt & indigesta, ob bilis & lymphæ pancreaticæ atque intestinalis inertiam; sin autem obstructions in pancreate vel intestinalibus glandulis non veniunt accusandæ, sed solius bilis defectus, grysea magis sunt vel albicantia, usque tamen consistentiam aliquam habent: in priori verò casu, ubi vasculorum lacteorum obstructio vel coalitio in causâ præcipuè est, neque coloris quem fæces habere debent, neque etiam consistentiæ ratione, multum desiderari potest, sed solæ chylosæ guttulæ superficiem ipsarum comitantes chyli perfectam distributionem sufflammatam esse demonstrant.

T H E S I S X V I .

Signa, quibus à cognatis affectibus differt, quod concernit, differt symptoma hoc i. à Lienteriâ, quod in hac assumta non mutata, sed cruda & prout erant ingesta, protenus per alvum excernuntur 2. à Diarrhœâ proprie sic dictâ, quod in hac omnis generis humores, præter alimentum & sanguinem, sine præviâ exulceratione tamen intestinorum deiciuntur 3. à Fluxu Hepatico, quod in isto sanguis loturæ carniû similis, plus minus aquosus, per anum frequenter excernitur.

T H E S I S X V I I .

Prognosis quod attinet, dicimus affectum hunc, non prorsus contemnendum esse, inprimis in pertinaci dictarum partium obstructione, cum enim chyli secretio & anadosis, tum pro Massa Humoralis in suâ dulcedine conservatione, tum pro corporis nutritione, & etiam fluidi animalis restauratione necessaria sit, satis utique patescit, ni affectus hic tempestivè curetur, humores fatiscere spiritus absorberi, totumque corpus lentâ tabe consumi necesse habere. Appetitus integer, sitis absentia, urina naturali similis, somnus placidus, atrophiam nondum summa, & virium robur nondum pessundatum, utcumque morbus diuturnior fuerit, felicem tamen successum spondent, ritè adhibitis congruis medicamentis & diætâ. Alvi fluxus chylosus,