

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

IX. Verzeichniß derjenigen Pflanzen, welche im Churfürstl. Orangen-Garten zu Dresden vom J 1795 bis 1796. bei dem Hofgärtner Hrn. Seidel zum ersten Male geblühet haben

[urn:nbn:de:bsz:31-190074](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-190074)

IX.

Verzeichniß dererjenigen Pflanzen,
welche im Churfürstl. Orangen-
Garten zu Dresden vom J. 1795
bis 1796. bei dem Hofgärtner
Hrn. Seidel zum ersten Male
geblühet haben.

Adelia acitodon. L. Die hier befindliche
Pflanze ist bloß weiblich. Die zarten schlans-
ken Aeste sind mit ansehnlichen Dornen bes-
etzt. Man vermehret sie am besten durch
Eenfer.

Ailanthus glandulosa. Ait. Ein ansehnlicher,
über 24 Schuh hoher Baum, welcher sich
unsern Pflanzungen theils durch sein schö-
nes Ansehen, theils aber auch vorzüglich
durch seine Härte, mit welcher er in unsern

Wintern ausdaueret, empfiehlt. Er wächst schnell und vermehrt sich durch seine Wurzelschossen sehr reichlich. Die weiblichen Befruchtungstheile sind von ganz besonderer Bildung.

Alluca abyssinica. Jacq. Eine im Frühjahr 1795 aus Saamen gezogene Pflanze, blühte bereits im Winter 1796.

Alyssum sinuatum. L. blühte den ganzen vergangenen Winter durch im freien Lande.

Angelica lucida. L.

Antirrhinum cirrhosum. L.

Antholyza aethiopica. L.

Anthyllis cytisoides. L.

Aquilegia sibirica.

Arctotis dentata.

Aristolelia Macqui. L'Herit.

Calca aspera. Jacq.

Calendula stellata. Cav.

— *tragus*. Ait.

Capsicum baccatum. L.

— *sinense*. Jacq.

Cardamine trifolia. L.

Ist ein niedliches Straubengewächs aus der
Classe der Schoten tragenden Pflanzen.

Cassia nictitans. L.

Centaurea ferox. Thunb.

Unter diesem Namen habe ich eine schöne
den Winter im Freien ausdauernde Pflanze
erhalten.

Conyza incisa. Ait.

Convolvulus canariensis. L.

— *Boerhavii.* L.

Corylus colurna. L.

Crotalaria laburnifolia. L.

— *canescens.* L. fil.

Croton glandulosum. L.

Cyrtanthus angustifolius. Ait.

Oder das ehemalige *Crinum angustifolium*

Linnaei. L.

Elsholzia cristata. Willden.

Erica caffra. L.

— *nitida.* L.

— *strigosa.* Ait.

Erica ureeolaris. Ait.

Erysimum austriacum.

Garidella nigellastrum. L.

Ist ein sehr schönes Sommergewächs, dessen kleine anfangs unansehnliche Blümchen, bei einer mäßigen Vergrößerung, dem Auge einen angenehmen Anblick verursachen.

Glaux maritima. L.

Gnaphalium grandiflorum. L.

Diese Pflanze hat ein besonderes Ansehen; sie ist gänzlich mit einer dichten und dicken Wolle dergestalt besetzt, daß man, nach dem bloßen Gefühl zu urtheilen, keine Pflanze in der Hand zu haben glaubt. — Sie scheint auch eine andere als die gewöhnliche Behandlung der Arten dieser Gattung vom Vorgebirge der guten Hoffnung zu erfordern; denn hält man sie nicht in einer gemäßigten Wärme und bei hiulänglichem Genuß der freien Luft, so wird man sie weder so ganz in ihrer Schönheit sehen, noch zur Flor bringen, indes die andern Arten weniger zärtlich und empfindlich für die Witte- rung sind.

Gom-

Gomphrena brasiliensis. L.

Da schon der gemeine jährige Kugel-Amaranth eine beliebte Gartenblume ist, so verdient gegenwärtiger krauchartige noch mehr Aufmerksamkeit. Er blüht das ganze Jahr ununterbrochen fort, und vermehret sich sehr leicht durch Saamen. Man hat ihn, so viel ich weiß, bis ist nur mit weißen Blumen; ich glaube aber, daß er bei mehrerer Cultur eben die Mannichfaltigkeit der Farben darbieten wird, als der gemeine Kugel-Amaranth.

Hemimeris coccinea.

Schönheit der Blumen sowohl, als leichte Unterhaltung im Orangerhause, empfehlen diese Pflanze allen Liebhabern. Sie vermehret sich sehr gut durch Stecklinge.

Hermannia albicans. Ait.

— *altheifolia.* L.

— *hirsuta.*

— *odora.*

— *scabra.* Cav.

— *salvifolia.*

Her-

Hermannia disticha.

Hortensia mutabilis.

Dieser schöne, niedrige, bis jetzt noch ziemlich seltene Strauch, verdient mit Recht den ihm beigelegten Namen der japanischen Rose; denn an seinem großen ansehnlichen Blumenbüschel, welcher beinahe die ganze Pflanze bedeckt, gehen die geschlechtlosen größern Blumen, nachdem sie bereits ausgeblühet sind, aus dem Grünen durchs Weiße, bis ins angenehmste Rosenroth über; und erst nach dieser Entwicklung der geschlechtlosen Blumen, fangen die fruchtbaren ihre Flor an: folglich dauert die Blüte dieses Strauchs sehr lang, wodurch die Pflanze eine außerordentliche Zierde erhält. Er läßt sich sowohl durch Stecklinge als durch Ableger sehr gut vermehren.

Justicia foliosa.

Diese Pflanze ist eine der schönsten Arten dieser Gattung. Die großen Blumen sind von einem sehr angenehmen Blau. Sie verträgt nicht viel Wärme.

Justicia

Justicia nasuta. L.

Hat in ihren Blumen viel Aehnlichkeit mit
Justicia ecbolium.

Lantana involucrata. L.

Manulea tomentosa. L.

Mimosa suaveolens. Smith.

Nach dem äußern Ansehen würde man diese
Pflanze eher für einen *Taxus*, als für eine
Mimosa halten, denn die einfachen Blätter
haben eine auffallende Aehnlichkeit mit den
Blättern des *Taxus elongatus* Aiton.
Ihr ruthenförmiger Stengel erreicht eine
beträchtliche Höhe, und ist nach oben zuganz
mit Blumen bedeckt.

Oenothera grandiflora. Ait.

— *odorata.*

— *parviflora.* L.

— *sinuata.* L.

— *rosea.*

Unter diesen allen empfiehlt sich *Oenothera*
odorata wegen ihrer großen vortheilhaften
Blumen, und wegen ihrer seidenartigen, weiß-
lichen, mit dem schönsten Roth gezierter Be-
kleidung

Hebung der Blätter und Stengel vorzüglich. Ich habe sie im Glashause überwintert, wo sie ununterbrochen blühet. Bis jetzt scheint sie mir immer noch ein Strauch zu seyn; doch ist es möglich, daß sie zweijährig ist.

Ornithogalum caudatum; *longibracteatum*.
Jacq.

Palava malvaefolia. Cav.

Passerina filiformis. L.

Pelargonium trifolium.

Verdiente vielmehr den Namen *trilobum*, denn die Blätter sind bloß dreilappig.

— *tomentosum*.

Philadelphus thea. Ait.

— *scoparia linifolia*.

— — — *myrtifolia*.

Diese Pflanzen verdienen doch immer noch mehr zur Gattung *Melaleuca*, als zu dieser gerechnet zu werden, falls sie nicht ein eigenes Geschlecht ausmachen sollen.

Phyllica eriophora. Ait.

— *paniculata*. L.

Pit.

Pitcairnia bromeliaefolia. L'Herit.

Polygonum sinense. L.

— *emarginatum.*

Protea conifera. L.

Rosa semperflorens.

Es wäre überflüssig, noch etwas zum Lob
dieser Pflanze hinzuzuthun, da sie schon den
Beifall aller Pflanzenliebhaber, als die vor-
züglichste dieser Gattung, erhalten hat.

Salsola rosacea.

Sida atrosanguinea. Jacq.

— *indica.* L.

— *triloba.*

Sie hat, was bei dieser Gattung selten
vorkommt, weiße Blumen.

— *urens.* Cav.

Spermaoceo verticillata. L.

Struthiola virgata. L.

Ihre lange Flor ist vorzüglich merkwürdig;
und ihr sonderbares Ansehen giebt ihr eine
vorzügliche Stelle unter unsern afrikanischen
Pflanzen-Sammlungen.

Thymus

Thymus zygis. L.

Trichosanthes anguina. L.

Ihre schneeweißen großen Blumen sind mit
feinen astigen, sehr langen Fäden eingefast,
welche dem gefallenen Reif gleichen.

Volkameria inermis. L.

Waltheria americana. L.

Zinnia verticillata.

Zygophyllum foetidum.

— sessilifolium. L.

Thymus

X.