

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

X. Verzeichniß von holzartigen Pflanzen, oder Bäumen und Sträuchern,
welche nebst mehrern andern Gattungen im Jahre 1795 bei dem Hrn.
Hofcommissar Börner in Dresden geblühet haben

[urn:nbn:de:bsz:31-190074](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-190074)

X.

Verzeichniß von holzartigen Pflanzen, oder Bäumen und Sträuchern, welche nebst mehrern andern Gattungen im Jahre 1795 bei dem Hrn. Hofcommissar Börner in Dresden geblühet haben.

I. Im freien Lande.

- A**cer monspessulanum. Linn.
 — montanum. Ait.
 — virginicum. † *)

Acer

*) Das beigefügte Zeichen bemerkt solche Pflanzen, wozu der Hr. H. C. Börner in den botanischen Schriftstellern keine passende Beschreibung gefunden zu haben geglaubt, und die er folglich selbst benannt hat. Vermuthlich

Acer dauricum. †

— italicum. †

— rubrum. L.

— asiaticum. †

— opalus. Miller.

— orientale. †

— dissectum. L.

— japonicum. L.

— pictum. L.

— nobile. L.

— palmatum. L.

— lanatum. †

— tomentosum. †

— indicum. †

— saccharinum. L.

— pulcherrimum. †

— sanguineum. †

Aesculus pavia. L.

— flava. Ait.

Amyris

lich wird er sich in seinem versprochenen großen
Horn Catalog darüber zu rechtfertigen suchen,
welches um so nöthiger seyn dürfte, da er
wahrscheinlich mit den Botanikern darüber zu
rechten haben wird.

H. d. G.

- Amyris elemifera. L.
 — toxifera. L.
 Andromeda racemosa. L.
 — calyculata. L.
 — rupestris. L.
 — japonica. L.
 — bryantha. L.
 — dabocia. L.
 — stelleriana. Pallas.
 — indica. †
 — anastomosans. L.
 — cerea. L.
 — paniculata. L.
 — plumaria. Marshall.
 Arbutus uva ursi. L.
 — acadensis. L.
 — alpina. L.
 — mucronata. L.
 Aristolochia anguicida. L.
 — odoratissima. L.
 Atragene alpina. L.
 — zeylanica. L.
 — capensis. L.

Atragene

Atragene tenuifolia. L.
 Diese sich windenden und schönblühenden Pflanzen, welche von den Waldreben (*Clematis*) viel ähnliches haben, sind zur Zeit wenig bekannt.

Azalea nudiflora. L.
 — *viscosa*. L.
 — *procumbens*. L.
 — *indica*. L.
 — *pontica*. L.
 — *lapponica*. L.
 — *punctata*. Loureiro.
 — *tomentosa*. †
 — *glauca*. †
 Sämmtliche Arten tragen herrliche und wohlriechende Blumen.

Berberis cretica. L.
 — *ilicifolia*. L.
 — *sibirica*. L.
 — *canadensis*. Miller.
 — *arborea*. †

Dieser Baum ist außerordentlich selten. Er erregt durch seine langen gelben Blumen und

und durch seine rothen Fruchttrauben mit
 Recht Bewunderung. Er stammt aus dem
 Orient; und ich habe ihn aus dem Königl.
 Garten in Paris erhalten.

Betula chinensis. †

Ist die wahre chinesische Papierbirke, welche
 von allen übrigen sehr abweicht. Sie hat
 folia subtus glauca.

— quebecensis. v. Burgsdorf.

Ebenfalls eine überaus schöne Birke.

— saccharina. †

— fruticosa. Pallas.

— angulata. †

— montana. †

— rugosa. Du Roi.

— nivea †

— indica. †

— palmata. †

— tomentosa. †

Bunelia pentagona. Swarz. †

— montana. Swarz.

— rotundifolia. Swarz.

Calycanthus floridus. L.

—

Calyc-

Galycanthus praecox. L. Diese gewürzhaften Pflanzen verdienen in jeder Sammlung zu seyn.

Cassine peragua. L.

Ceanothus americanus. L.

Celastrus bullatus. L.

Celtis australis. L.

— *occidentalis*. L.

— *orientalis*. L.

— *indica*. †

— *daurica*. †

Chionanthus zeylanica. L.

— *virginica*. L.

Clematis crispa. L.

— *maritima*. L.

— *sibirica*. †

— *ochroleuca* Ait.

— *cirrhusa*. L.

— *virginiana*. L.

— *indica*. †

— *australis*. †

— *japonica*. L.

— *florida*. L.

- Clematis hexapetala*. L. —
 — *grandiflora*. † —
 — *viorna*. L. —
 — *italica*. † —
Cornus sempervirens. † —
 — *alternifolia*. L. —
 — *pumila*. † —
 — *tatarica*. † —
Corylus colurna. L. —
 — *byzantina*. † —
 — *orientalis*. —
 — *americana*. † —
Crataegus azarolus. L. —
 — *aronia*. c. *Azarolus*. b. Lin. —
 — *indica*. L. —
 — *orientalis*. † —
 — *virginiana*. † —
 — *plena*. † —
 — *horrida*. † —
 — *caroliniana*. † —
 — *sanguinea*. Pallas. —
 — *pulcherrima*. † —
 — *maura*. L. —

- Crataegus villosa*. L.
 — *laevis*. L.
 — *glabra*. L.
 — *viridis*. L.
 — *alpina*. †
 — *gallica*. †
 — *superba*. †
 — *punctata*. L.
 — *bibas*. Loureiro.
 — *sinica*. †
 — *cochinchinensis*. †
Cupressus thyoides.
Cytisus capitatus. L.
 — *argenteus*. L.
Daphne cneorum. L.
 — *indica*. L.
Dioscorea villosa. L.
Dirca palustris. L.
Evonymus americanus. L.
 — *colpoon*. L. Mart.
 — *japanicus*. L.
Fothergilla gardeni. L.
Gualtheria procumbens. L.

- Halesia tetraptera*. L.
 — diptera. L.
Hamamelis virginica. L.
Hibiscus indicus. †
 — simplex. L.
 — cochinchinensis. † †
 — europaeus. †
 — syriacus. L.
Hlex canadensis. †
 — echinata. Miller.
 — cuneifolia. L.
 — cassine. L.
 — asiatica. L.
 — emarginata. L.
 — serrata. L.
 — japonica. L.
Itea virginica. L.
 — cyrilla. Swarz.
Juglans alba. L.
 — cinerea. L.
 — baccata. L.
 — saccharina. †
 — illinoensis. v. Wangerheim.

- Juglans catappa*. Lourcira.
 — *camirium*. Lourcira.
Juniperus daurica. Jacq.
 — *lycina*. L.
 — *phoenicea*.
 — *indica*. † †
 — *oxycedrus*. L. †
 — *thurifera*. L.
 — *sibirica*. †
 — *bermudiana*. Willd.
 — *lusitanica*. Miller.
 — *orientalis*. †
 — *chinensis*. L.
 — *hispanica*. Miller.

Juniperus indica und *chinensis* sind die
 schönsten Arten und geben prächtige Blü-
 men.

Kalmia latifolia. L.

- *angustifolia*. L.
 — *polifolia*. †
 — *hirsuta*. †
 — *glauca*.

Kalmia

Kalmia pulcherrima. †

An dieser ganzen Gattung sieht man die
prachtvollsten Blumen.

Ligustrum latifolium. L.

— *sinense*. Loureiro.

Lonicera corymbosa. L.

— *bubalina*. L.

— *pyrenaica*. L.

— *coerulea*. L.

— *pulchra*. †

— *grata*. Ait.

— *implexa*. Ait.

Menispermum virginicum. L.

Mespilus chamaemespilus. L.

— *rotundifolia*. †

— *orientalis*. Miller.

— *nigra*. †

— *virginiana*. †

— *australis*. †

— *hybrida*. *Pyrus hybrida* Mönch.

— *xanthocarpus*. L. suppl.

— *phaenopyrum*. L. suppl.

— *cordata*. †

Mespilus

Mespilus spinosissima. †

— *horrida*. †

— *flexispina*. Mönch.

Michelia champaca. L.

Dieser majestätische Baum verdienet den besten Platz in jeder Sammlung. Loureiro vereinigt mit diesem des Linn. zweite Art: *Michelia thiepaca*, und scheint Recht zu haben.

Mitchella repens. L.

Morus indica. L.

— *brasiliانا*. †

— *tatarica*. L.

— *rubra*. L.

— *mauritanica*. Jacq.

— *pensylvanica*. †

— *tinctoria*. L.

Pinus chinensis. †

— *sibirica*. †

— *borealis*. †

— *tatarica*. Miller.

Ist eine der schönsten Kiefern mit blauen Blättern oder Nadeln, und kleinen Zapfen.

Pinus

- Pinus orientalis*. L.
 — *acutissima*. v. Münchhausen.
 — *heterophylla*. †
 — *olympica*. †
 — *pyrenaica*. †
 — *inops*. Ait.
 — *resinosa*. Ait.
 — *alopeuroidea*. Ait.

Diese Kiefer ist noch selten. Außer ihrer
 besondern Schönheit hat sie die Eigenthüm-
 lichkeit, daß sie vor allen andern sehr zeit-
 lig neue Schosse treibt.

- *coerulea*. †
 — *nigra*. †
Prinos montana. Swarz.
 — *virginiana*. †
 — *sideroxyloides*. Swarz.
Prunus canadensis L.
 — *occidentalis*. Swarz.
 — *elliptica*. L.
 — *paniculata*. L.
 — *aspera*. L.
 — *glandulosa*. L.

Prunus

- Prunus japonica. L.
 — nana. †
 — pensylvanica. L.
 — caroliniana. †
 — minor. †
 — pumila. L.
 — chamaecerasus. Jacq.
 — chinensis. †
 — montana. }
 — declinata. }
 — maritima. } Marshal
 — missisipi. }
 — americana. }
 — angustifolia. }
 — nigra. †
 — incisa. L.
 — tomentosa. L.
 — setacea. †
 Pyrus coronaria. L.
 — chinensis. †
 — sibirica. †
 — japonica. L.
 — sempervirens. †

Pyrus

- Pyrus rubra. †
 — nigra. †
 — tatarica. †
 — nivalis. L.
 — syriaca. †
 — australis. †
 — glaciata. †
 — dioica, Mönch.

Quercus discolor. Ait.

Ist schon deswegen eine der angenehmsten
 Eichen, weil sogar kleine schwache Stamm-
 noch, 8 bis 12 Zoll hoch, alle Jahre häufig
 und schön blühen, auch kleine Früchte brin-
 gen. Ihre Blumentrauben sind überaus
 lang, und die längsten unter allen Arten
 dieser Gattung.

- Rhamnus alpinus. L.
 — saxatilis. L.
 — infectorius. L.
 — spina christi. L.
 — paliurus. L.

Rhododendron maximum. L.

Rhododendron ponticum. L.
 Rhodo-

Rhododendron caucasicum, Pallas. caucasicum

— camtschaticum, Pallas. camtschaticum

— gibraltaricum, † gibraltaricum

— hirsutum, L. hirsutum

— chamaecistus, L. chamaecistus

— ferrugineum, L. ferrugineum

— chrysanthum, L. chrysanthum

— dauricum, L. dauricum

— sibiricum, † sibiricum

Alle diese Arten tragen herrliche und große
 intheils wohlriechende Blumen. Rhodod.
 maximum und caucasicum verdienen von
 Meisten genauer untersucht zu werden; denn
 ihre jungen Blätter sind sehr klebrig, drü-
 sigen, balsamisch und wohlriechend.

Rhus vernix, L. vernix

— succedaneum, L. succedaneum

— copallinum, L. copallinum

— semialatum, L. semialatum

— elegans, Ait. elegans

— aromaticum, Ait. aromaticum

Ribes petraeum, L. petraeum

Übertrifft mit seinen purpurfarbenen schö-
 nen Blumentrauben alle übrige Arten dieser
 Gat-

tung. Diese wenig bekannte Pflanze hat
Jacquin in seinen Observationen überaus
deutlich und richtig beschrieben.

- Ribes glandulosum. Ait. —
 — cynosbati. L. —
 — oxyacanthoides. L. —
 — americanum. † —
 — floridum. Ait. —
 Robinia spinosa. L. —
 — frutescens. L. —
 Rosa blanda. Ait. —
 — multiflora. L. —
 — rugosa. L. —
 — indica. L. —
 — marmorea. † —
 — nivea. † —
 — sibirica. —
 — pulcherrima. † —
 — semperflorens. † —
 — picta. † —
 — arborea. † —
 — pensylvanica. † —
 — palustris. Marshal.

Rosa

- Rosa cochinchinensis. Lour. —
 — nankinensis. Lour. —
 — japonica. Thunb. —
 — mutabilis. Thunb. —
 — alba. L. —
 — daurica. Pallas. —
 — caucasica. Pallas. —
 — parvifolia. Pallas. —
 — batavica. L. —
 — guianensis. Aublet. —
 — collina. L. —
 — palaestina. L. —
 — arabica. L. —
 — africana. L. —
 — aegyptiaca. L. —
 — fragrantissima. L. —
 — corymbosa. L. —
 — nigra. L. —
 Rubus hispidus. L. —
 — canadensis. L. —
 — elegantissimus. L. —

Diese Art liefert die größten Blumen
 und Fruchttrauben. Die Blumeblätter
 sind

sind roth, die Beeren schwarz, groß und
 essbar.

- Salix hastata. L. —
 — aegyptiaca. L. —
 — phyllicifolia. L. —
 — hermaphroditica. L. —
 — lanata. L. —
 — lapponum. —
 — glauca. L. —
 — retusa. L. —
 — herbacea. L. —
 — reticulata. L. —
 — berberifolia. Pallas. —
 — argentea. † —
 — arabica. † —
 — laurifolia. † —
 — heptandra. † —
 — gloriosa. † —
 — japonica. L. —
 — integra. L. —
 — orbiculata. Jacquin. —
 — americana. † —
 — nigra. Marshal. —
 — caspica. Pallas. —

Salix

- Salix gmelini. Pallas.
 — rhamnifolia. Pallas.
 — sibirica. Pallas.
 — camtschatica. Pallas.
 — superba. †
 — helvetica. †
 — balsamea. †
 — tristis. Aiton.
 — moschata. †
 — cinerea. L.
 — myrsinites. L.
 — myrtilloides. L.
 — depressa. L. Fl. lapponica
 Sambucus alba. †
 Sideroxylon lycioides. L.
 — decandrum. L.
 — spinosum. L.
 — tenax. L.
 Sloanea dentata. L.
 — emarginata. L.
 Spiraea altaica. Pallas.
 — betulaefolia. Pallas.
 — sorbifolia. Pallas.
 Symplocos

- Symplocos martinicensis*. L.
Syringa chinensis. †
 — *suspensa*. L.
Thuja dolabrata. L.
Vaccinium arctostaphylos. L.
 — *mucronatum*. L.
 — *corymbosum*. L.
 — *frondosum*. L.
 — *ligustrinum*. L.
Viburnum acerifolium. L.
 — *cassinoides*. L.
 — *dentatum*. L.
 — *tomentosum*. L.
 — *dilatatum*. L.
 — *macrophyllum*. L.
Vitis indica. L.
 — *labrusca*. L.
 — *vulpina*. L.
 — *canadensis*. †
 — *virginica*.
 — *assyriensis*. †

Von dieser Art wiegen die Trauben bis
 zwei und zwanzig Pfund, und die Beere
 3 haben

haben die Größe der welschen Nüsse (*Juglans regia*.)

Vitex trifoliata. L.

— *altissima*. L.

Xanthoxyliza apifolia. Marshal.

Xanthoxylum clava Herculis. L.

— *americanum*. Miller.

II. In Töpfen,

die im Winter theils in einem temperirten
Gewächshause, theils in freien tiefen
Kästen gestanden haben.

Alstonia theaformis. L.

— *grandifolia*. †

— *indica*. †

Amygdalus argentea.

— *incana*. Pallas.

— *orientalis*. †

Arbutus unedo. L.

— *laurifolia*. L.

Aspalathus cretica. L.

Trägt sehr schöne gelbe Blumen, und in Menge.

Auca-

- Aucuba japonica*. L.
Bignonia capreolata. L.
 — *unguis cati*. L.
Brabejum stellulifolium. L.
 Ist noch sehr wenig bekannt. Linné selbst
 wurde, weil die Staubfaden und Griffel
 öfters Abänderungen zeigen, vermuthlich
 seiner Mantiss. p. 137 und 332. zufolge,
 in der Bestimmung zweifelhaft. Der Ge-
 ruch dieser Pflanze ist wärzhafte und erquickend.
Buddleja americana. L.
 — *occidentalis*. L.
Buxus balearicus. †
Camellia japonica. L.
 — *sasangua*. L.
Cassine maurocenia. L.
 — *capensis*. L.
 — *barbara*. L. Mant.
Ceanothus africanus. L.
Celastrus pyracanthus. L.
 — *buxifolius*. L.
 — *myrtifolius*. L.
Chrysophyllum microphyllum. Jacquin.
Daphne odora. L.

Decumaria barbara. L.

Die Frucht, welche bisher unbekannt gewesen, hat nun Aiton beschrieben, und, nach meiner Untersuchung, sehr richtig. Sie besteht in einer achtschigen Capsel mit vielem Saamen (*Capsula 8. locularis polysperma*.) Hierdurch wäre nun wieder eine Gattung berichtigt. Wäre doch auch Jemand so glücklich, an dem so sehr nützlichen Ginkgo Blumen zu erzeugen, und dadurch seinen Charakter vollständig zu entwickeln.

Heisteria coccinea. L.

Ist noch sehr unbekannt. Sie blühet bei mir alle Frühjahre.

Ilex caroliniana. †

— *latifolia*. L.

Lycium foetidum. L.

— *rhutenicum*. L.

— *capsulare*. L.

Messerschmidia fruticosa. L.

Diese schöne Pflanze ist eine immerblühende; sie blühet nun seit zwei Jahren ohne Aussetzen bei mir fort. Die Blumen sind grünlichweiß, und formiren große Trauben.

Ne-

- Nerium oleander. L.
 — zeylanicum. L.
 — divaricatum. L.
 — antidysentericum. L.

Phillyrea indica. Loureiro.

Philomis fruticosa L.

Rhamnus thea. L.

- alaternus. L.

Taxus macrophylla L.

Thea bohea. L.

- viridis. L.

Viburnum tinoides. L.

Vitex negundo. L.

- ovata. L.

Beide Gattungen sind selten; sie werden
 zu den schönsten Pflanzen gerechnet.

Xanthoxylum trifoliatum. L.

In Zukunft wird der Herr Hofcommissar auch
 die merkwürdigsten, in der Blüthe gestandenen
 perennirenden krautartigen Pflanzen anzeigen.
 Auch hat er versprochen, zu Michaelis 1796 sein
 neues Baumverzeichnis zu liefern.