

Badische Landesbibliothek Karlsruhe


Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Institutiones mathematicae - Cod. St. Blasien 67

Kircher, Athanasius

Würzburg, 1630


[urn:nbn:de:bsz:31-47556](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-47556)





St. Blarim 67

Klein Kircher









St. Blasien 67

I

29


II

III

IV

V

VI



Pulchra
Electa, ut



es ami-
sol



ca mea, pul-



chra ut
Lana.

IN
STITV-
TIONES MATHE-
MATICÆ

DE ARITHMETICA
COMPUTV ECCLESIAST.
GEOMETRIA.
Alijsq. scientijs Mathe-
maticis. Auctore.

R. P. ATHANASIO
Kircher societatis
IESV

Sacerdote, in alma
vniuersitate Heriopo-
lensi Professore Ma-
theseos, Ethica, ac sacra
lingua, ordinario.
Anno Domini.

1630.

Andr



Weid

+

3

Fauente Iesu et Maria. Ad gloriam s^{ae} trinit:
In Institutiones mathematica disciplina. †

Prolegomena. †

Anteqm ad arduam rerū mathematicarum fractionem progrediamur, visū ē penes prius quasdam proleusioes, v. potiq̄ ja ac simplicissima Mathematica scia, q̄b̄ p̄ceptis paulatī ad maiora, inoffenso pede gradiamur: q̄a tege Arte in poster. Analyt. in oib̄ alijs disciplinis oportet prius hūc aliquā p̄notioem, et quasi p̄existētem d̄notioem; sic Mathematica studijs n̄ prius ad adita eorū deducendū ē, qm̄ simplicissima elementa et nam̄ rei, qm̄ dicere q̄rat, bene p̄cepta habuerit. ut a. hoc meliori metho fiat, p̄legomena q̄ q̄stiones breuiter declarabim̄. †

Quaest. 1. Unde et qd sit mathematica. † R. 1. disciplina mathematica a graeco μαθημα, qd ē hūc, deducta inde originem suam accipit quod cū Rhetorica et Poetica ac vulgaris musica m. vsu et exercitioe abq̄ disciplina p̄cipi possit. mathematica tñ scia n̄ pot̄ a quocūq̄ illo, nisi prius hūc eam diligētē dederit scire; indeq̄ et aro vsu μαθηματικός: disciplina ha scia dicta fuerunt: p̄sertim cū ad scias et artes alias addiscendas sint mōe idonea, et circa res p̄cepto eodem mōe se hōtes vertent. Ad 2. R. Mathematica nihil ē aliud, nisi scia p̄tensatiua, q̄ n̄ s̄m̄ res v̄gia et rōe p̄ceptas, s; et sensib̄ q̄ abstractionem applicat, cuius species paulo post vide. †

Quaest. 2. Qua sit utilitas eius. † R. ē ea ita multiplex, et q̄ oēs suae v̄ta partes ita diffusa, ut hūc carere n̄ possit. Incipit n. mathematicis a minimis, ut puncto et v̄n̄te, tandem definit in cali et terra, v̄s̄itib̄ rerū p̄tensatiōe. †

Quaestio 3. Quodnam ob̄m. † R. hic sol. sumi p̄e ḡntem. Alia n. ē totiq̄ extensio, qm̄ vocant entitatīua realit̄ n̄ distinctā ab illo, cuius ē extensio, cōs oib̄ p̄dicentis, qm̄ mathesi parū curant. Alia q̄ 2 p̄dicentū p̄tuit extensa q̄ se. extendens tam ipsa p̄tētam, cui inē imēdiatē, qm̄ accida, q̄b̄ imēdiatē p̄be; et ut ipsa sit sens, aditum tñ. māaliū ē nobiliss̄a, p̄tētam q̄e amulat; foam q̄dem, q̄a ipsa ē actū, maam, q̄a ē p̄tētam; copositū, q̄a q̄ se extensa et sine p̄tē alio apta ē ex nāa sua subēe alijs actib̄, et copositū quasi ḡntā referre cū ipsa, s̄m̄ q̄ terminata in figurā aligū, māā coeua, q̄ruis et corruptionis expert, nihil hūc v̄tariū, difficultatū p̄tētarū parens, ingeniorū excitatrix, p̄tē d̄na et sapia eiḡ inēnsa cōpeditiosa q̄tā op̄tēntā; atq̄ ut sic p̄siderata, ē ob̄m̄ mathematica; hanc mathesi amant, hanc adornant, et ex hac oia composuerūt antiq̄; s̄ta s̄m̄ finita, infinita potēte, siue augeas addendo, siue diuendo im̄ minus; ibi n. q̄tā magnitudo, hūc multitudo p̄tētis infinita p̄furgit, et hac ē ob̄m̄ mathematica; s̄tē q̄dem eiḡ terminatō; ob̄m̄ totū et adaequatū ipsa ḡntitas znata, ut sic: ex hac n. im̄mōe varia oriunt̄ figura et n̄cti, quas Mathematici definit, deq̄ ipsi varia d̄m̄strat. Atq̄ hac ē illa ḡntitas, q̄ dici solet māā v̄gib̄ilis ad d̄nam māā sensib̄ilis, q̄ ad p̄hysicū spectat, illa n. ab hac q̄ illo p̄p̄tē, ac solo v̄ctū p̄cipit. Itinū igit̄ et d̄cretū v̄tūq̄ terminatū est māā v̄gib̄ilis, illud Geometrica, hoc Arithmetica. Itinē m. p̄tē, cur dicat̄ Mathes̄ p̄p̄tēre ḡntitē finitā, q̄a accipit znatā, q̄ finita ē, q̄tē dari pot̄ ḡntitas aliqua znata et s̄m̄ infinita, deca m. d̄m̄strōes Euclidis fieri p̄e, p̄tē ex triangulo hūc tres angulos aequales duob̄ rectis. †

Quaestio

addere nosse cupis? serua tria digna notata;
 1^o Inice de tractoris, iungendaq; figuras
 propofitas sibi fupponas normaliter omnes
 prima qdem primis fubfcripta, feconda fecundis,
 fic de alijs. Cauti defectu ex parte relinq;ue
 2^o Talis his rite pofitis opabere: primos
 quosq; addes nueros, et in vna collige famam.

fig nouem excidunt, feruato in mente fecondo
 in fubfcribere his actis pede, feconda
 Deficien nueri, queis adde in mente relictu,
 Non feq; ac factu, in relis opare figuris.
 3^o Auertat, cyphram nuero nihil adde uiuata
 vera te meliq; paradigma fcripta docebit

21
 423
 7632
 82953
 91029

Exempl: 1 Pauli dicit tui florenos 361, et
 224 iam fic pone
 361
 224
 585
 igitur fuma;
 opare iuxta verfig, stabit fic exel: hic 4 cu
 ad dextera incipiendo, adde et fic demceps, vti factu vides.

1	2	3	4	6	7	2	3	4	5	6	3	2	1	5	6
8	7	6	3	9	8	1	9	5	6	5	7	2	4	5	8
9	9	9	8	6	5	4	2	9	8	1	3	5	6	7	3

Exempl: hagio-
 graphica.

Abbe condito ad diluuiū elapfi ft anni
 A diluuiū ad abraham
 Ab abraham ad exitū Iſraēlitarū
 Ab exitū ad ſalomonem
 A ſalomonem ad captiuitatem Babylonica
 A Babylonica captiuitate ad Chriſtu

exempl: aftronom: luna ab octauo orbe di.
 flat ſemidiametri terra 20016
 A terra v. luna dijat ſemidiam - 65
 hoc ad dnta ofcedunt dijiam 20081
 octauū orbis a terra, nimis
 Aliud Inq;at xeribit nichte in Hungaria
 4324
 1675 in Boemia
 5479 in Auytria. igitur fuma.
 11478 Summa queſita.

Examen additionis.

Dome nouem addendis, toties, totiq; redactis
 0 in fuma, quoties poteris, nueriūq; relictu vti
 1 Inice, ſi equalis fuerit, gta praxius habet.
 2 A fuma de noue addendis, fig. priores
 addendi maneant, bona; ſin; opao falſae.



Vtus noua Tabula Additionis
 Hac tabula in infinitū vltteriq; extendi pot, i quo
 maior erit, eo expediri cuius nueri addendi fuma
 eruch. Vig. gre addendos tu in laterali tu in ver-
 icali, arcibus nueriūq; coincidentia dabit fuma.

Noua Tabula Additionis.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

vertica-
 lis.
 Lateralis
 linea.
 pone iuxta
 verticalem
 lineam.

De ſubtr.

Tabula subtractionis .r.v.

Tabula

Sae in infinitum, sicut etiam positio- nis augmentari potest, cuius vsq; in subtractione e talis. Quare numeru subducendu de cassata, in superiori; itea coincidentia qua- drata dabit residuum; magnu quoq; usum habet haec tabula in musicis, et postmodum videbimus. †

Aliud exemplū subtractionis intricatū. Si occurrat numerus talis 20046 subtrahendū a tali 30010 sic operare. Incipe a dextera subtrahere (sibi inuicem tri. rite suppositis) 6 a 10 manebit reliqua 4; deinde 4 ab 1, n̄ potes; 10 mutuo accipe a sequenti numero, n̄ etia hoc potes, cū 0. nihil coicari pot. 10 perges vsq; ad 2. et tunc dices 4 ab 11 subtrahere relinquant 7 ex q̄b; unū addes ad 0 sequēti numeri subtrahendū, et illud a superiori 10 se. pot. subducere, et remanebunt inferis 9.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	3	2	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5	6	7
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5	6
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3
14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

†

De Multiplicatione Artic. 4.

Haec nihil e aliud, qm ducty vniq; numeri in aliu, q toties in se h̄t multiplicatu, quoties multiplicans vnitem, cuius praxim sic accipe: Multiplicans infra ponat; multiplicandū; Multiplicantem due in oēs multiplicatos Summas exadyllos supponit ordine dextro; sig noue excedant, excessu adde sequenti; si v. multib; vsq; multiplicare figuris: pri- q̄ si vnica fuit fuerint, q̄sta tenet; cū cybra multiplicat verū p̄ponante.

3652
× 24
728
7280
87648

Exemplū de tempore.

Voce q̄ cupit, q̄ horarū sit annus. Multiplicans 365 dies q̄ anni cōs p̄ntem p̄stituit p̄ 24 horas vniq; natalis diei, ut fiat inde numerus horarū. Colloquet; jo si numeri p̄adyllos, et ducat; linea transuersa, ut dictū suora, deinde singuli numeri inferiores 1 multiplicantes in superiores ducat; et infra scribat; summa.

exempli mulli. habet; p̄ multiplicante; mulli. mulli. dicit; q̄ si multiplicans vna sit p̄ dicit; mulli. q̄ multiplicandū erit.

Vg.

Vg. duo p multiplicandem 4 in 5, sunt 20, cyphra nota directe sub 4, duo in mente retineo
 addendu sequenti, deinde 4 in 6 sunt 24 qbz addo 2 in mente relicta, sicut, 25. pono itaq 6 sub
 duobz. | altero numero multiplicato infra linea, binario in mente relicto, alteri addendo. tertio duo 4
 in 3 sunt, i2 qbz adde 2 ante relicta in aio, erunt, 14, pono qd 4 infra 3 se. numeru multiplicadu. et j deinceps: Absoluta ja opoe. (Cuius proximi vide supra.) Dele ja multiplicante 4, et pge ad 2u gm duces in
 oes m superiores multiplicandos. Vg. duo in 5, sunt 10, cyphra n pono sub 10 numero pcedentis multiplicatis,
 s. directe infra duu multiplicante, et write in aio relicta, duo 2 in 6, oriuntz i2 qbz addita unitas in me-
 te sunt 13, de qbz 3 directe suppono 3 multiplicando, vno in mente relicto. deniq 2 in 3 sunt 6, et
 addita write 7, q pono deinceps. Hac inter se addita faciunt summam 8760. Sors totiq anni. +

Ραβδολογία seu usus mensae Pythagoricae. Fundamentu su Ραβδολογία

Ραβδολογία arithmetica nihil aliud e, qm compendiosa et facillia oim
 reru computao, ex dsa bacilloru transpoe, circa qm duo notanda st,
 i fabrica bacilloru. 2 vq. Fabrica tota desumit ex Abaco sive tabu-
 la Pythagorica, vq quoz n multu discrepat. Constructio qo bacillos
 de lineato trig tabula pythagorica ea lineary distinctione, qua hic factu vides.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
0	3	6	9	12	15	18	21	24	27
0	4	8	12	16	20	24	28	32	36
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
0	7	14	21	28	35	42	49	56	63
0	8	16	24	32	40	48	56	64	72
0	9	18	27	36	45	54	63	72	81

Regula Pyth. g
 7 5 6 3

Hac igit tabula supposita parentu ex ma solidu bene explicata bacilli
 parallelepipi aequalis magnitudinis oes exacte quadratos, ita qdem, ut
 in plano positi, quocunq modo vertas, vna superficie m referre vdeant. Paratis
 a. sicu bacillis ad minimum 10 (pauiores n n sufficient) divisionem su
 aggredieris, bacillos sup afferem bene planu collocatos supra infrag inclu-
 des alijs afferculis, ne locu dimoveant; deinde divides deorsum jm et vlti-
 mu bacillu in 4 aequales partes, et ductis lineis a punctis ji ad puncta divisionu vltimi, erunt bacilli in sua
 loculamenta distributi; si p actis vnigbz quadratulu bacilloru divides diagonalibz, ut factu e in fundtis basi
 et tabula; demu inferibes numeros, qd optimi fiet, si 4 jus columnas fundtis tabula inferibes 4 sufficientibz ji ba-
 cilli, sequentes v. 4 columnas de bacillo etc. absoluto v. abaco identidem repetendz e, vq du oes bacilli sint inscripti;
 10 v. inferibes mca nullo. q bacillu pge. In superiori v. cuiusq bacilli sufficie ponas numeru eundem officale, ab ea
 parte a qua officalis illig columna ponit. Vq e jte sint multiplicati v. 1234 p 4. jte in vertice bacilloru
 numeru multiplicandu se. j. deinde 2. 3. etc. multiplicandem v. 1. + in latere ji bacilli a laua iacentibz, et oes
 ille areola singuloru bacilloru numeru multiplicatu ostendent Vg. 4/8 v. 2. j. 6. q additi rite inh se puent
 numeru. 4 q 36. Non n. vti in areolis qdratis inveniuntz, collocari ordine debent. s. hoc modo jo incipiendo
 a dextra versq leua scribo 6 n 16. itud j addo 2 in altero Bacillo sunt 3. q post 6 versq leua noto, dem-
 de j addo 8, faciunt 9, q sic scribo vti factu vides supra 13. v. breuibz sic: oes illos numeros, q repitit inh duas
 lineas diagonales, addendi st. n. a. q st inh duas lineas ppendiculares. 1. 1. 1.

Artic. 5 De Divisione.

Divisio e distributio numeri positi in alteru Soc minorem, toties, quoties in Soc vnu me. s. dividere e
 numeru

12 numerum educere, q. toties unum completat, quoties diuidentis diuisorem, numerum n. positum, qm posthinc volumus, diuidentem appellamus, numerus v. qm diuisio facienda e, diuisor seu denotator appellatur, is e q. partes denotat, in quas alterum diuidere volumus, vt 24 p 6 diuidere, e 24 in 6 partes secare. Dicitur hic 24 diuidentis, 6 diuisor, 4 quotiens; de q. sequentes verba accipe:

Tres numeros vs. diuisio facta regit
 q. secans, numerus, quotus, numerus secandus;
 Nota secare cupis numerum, hae capedigna notatu:
 Ad laua diuisorem suppone secando;
 Sector si maior, qm sa figura secandi,
 sub praecunte loco, maiorem pone secatem;
 Hic positus, videas quoties diuisor hic insit
 In superscripto, totiesq. reponne sectoris,
 Post hoc inuenta, hae, quoties, nota, multiplicet
 p. sectorem, ab eo, supra q. scripto habet, demat

demat, reliquas supra scribat adempto;
 indulto sectore nota, muerog, secando,
 Postea q. moto sectore fac, vt prius actum
 cuq. quotus negas repire, minore secando,
 cyphram post luna ponas, sectoreq. moto,
 sit supra scripto quoties, aduerte, quotumq.
 vt prius apponas retro, ac tali pedito praxi,
 dum diuisorem numeros partitq. in omnes,
 vltima si q. diuisio facta relinquat.
 fractio censat, sectoris, postq. locanda est

Exemplum.

Et 88 floreni diuidentur in 4 milites, q. q. q. accipiat florenos, sic opare: Posito diuisore 4 sub 88 diuidentur ad laua dicendo 4 in 8 sit bis, pono q. 2 semi post circulu, post hae ducit quotus nam inuentus 2 sicut in diuisorem 4 erunt 8, q. ab 8 subtracta relinquit nihil. deleto q. et diuisore et diuidentur, ponat diuisor 2 loco sub 2 diuidentur, et quando vt prius, reliquas in semicirculo gatu q. q. miles accepturq. sit scilicet: 22 quotiens. 1.

Exemplum pluriu diuisoru.


Cupet opiam diuidere 8766 florenos in 24 milites, et scire, q. vnuius ex 24 debeant floreni. Nota prius, q. actio in maioribus numeris tam expedite fieri neq. sit, sigillatim p. modu inductionis q. q. q. quoties vltima diuisoris in vltima diuidentis stineat, vt tandem p. eiq. modi etayoyv totus numerus inueniat, q. q. q. vt n. q. q. quoties 24 in 8766 stineat, s. quoties 24 in 87, aut 2 in 8. Diuisurq. q. pcedentem numeru sic pcedito. 2 sub 8. et 4 sub 7 ponant, inde dicit, 24 in 87 quoties possit hae, inueniam tm 3 me poe hae, scriba q. 3 post luna, et multiplica 3 in 24 pducens 72, q. subseribam diuisori, subtractisq. 72 ab 87 remanent 15, et 5 imediate supra 7. et i supra 8 collo: cato, deleo diuisorem et diuidentu, q. moueoq. vnu diuisorem vno loco, ita vt 4 infra 6. 2 infra 5 directe ponant; hoc facto, duo; quoties 24 in 156, inuenia sexies stineri; positus q. retro luna 6 multiplicabo 6 p 24, puenient 144, q. directe pono infra numerum ex priori subtractioe relictu, subtractoq. 144 ex 156 remanent 12 supra scribenda. Deletis q. diuisore et diuidentu, q. moueoq. diuisor vno loco ad 3^a diuidentu, ita vt 4 sub 6, duo sub 2 sit, et tunc opare vt ante est et videbis quotientem. 1. vide in exemplo ad dexteram posito. 1. 1

88	22
44	
<hr/>	
1 8 2 2 3	
3 7 6 8 5	148
2 3 4 4 4	
2 3 3	
2 2	
8 3 8	
1 8 7 2	

0 8 0 6	6
1 8 2 6	
8 7 6 6	365
2 4 4 4	24
2 2	
7 2	
1 4 4	
1 2 0	

Examen diuisionis

Vt facias nū diuifio bona fit, multiplicata diuiforem q̄ quotientem, et post multiplicatōem adde. si q̄ fup̄e, fractionem ja figura ad dexterā et sic deinceps, et si bona fuerit diuifio p̄bit nūc̄q̄ diuident̄q̄, fin, mala erit. et in allato hīc exemplo factū vides. v. nā si 23 in 150 multiplicaris, Sa $\frac{150}{23}$ habis 3 450, q̄q̄ loco (0 null) adde fractionē 6, et habe- bis diuidentum. $\frac{150}{23} = 3 \frac{6}{23}$



Caput 2. De Algoritmo minutiarū, siue Fractionum.
 Articulus 1. De Fractionis Natura.


Fraçtio siue minutia nihil ē aliud, qm̄ indicatō portionū alicuius integri, s̄q̄ r̄gularis, simplices et composita; r̄gulari q̄dem ad fractionem simpliciē duo nūc̄i, quorū vng. q̄ partes diffectorū nūc̄iat, ab arithmetico nū- mero seu nūc̄ians appellat̄, hic n. tot partes integri facti referit, et ostendit, si ipse capit vnitates, alter q̄ partibz a. minutis sua nota tribuit, denociator a. denocians d̄r, q̄ n. ipse v. vnitates v̄niet, in tot partes inte- grū diuisū eē indicat; scribent̄ a. sic: Nūc̄iat̄ supra breuē lineā rectā ductā, denociat̄ infra eandē in recte posit̄ $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ p̄rig sic effect̄; vna eā ostendens vna partem integri in duas partes diuisi; alter sic: dua tertia, quasi dices, dua partes alicuius integri in tres partes diuisi, et sic de alijs.

Nota 1. Cum tam Nūc̄iator, qm̄ denociator, fuerint ambo aequales, integrū notabit, vt $\frac{6}{6}$ aequat̄ in- tegro in 6 partes diuiso. 2. Cum superior, seu nūc̄iator maior fuerit inferiore seu denociatore, s̄q̄ integro va- lebit fractio, et q̄dem tot integra in ea v̄n̄t̄, quoties inferior in superiore habet̄, vt $\frac{7}{6}$ aequat̄ integro et sexta eiq̄ parti, similis $\frac{13}{6}$ duobz integris et sexta parti aequat̄, vt in exemplo lineā geometrico modo

diuiso stat. 3. Cum v. nūc̄iator fuerit minor, denociatore, integrū n̄ exhibet̄, s̄ tm̄ aliquas eiq̄ par- tes, vt $\frac{4}{6}$ monstrant 4 partes alicuius integri in 6 partes diuisi eē accipiend̄as; s̄ hoc in exemplis v.

Nūc̄iat̄	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Denom.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Denom.	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

De Minutijs compositis, v. fractioibz fractionū.
 Minutia composita s̄t certa partes vng. v. plurium portionū, in quas integrū diuisū fuit, vt $\frac{2}{3}$ de $\frac{1}{2}$ item $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{6}$ itaq̄ has minutas sic dices: tres decima quarta duarū tertiary ex 6 octauis, hoc ē integri diuisi in 8 partes sumenda s̄t 6, iterū secunda sunt in tres partes, et de his rurſq̄ dua accipiend̄a, ac secunda in 4, de q̄q̄ demum sumantur tres decima quarta. v.




Artic. 2.

Artic: 2 De Reductione ad integra et valore fractionu.

Quæst 1. qd fractiones reducant ad integra. N. nosse cupis, qui fracta gant ad tota reduci, diuisa N p. D. quota pars tibi fracta relinqt, supra factorem scribam, si qua supert:

Ex. Gr: $\frac{30}{15}$ vniq floreni valent, diuisa relinqunt duos florenos $\frac{30}{15}$ 2 flor. Item $\frac{20}{5}$ vniq vlnas valent 3 vlnas et duas sextas.



Quæst 2. qd integra in fractiones reducant? R. si v. cupias ad fracta reducere tota, integra multiplicata p. D. si summa relinqt. N. sup. scribenda loco, D. manente priori. vt bis 15 faciunt 30, erit qd 30 nuerator ex integris in fracta reducty; 15 denoiator.

Quæst 3. si integris fractiones addereant, qd e. faciendu. R. totis iugant si fracta, opalimur arte hac:

integra multiplicata p. D. p. ducta summa, N. addit, habes fractos, D. manente priori;

vt sint data integra 12 cu $\frac{12}{4}$ multiplicata de noiatozem fractionis 4 p. 12, p. dunt


48, qd adde Nuerozem fractionis, p. scil. fuerit 50. qd subseribe priore Denoiatoze 4. stabit exopt. sic $\frac{50}{4}$

Quæstio 4. qd regit valor fractionis? R. si v. cupias fractorum nosse valorem,

toty in partes notas N multiplicet, p. D. diuidito ducta, cupita tenebis. i

exempl: $\frac{3}{4}$ vniq floreni qd sunt in bagys, multiplicata Nueroze 3 in partes

notas floreni 15 scil. pducent 45 q. diuide p. 4 Denoiatozem, erunt ii et $\frac{1}{4}$ floreni.



Quæst 5. qd moscat, qua fractoru sit maior v. minor? R. Nosse cupis, gna fractoy maior, habebis,


N. si cybras pponas, p. fuos D. Partitq fueris, na quoru pars quota maior,

maiorem soru etiam cognosq, e. valorem; vt occurrut $\frac{3}{4}$ et $\frac{2}{3}$ vter maior?

R. p. fige Nuerozibz, 0, vt fiant 30 et 30. deinde diuide 30 p. 4 remanent 7,

nulla lta roe residui; dein 30 p. 3 diuide, despendes 5, quoru qd quotiens maior e,

et fractio maior erit. i. i. i.




Quæst 6. qd reducant minutia ad minimu zminu? R. inuenias nuerg q

et supiozem et inferiozem exacte diuidat, quota n. partes idem cu prioribz

notant, vt $\frac{12}{10}$ diuide p. 4. 12. exeunt 3, et 16 p. eundem, fiant 4; erit qd

haec fractio: $\frac{3}{4}$ aequalens $\frac{12}{16}$ qd a. despendere pois nuorum vtriq coem,



obserua hanc praxim: suffrag minor. a maiori delecto illo, a quo fit subtractio, rurzq minor de mai-

ori deducit, et hoc toties fiat, donec p. deant duo nueri pares, sic n. erit nuerg 18 qm ambo ad minorem

zminu redigi pnt. E. g. Proponat $\frac{36}{81}$ redigenda in minores zmos, deducant 36 de 81 restant 45, sine

rurzq 36 Calias si 36 est maior nuerg. qm ia qd ex subtractioe remansit, dicit hoc qd remansit a 36 subtrahi

et p. dunt 9, iteru q. a 36 relinqunt 27, et iteru de his 9, manent 18. demu q demp. ab 18 remanet

9. erit igit 9 nuerg cois diuisor Nuerozoris et denoiatozis, q diuisa p. g relinqunt $\frac{4}{9}$



Artic: 3 De Additione fractoru nuorum.

si sint D. similes, N. addito, D. reponas infra coem fractoru; additio facta est.


E. g.

E.g. vng debet mihi $\frac{17}{16}$ et alter $\frac{18}{16}$ adde numeratores vob. se. 8 se. cu 1 fient 15, et scribe 5 adde-
 Altera vnde relenta, deinde i ad; fient duo, qbz addita vntas ante relenta fiant 3, q scribes elaco, et summa
 erit $\frac{35}{16}$ denoiatore cui suborigto vt factu vides, q dicitur q denoiatorem quotu relinquit 2 et $\frac{3}{16}$. +

Si D diffimiles. N multiplicato fringitu in dextrum D; rursum N dextru in Dg fringitu,
 collectiqz adde, summa Numerator habeto, post duo D in se due, vob. deq. tenetor. +
 E.g. sint opposita minutia difor. denoiatori, vt $\frac{2}{3}$ et $\frac{3}{4}$ sic eos adde; multipli-
 ca 2 fringitu numeratorem in 4 dextru denoiatorem, et 3 dextru N: in D fringitu
 3, puenient ex jgdem 8 ex do v. g, q addita ficiunt 17. Pro denoiatore dein multi-
 plicia vob. se 3 et 4 pducit 12, q subseribes Numeratori inuenio 17 et pegeris additionem.



Si plures minutia sint addenda pluriu diforu denoiatori, addmg jo piores duas, denoi-
 de minutiam collecta cu tertia, eodem modo et hanc pducta cu 4 et ita demiceps tam N.
 qm D. et sint addenda ha minutia $\frac{2}{3}$ $\frac{4}{5}$ colligis jo ex duabz his hanc $\frac{17}{12}$ deinde ex hac et
 3a hanc $\frac{133}{60}$ demu ex hac et quarta pducetur hac. $\frac{1231}{420}$



De subductione fractionum. +

Si D sint similes N paruu subtrahit magno N, scribe D primu sub reliquo N subtractio facta est. +
 vt sint subducenda $\frac{9}{10}$ ex $\frac{19}{10}$ remanent $\frac{10}{10}$ si v. difos habeant Denom: sic ages: Reduces priqz gra-
 do vob. vt $\frac{2}{3}$ et $\frac{8}{9}$ reducens ad has $\frac{18}{27}$ si 2 N. in qd et 3 D in qd. multiplicaris, deinde iteru 3 D:
 fringitu in 8 N. dextru et duos D. vob. se fient $\frac{24}{27}$ stabit qo sic exempli $\frac{18}{27}$ et $\frac{24}{27}$
 hoc facto deduc N is a N: 24 remanent 6 qbz coem D. subseribe et erit $\frac{6}{27}$. p. 27
 Si v. cupas minutias afferre ex integris, frangenda q priqz integra et redigenda in partes, v. subyiciendo inte-
 gro vnu, vel pducendo numeratorem aequalen denoiatori, vt $\frac{4}{4}$ et $\frac{2}{2}$ valent integra, singula $\frac{1}{4}$ valent
 4 integra = duo integra; sint qo $\frac{2}{3}$ subtrahenda de tribz integris, collocabunt ita $\frac{2}{3}$ a $\frac{3}{3}$ q subtracta re-
 linqunt $\frac{1}{3}$.

De multiplicatione fractionum. +

Not. Multiplicare cupis facilis tibi proxi; habetor. { v. g. sint multiplicanda $\frac{2}{3}$ et $\frac{4}{5}$ multiplicati Numerato-
 ducti in se N N supra numerat. habetor res vob. se, et DD inter se quentent $\frac{8}{15}$ Item $\frac{6}{7}$ et $\frac{7}{4}$
 et DD in se ductis, D tenetis ab infra. } multiplicata pducunt $\frac{42}{28}$. +
 Not. 2. fractio si porro ducenda q integra, pone vt si multiplicanda sint 8 integra et $\frac{4}{5}$ fringens
 num sub nuero integro, vt quasi fractio fiat. } exempli $8 \frac{4}{5}$ multiplicatis vob. se tam N N qm DD
 His positis opere modo paulo ante notato pducens si nuero $3 \frac{4}{5}$ q equalent 6 integra, et $\frac{24}{5}$
 Not. 3. Integra si porro cu fractis denq. ad hocca vt; multiplicanda sint $8 \frac{3}{5}$ reducens 3 integra
 tota reduc iuxta paradigma tradita supra, ad fractionem hanc $\frac{23}{5}$ si se q Denom: 5 multiplicaueris
 Post hoc multiplicando illos operis vt ante 3 et post multiplicoen addas Numeratorem 5. et nuero 8
 suppone j et opere vt supra in multiplicoe fractionu fieri debet diximg. se. N N vob. se 8 cu 1 pducit $164 \frac{4}{5}$
 Si nuery fracty q in integra reduca diuidendo Numeratorem q Denom: efficiunt 30 et $\frac{4}{5}$. +

De Divisione

Si DD sint similes, tunc N partire secundu, alteru q N, qita tenetis. E.g. sint $\frac{6}{3}$ et $\frac{3}{6}$ diuidenda diuide
 mai.

maiores N 6 p alteru minorem N 3 facient duo integra, nulla sita roe D. si nil fuerit reliquu. r
 Aliter, sectoris loca mutata, D locando figuræ, Na infra positæ, posthac operis vt ante. r
 vt diuidenda sint $\frac{2}{3}$ & $\frac{3}{4}$ sectoris loca mutata 7 supra, 3 infra, et sic stabit exempli $\frac{2}{3}$ et $\frac{7}{3}$
 qm ita collocatis om NN qm DD vob se multiplicanti, et dabit summa $\frac{14}{15}$ r
 NB. si denarii fuerint pares, D diuisoris suggeribe deniariu diuidenti, vt $\frac{3}{4}$ & $\frac{3}{8}$ sint diuidenda,
 facta opoe vt dictu e, videbis quotum $\frac{8}{7}$ r.

Caput 3 de Regulis. r


Artic: 1. de Regula trium. r

Multiplicii noie hae Regula a varijs appellat, vulgo ea vocat regula trium, eo qd tres nueros tribus
 regat; sly Reg. proportio, eo qd tribus nueris proportionalibz datis tribz, & incognitu pportioem do-
 ceat eruere; cori Arithmeticoꝝ schola ea a pstra sua vocat aurea, eo qd oia pblemata, Arithmetica, Geo-
 metrica, et astronomica q pstram fouita soluat et enodet; res breuis e et facilis, qm in vna, tu in vna
 coi, tu in Mathematicis; cuiq praxi sic accipe:

Tres semper nueros Et aurea Regula notos,
 quoru notoru si tertij atq secundij
 in se diuisant, collectaq summa secetur
 & primu, ignotu qu in quotiente videbis

$$\begin{array}{r} \text{gra.} \quad \text{mill.} \quad \text{gr.} \\ 1 \quad 15 \quad 360 \text{ quot. } 5400 \\ \hline 5 \quad 400 \\ \hline \text{r } 1 \text{ diuide manet eade summa} \end{array}$$

Exem: vna gradus celestis pmet 15 milliaria germanica seu
 astronomica, 360 gradus qd milliaria pmet? colloca vt dictu,
 et duc tertiu. 1. 360 in 2du. 1. 15, et ductu qm diuide, quotiens dabit qd ignotu
 Aliud. Proferat in mediu talis pstris: 2 floreni faciunt 30 batz; 6 flor. qd batz?
 ponant eo ordine vt supra, et opare postmodu idu dicta. r



Exem: sit stylus aliq diuisus in 12 partes, et inuenio vmbra vllig styli ea 16 partiu,
 qm alta sit domus v: turris inuenta vmbra istig turris e vq 66 pedum r

$$\begin{array}{r} \text{umb.} \quad \text{sty} \quad \text{vmb} \\ 16 \text{ dat } 12 \text{ qm } 66 \\ \hline 66 \\ \hline 70 \text{ } 2 \text{ } 48 \text{ } 24 \\ \hline 16 \text{ } 16 \end{array}$$

Rao huius Regula e, qd eadem pportio ea dnt si nueri ad 2u q 3i ad 4 inuentum; hae
 cu ita sint, nec e ex opoe ig lib. 7 Euclid: eundem nueru duci ex multiplicoe si Nueri
 & quartu, q ex multiplicoe 2i in 3i, cu 40 nuery ex 2i in 3i, ductu diuidat qm, vt 49 in-
 ueniat iuxta pcepta regula triu, fit vt prima nuery q quotientem. 1. & 4i nueru inuentu multipli-
 catu pducet eundem nueru diuisu, q ex 2i in 3i fuit ductu. r batz.

Aliud 70 casei solandici emut 30 flor: vna gnti. 10 dant 450 — 3 qd — $\frac{30}{10}$.

Valor mensurarū et monetarū 2du ordinem Francofurtensium. r

Moneta. florenq 15 batzios, vna batzig 16 numos, atq 8 numos, crucifery 4 numos.
 Milliare geometriū pmet 1000 passy geometricos, iugerū vnu, 160 pscas, va pscia 16 passy, vna passy geo-
 metrig 5 pedes, vna pes 4 palmos, palmus 16 digitos. r
 Mensura Pondo: centenariq 100 libras, libra 4 quadrantes, drans 4 vnias, vnua 4 drachmas.
 Vasorū. Playstrū 6 omas, oma 80 mensuras, vnua 12 mens. quartale 4 mensuras. r

Art: 2

Artic. 2 De Regula triu in fractis.


Collocatis ut supra tribz numeri, ut si elicias ignotum; multiplicata 3^a p 2^a, productus divide p 1^a p
 exem: $\frac{3}{4}$ vna vna reddunt $\frac{7}{3}$ floreni, gnti emā $\frac{2}{5}$ vna vna, facta opoe quient $\frac{10}{18}$ g
 diuisa p $\frac{3}{4}$ relinquent $\frac{20}{27}$ floreni, gnti v. ha valent innoquoq gnti, docuim supra; si v.
 aliquo loco fuerint integra sola, ipis pta vnte fls erit opao cu minutis. ut 10 vna emā 12 flor.
 gnti tres quarta sic stabit exempli. $\frac{10}{1}$ vna $\frac{12}{1}$ flor. $\frac{3}{4}$ vna gnti? facta opoe si 3 in 12 duxeris
 ris p dibus $\frac{36}{4}$ si fracta cu integris occurrant, ea ad fractionem vna reducant, iuxta reg: allatas supra.

Artic. 3 De Reg: triu inuersa.

In pcedentibz tribz exemplis semp ea rāo si numeri e ad 3^a p 2^a di ad 1^a, atq adeo quanto 3^a maior,
 tanto et quartz: in gēda v. exemplis vtraria penitq e rāo, ita ut gnto 3^a maior fuerit, tanto quartz
 minor euadit, ut n. in his et flbz euerse e rāo, sic et vtrariq opandi modz, praxim sic accipe:
 In se ducābz numeri prior atq 2^{us}, vertig hocce fecerit, quantaq e sumā, resultat.
 V.g. emit gda 20 vnas panis latitudinem bntis duaru vinary, dubitā, si velit subducere aut tūm-
 cas a. aulca, quot vnis opz sit alteris panis bntis latitudinem 3 vinary, sic ponet exemplum:


ola latu
 2 panis emit 20 vnas, gnto panis indiget p tunicis qe 3 vna: latz? Rf 13 vnas et $\frac{1}{3}$
 due 2 in 20, productum divide p 3 p dicit sumā: 13 vnas et $\frac{1}{3}$ manifeste sic vides, quo latior e 3^a pan-
 nis, eo pauciores vnas ee vrias.

Aliud. gnto modis tritici emā 6 flor: panis vno basio emā pondz hit 10 vinary, gnti si idem modis
 tritici emā 4 flor. gntu pondz habeat idem panis, stet ex: sic.



Rāo hinc e, qz quo tritici e viliq, eo magz pondz e hinc panis;
 et quo cariq, eo ming, p n fuerit si 2 in 3^a multiplicare et p 1^a di-
 uidere, talis n. ddt ee opatio p ad 6, qualis e ponderis 10 vinary ad pondz ignotū, vnde iuxta
 regula pportioem simplicem sic collocandi cont numeri. 4 dant 6. gntu 10 em. p dicit 15
 Aliud. 20 opari facit opz aliqd 3 mensibz. 30 opari q mensibz idem p ficient: Rf 2 mensibz.

Aliud gram exercitq 3000 militu et comeatu ad 7 menses, verū nulla spes e solutionis obsequii
 ante vnu annu, gnti qd milites dux dimissura sit, ut q ceteris comeata sufficiat ad fine anni, et qd retine-
 bit, nā gnto longiq tps erit, tanto paucioribz, vich sufficiat.



Artic. 4 De Reg: 3. composita.

Nota. Sane Regula vocari qd duplicem ob duplicem annexā pphoen: ut V.g. p 20 libris merciu aduele:
 dis p 30 miliaria soluendi st 4 flor: gnti gntu solua q 50 libris adue vendis p 40 miliaria; in his
 et flbz opandi e duplicibz, methodo tri. et rōe pxy eadem, q in Reg triu simplicis tradita fuit, hoc tri
 obseruando, si vna opoe, id qd gnti n. repah, ee ea repetenda, vnde fit, ut ad Regula triu qdlice renouet: sic a.
 opabere: multiplicato priore loco, numerosq repositos tertio, et his ductis in se dicit vtere praxi. p. 6.
 vel p itam repetita dabit bis regula sumam: jo mdo si stet exem: hi mit. st lib. mit. p. 6.
 20 p 30 4 gntu 50 p 40 13 5

Aliud

Aliud. Exerator gda 300 flor. lucrati spatio 2 mensiu 3 florenos, grib gntu idem eadem obser-
uata porthoe vsura lucrati 84 florenis, mensibz 5. $300 - 2 - 3 - 84 - 5 - 6 - 4 - 2$

Aliud, Alii gda exposuit 125 flor. ad vsura, vera forte $125 - 3 - 6 - 320 - 12 - 61 - 6 - 2 - 5$
mutata amitti intra 3 menses de hac summa 6 flor. et

habuit idem alibi 320 fl. spatio 12 mensiu, de qbz gntu pdit?

Articulu 5 De Reg: consortij seu societatis.

¶ vna Regula aurea multa vsqz regula seu canones opandi, tanqz rami oriunt, adeo, vt in oibz fe-
re pportibz locu habeat, ac oes huc imitant, vt fundto et basi; inqz quas m. e regula pportij sic dicta, qd adhibe.
ab ipso plures pportiu ineunt, ita vt singuli gnta sumam pecunie accipiant de lucro, ad pportionalit pecu-
nias elocant. Vg. 4 mercatores inito pportio lucrati st 3000 aureos, s; ij stult 30 aureos, idz 50, 39 60. q; 100
grib gntu qz, ex coi lucro auise debeat, opare iuxta seqntes vsqz:


auru collatu, prig addita sumag prima	30	aur. collat.	lucr.	30	} huc ex his 4000 sin- gula singulis in 3000, n. simul, et pgt huc diuide p 240
ponat statioe, lucra statioe secunda,	50	240	3000	60	
gntu qz dedit mercator, pone deinceps,	60			50	
his positis opare modo, qm Regula tradit	100			100	
aurea; cuiquis pdit bit summa lucrorum.	240			100	

addita go collata summa ab vnoquoqz in vna sumam se. 240 opare iuxta regula si collata pecunia multi-
plicando p 3000 et p 240 diuidendo, inuenies jo deberi de lucro 375 aureos, p 2do g dedit 50. 625 aur.
p 3o, 750 p 4to 125. Nota his rae e in iactura, qualis in lucro, vt si nau fracta eiccta sint mer-
ces in mare; oes q pportiu illud ineunt ex equo damnu ferent, p dno pto merciu singulorum. i.

Exem: tres mercatores inito pportio nauigant in pxm mare merciu adducendaru gratia, si merces
300, secundi 400, tertij 500 aureos valebant, eiccta st merces 100 aureoru, grib, gntu qz amittat, colle-
cto valore merciu vniquiqz sic stabit exempl: 1200 pderat 100 aur: gntu $\left\{ \begin{array}{l} 300 \text{ is pdit } 300 \\ 400 \text{ idz } 400 \\ 500 \text{ idz } 500 \end{array} \right.$ 1200 etc.

Aliud. Est cisterna hns 3 fistulas inaeuales, maxima reserata effluit tota aqua 2 Soris; media apta effluit 3 Soris, tertia apta effluit 6 Soris, gnto
go tpe effluet reserata oibz fistulis; si p singulas fistulas a iupio vsq ad fine aqua semp effluet; sumes ah-
qm nueru nimisu, qm tpra in qthoe expisa, nempe Sora 2. 3 et 6 metiant, q hic e 6. Soc Sto dic; si

mxa fistula 2 Soris vna cisterna exaurit, qd
cisternas in 6 Soris exauriet, inueniesq 3.
item die, si media fistula 3 Soris exauriat vna
cisterna, qd cisternas 6 Soris exauriet, inueniesq
2. item minima fistula, si 6 Soris 1 cisternam
exaurit, qd 6 Soris exaurit, inueniesq vna Sora,
vt sic vides. collectis ia in vna his inuentis nueris
3. 2. 1 vt fiant 6. die iteru, si 6 cisterna exauriat
6 Soris, gnto tpe vna exauriet, inueniesq 1 Sora m. i id qd hac rae excuabis, si mxa fistula exaurit
totu cisterna 2 Soris, media 3. minimaq 6; gnta parte exaurient fistula 1 Sora, sic stabit exempl: $\frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{6}$



De int.

De interapedine tyris dyra, in xortio. 1

Tres mercatores xortio inito lucrati sūt 2345 aureos, verū q̄ suam pecuniam se: 40 aureos post 14 menses recepit, idē 50 post 8 menses, tertig abulit 85 p̄ 6 menses, q̄tio ē, q̄ntū cedat singulis, p̄ re pecunia tū temporis: ponant ordine $\begin{matrix} \text{aur} & \text{m} \\ 40 & 14 \\ 50 & 8 \\ 85 & 6 \end{matrix}$ } $\begin{matrix} 560 \\ 400 \\ 510 \end{matrix}$ } $\begin{matrix} 1470 - 2345 \\ 400 \text{ q̄ntū?} \\ 510 \end{matrix}$

3mim q̄tiois, ut in Reg: aurea fieri solet, ita q̄dem 50 8 fient 400 } $\begin{matrix} 560 \\ 400 \\ 510 \end{matrix}$

ut mediū obtineat lucrū, tertig unguis, pecuniam q̄ 85 6 addita 1470

tps suū multiplicata, oportet n. p̄portioem lucri composita

ē ex p̄portioe pecuniae et tyris; ponemq̄ q̄ p̄ 10, 560, p̄ 200 400, p̄ 30 510, p̄ig sumā sorū trū p̄ addi: tūem collectā se: 1470, q̄ im obtinebit locū, stabit exemplū, ut sic vides. r. due 560 in lucrū 2345, dābunt 1313200 q̄ duisa p̄ 1470 relinquit sumā lucri q̄ merat:

Artic. 6 De Regula Allegationis. 1

Hac Regula vocat̄ corā ab Arithmeticis allegōis, eo qd̄ varia merces alligens quodammodo ad unū pretiū, ut ex sequētibz patebit exemplis. exem. duo ḡtra vini, primi una mensura xelat 20 batzys, alterig 12 batz; q̄tibz ḡtra ex utroq̄ sumendū sit, ut mensura valeat 15 batz. sic opare: emporū sibi vinorū subiunge valores, Hos inq̄ mediū p̄tū ponat, et huius

A q̄tibz utroq̄z meri distanā q̄ sit,

serua, se r̄uncta statione priore locent,

Reḡ statuta loco medio, intervalla deinceps,

Post opare sibi, velut Regula aurea mandat.




Artic. 7 De Regula falsi. 1

Vocat̄ hac Regula falsi, in qd̄ falsū doceat, s. ex falso doceat modū eliciendi verum, estq̄ r̄plex, simplicis et r̄plexis positiois. Regula simplicis positiois ē, in qua nimirū fit positio uniḡ trū m̄teri, q̄ q̄tioi credit̄ satisfacturq̄, qd̄ā v. r̄plexis positiois d̄r, in qua fit r̄plex positio 2 m̄teroz, quorū utiq̄ q̄tioi satisfacturq̄ putat̄.

Regula falsi simplicis positiois. 1

Proposita q̄tioe quacūq̄ p̄ hanc enodabili, m̄terū qm̄ sive dyras, tangen notū iā tibi, finge; ponens eiq̄ loco q̄m̄cūq̄ m̄terū, cū eo deinceps quede r̄dā exempli r̄oem inferendo unū m̄terū ex alio, do= nec ad aliq̄m certū et notū in q̄tioe p̄positū p̄ducaris. E.g. tres mercat: emūt p̄tū q̄dam 2700 aureis, idē r̄olo pl̄q̄ vult dare qm̄: 19, et 39 39la pl̄q̄ 200, q̄ntū qo q̄q̄ dabit? in hac q̄tioe m̄laliud q̄m̄, qm̄ ut 2700 diuidat̄ in 3 partes, ita, ut sit 2da dupla 1a, et 3a 39la 2a. finge q̄o im dare q̄tūq̄ aur. volueris sicut 6. igit̄ iuxta tenorem q̄tiois idē dabit 12, tertig 36, collecti s. m̄teri faciūt 54 cū efficere d̄brent 2700. d̄r q̄o si 54 quentiant ex falsa positioe auctozū 6 primi mercatoris, ex qua vera positioe d̄buit 2700 inueness̄ facta opoe qm̄ dedisse 300 r̄du 600. 1. dupl̄i si, tertig 1800 q̄m̄ se addit̄ faciūt 2700. vide exemplū appositū



211 p̄dat 57. qd̄ i. r.

Aliud. gda moriens, cui filia et filij, 9 in bello diebus occubuisse, ita distribuenda Sarciditatem q
 erat 18988 intx uxorem et filia relqst, vt vxor hret $\frac{2}{3}$
 filia $\frac{1}{3}$ s; si forte filij rediret, vt filij hret $\frac{2}{3}$. certu e' sanc
 ffionem n' pot. ilgi vt verba sonat, si n. filij accipiat $\frac{2}{3}$ n'
 poterit vxor et filia $\frac{1}{3}$ hre itaq' interpretandu e', cu' voluisse,
 vt filij 2plo plq, gm vxor, et hae 2plo plq, gm filia, sic stel exemplum. + +

4	} 18988	4 filij	Autq'
2		2 vxor	5035
1		1 filia	2584
7 ad			

Caput 4 De Progressionibus

Aritmetica, Harmonia Geometrica +

Artic. 1 De progressionem aritmetica. +

Nota, progressio nil e' aliud, nisi pluriu' numeroru' certa quada' rae expositoru', in vna sumam col-
 lectio, estq' 3plex; aritmetica, harmonica, geometrica. Aritmetica progressio e' illa, in qua repetit
 numeroru' intervalla sine dria semp' equalens, atq' hae e' v. naals, vt cu' ordine naali numeri expo-
 nunt; 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. 11. 12, vel interusa, ia numeri equalibz intervally qbzq' distincti
 exponunt; vt. 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17 et gerunt impares, et 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20
 oes pares; et 3. 6. 9. 12. 15. 18. 21. 24. 27. 30. q' vicissim pares et impares st. Collectory go in
 vna summa totiq' progressionis numeros, adde duo extrema, extremoruq' aggregatu, si par sit dividia, dimi-
 diatu q' numeru' omnium 3 minoru' multiplica, et habebis summam. + Si aggregatu duoru' extremoru' fuerit
 impar, multiplica totu' aggregatu q' dimidiu' numeri terminoru', et habebis eandem summam. +
 Exem: ponant ordine naali vsq' ad 11. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. horu' sumam si seire vis, adde gm ad vlti-
 mu' fuit 12, cuiq' dimidiu' se. 6 multiplicatu q' numeru' terminoru' se. 11 pducit 66 sumam totiq' progressionis.
 Item ponant ordine naali vsq' ad 12. quoru' sumam si nosse cupis, adde 1 ad 12 fiant 13, veru' qz aggregatu
 e' impar, multiplicatu totu' hoc aggregatu q' medietem numeri terminoru' se. 6. fuit 78 summa totiq' progress.
 Artic. 2 De Progressione Harmonica. +

Progressio harmonica e' certa gda triu' numeroru' series, sic se hnt, vt 3 e' proportio maximae et minimae, m
 sit driae mxi et medij, et medij atq' minimi. Vocat a. progressio harmonica qd' in 3 numeris tres illa
 consonantia diatona, diatona, diatona, qbz tota musica veluti basi innitit, inveniunt. diatona
 q' et vulgo octava di, in dupla semp' proportioe veras; diatona in sesquialtera; diatona in sesquialtera;
 atq' ex his reliq' oes consonantiae tam pfecta, gm imperfecta componit, Tritong, ditong, semiditong, distipa-
 son cu' diapente, tong, semitoniu' maig et ming, similiaq', de qbz vberiq' in tractatu de musica. +
 Et tri. pfecta consonantia yta: 1. 5. 8. 12. 15. 19. Imperfecta: 3. 5. 6. 8. 10. 12. 13. 15. 19. quoru' subsidio
 ois cantio componit. Inveniunt v. tres numeri in proportionalite harmonica ex tribz numeris proportio-
 nalis aritmetica cuiusq', si. 3. in 2 ac 3 et 2 in 3 multiplicet, vt datis 1. 2. 3 aritmetica proporti-
 onalibz, multiplica 3 in 2, et pducit dus, item 3 in 3. fiant 3 et demu' 2 in 3; fiant 6. erunt go tres p-
 ctu' numeri harmonica proportionales. + vt 2. 3. 6. Aritmetica proportionales.
 1. 2. 3. 6. Harmonica proportionales.
 Redent n. vltimi tres numeri tribz musica sonis sua, gnta seu diapente et diatona 1. quarte. Vide tr. de musica

Art 3

Artic. 3. De Progressione Geometrica. 1

Hac e numeroru se equalis fugantiu series, cuiusmodi sūt. 1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128. 256. etc.
 Hic haec e gressio geometrica in dupla pportione; in tripla haec e: 1. 3. 9. 27. 81. in adrupla haec e:
 1. 4. 16. 64. etc. si qo in quavis pportioe geometrica noty fuerit denoiaty pcessiois, ma cu mino-
 ri et maiori extremo, pueniamq in miorum suma oium terminoy haec roe: Per denoiatorem ppor-
 tiois (q e in tripla gressioe 19. 3.) multiplicat mioru mioru, et subtracto vno: diuidatq nuery q vno
 minor ia e q sublatu inde vnitatem, denoiatore pportiois, vt 2 vno nuero minor e 1. tripla vno nuero
 minor, e duo. etc. Exem: Ponat haec series. 1. 3. 9. 27. 81. 243. 729. 2187. 6561. libet sūre
 sumam totiq gressiois; multiplicet nuery postremy q e mior, q 3 denoiatorem pportiois, sūnt
 iq 683, de his detrahāt vnu a dextra, et manebit nuery taly. 19682. sic ita priuatq vnitē diuidatq p 2
 mioru se vno minorem denoiatore pportiois; sūbit 9841 sumā totiq gressiois; sūb in alijs gressioibq. 1

Caput 5 De extractione radicū, Quadrata et cubica. 1

Artic. 1. De extractioe Radicis quadrata. 1.

Extrahere radicem Quadrata nihil e aliud, qn inuenire et pferuere laty (q et radice appellat) quadrati. 1.
 cu nuery q in se multiplicatq, gignat Quadratū nuerym ppositum. Extractio qo radicem Quadrata, pferi-
 bat nuery, cuiq radice inuestigatq, et figura ja a dextera notatq, puncto nimiru posito v supra v. infra
 sūb tertia ab hac et 5 et ita deinceps, semp intermedia relinqdu figura n notata, pferetq deinde an
 nuery extremo puncto delusq sit Quadratq, qd ex
 tabula pueniente radicem Quadratorū facile inuestiq,
 et si fuerit laty a radice eadem, seorsim (vt in diui-
 sioe fit) pferetq; si mior, sumatq laty qoi nuery
 Quadrati, et subtracto nuero Quadrato de pposito, radice ja
 erit pferata, et opae vna absoluta: postea replandū e
 id qd seorsim scribetatq, et replū ponendū sub figura
 vteriq laua, q pte alterū punctū sūb, et si plures fu-
 erint figura reliqua; deinceps scribatq; considera deinde, quoties in supra scripto, tangm diuidendū sūi pōit, eiq
 sumā inuenta asseribatq ad priorem seorsim ia positu, et eadem subiungatq figura notata puncto; multi-
 plicatis a. et subtractis qd reliquum e, superscribatq, et erit finita opae altera; et hoc poptu toties repetendū e,
 qd fuerint figura punctis notata residue; tot n. radice habebit figuras, qd quadratu puncta; si in opae nil
 maneat residū, nuery pposity pfecte Quadratq erit; si v. aliqd maneat, nuery surdy, n. a. Quadratq voca bitur. 1

Radix	Quadratum	R.	L.	R.	L.	R.	L.
2	4	9	81	16	256	23	529
3	9	30	300	17	289	24	576
4	16	33	321	18	324	25	625
5	25	36	360	19	361	26	676
6	36	39	396	20	400	27	729
7	49	42	441	21	441	28	784
8	64	45	495	22	484	29	841

Exempl: sit radice inuestiganda Quadrata de 1296, notatq figura
 ja puncto, et tertia ab illa: deinde pferetq, an 12 delusa puncto vll.
 sūnt Quadratq nuery, cuiq vt referet tabula, n. fit, sumatq qoi Quadrati se
 q. radice q e 3. et pferetq seorsim, qn duo in se, sūnt 9, q subducta
 a 12 relinqut 3 supra 12 scribenda; Duplentq de m 3 seorsim scripta,
 sūnt 6, ea scribo sub figura pte segute punctū alterū, et qa in supra scripto repitq sexies, scribo 6 ad 3 retro
 semi-

$$\begin{array}{r}
 3 \\
 2 \\
 9 \\
 6 \\
 3
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 0 \\
 0 \\
 6 \\
 0 \\
 6
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 36 \\
 6 \\
 6 \\
 6 \\
 6
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{Radix} \\
 \text{multipl. 66} \\
 \text{subduc a superiore reliquo.}
 \end{array}$$

390
7-1-11
23
Tractatus 2. de Computu Ecclesiastico.

Caput j. De tempore.

Tempus idu helen e reru mutabilium mensura, sive e numeru motu supri corporis caleste jmi mobilis, cuius motu sol rigit, vergitq in occidentem ab oriente, et iteru in orientem integro circuitu, spatio 24 Solaru, quo dies naalis includit. Partes spri idu Ecclesiasticus st 30, Anus se, mensis, septimana, dies, hora, quadrans, punctu, momentu, vicia, et atomu. idu Astronomos, post Solaru septu minutu, post minutu idu, m etc.

Divisiones Anni.

Anus e zplex, solaris, lunaris et magnu. Solaris sive Romang, 365 et vertens seu naalis annu dr, e spatiu spri, in quo circuit sol 12 signa zodiaci, seu spatiu, cu, a quo cali puncto incipit, eodem redit, et hac revolutio idu Astronomi computem diebu 365, Solaris 5. m. 49. m. 16 fere completur.

Lunares tribu modis accipiunt: 1o Anus lunaris e spatiu spri, quo luna motu proprio idu aequalem cursu, totu circuitu zodiacu, qd pficit idu Astronomu diebu 27, Solaris 1. minutis 44, secundis 5, iuxta illud. Percurrit cyclu viginti luna diebu septemvis sum, bis quattuor insup Solaris.

2o Anus lunaris e spatiu spri interiectu in vna et altera zgressionem solis cu luna, qd spatiu stinet dies 29, Solaris 12, 44, 3. Tertio modo dr Anus lunaris spatiu 12 lunationu in anno coi, et 13 in Embolymali. Anus so lunaris 12 lunationu st dies 354. Vnde patet, qd Anus solaris cois superet hunc 11 diebu, q excessu facit aetatem luna.

Romang Anus zplex e: cois et bissextilis, cois zstat diebu 365 plg ming; bissextilis 366 ga vng addit.

Exordiu v. Anni coi Theologoru et Astronomoru sent: a martio incipit, seu 21 martij, du sol ju gradu frietis ingredit, eo qd tunc mundu creatu e putetur.

De 4 temporibus Anni.

Anus hic cois dividit in 4 partes, q st. Ver, aestas, autumnu, hyems, ja erta veris dr calida, humida, vernalis, puerilis, sanguinea, et ex Solaru aetatib st puerilem aetatem, nempe ab exordio vita, vsq ad complementu 23 anni, et tunc riget sanguis; secunda aestatis, dr calida et sicc, aestiva, choleric, iuuenilis, et ex aetatib mundi, st fiat iuventutem, se a 22 anno vsq ad 41 in quo cholera dicitur. 3. autumnu dr frigida et sicc, autumnalis, melancholica, et ex aetatib Solaru st fiat virilem a 42 anno vsq ad 60, et tu melancholia dicitur. 4. dr frigida, humida, plethmatica, senilis, defectiva, et st fiat senectutem a 60 anno ad finem vite naalis; tunc m pituita fluctuat, et imo ducit plethmata corde. merito qd hac anni pars a Cicero dr bruma. Veris a initium est 21 dies martij, du sol arietem intrat; aestatis 22 July, quo sol ingredit canceru, appellatq solstitium aequinum; autumnu 24 septembri, ingrediente sole in qd etia dr agnovit autumnale; hyems 22 Decembri, ingrediente sole in y, qd et solstitiu hybernū dicitur.

Charmacteris anni dr a Tenarij numeri revolutioe, indicantq notabilem in humano corpore alteroem, quoru qualosiffimis est Solaru Tenarij 49 sicut, et 63 ob multiplicoem 7 in 9.

Cap: 2. De mense et eius partibus.

Mensis zplex e, se, solaris, lunaris et communis. Lunaris e spatiu, quo luna totu zodiacu perstrat; solaris est, quo

quo sol vnu signu zodiaci 30 gradus; cōs ē, mensis certorū dierū spatio cōstans, de q̄b̄ sequit̄
 vtzq; Junij, Aprilis, septemq; Novemb̄ tricenos (sūt dies) vnu addes reliqs, viginti febr̄ octo est,
 q̄ si bis sextis fuerit, sup̄addit̄ vng. vel sic: Erige in manu tres digitos scil. pollicem (q̄ etiā doctor dicit̄)
 a pollice* medij, et vltimū seu amatozem, ceteris cōpressis et iniege* muerare menses, a martio incipiendo et ordi-
 ne deinceps oēs muerando, excepto februario (notū ē illi 28 dies nisi bissextilis sit h̄c) et q̄ menses
 incidunt in digitos erectos, erunt 31 dierū, q̄ vero in cōpressos, erunt 30 dierū ut sic vides. + 23.

Caput 3 de septimana. +

septimana, q̄ et heptemada et sabbatū d̄r, sūt 7 dies, q̄ r̄du
 Gentiles denotant a Planetis ja Sora uigis diei d̄rantibz
 Primū n. a sole, q̄ princeps ē oim̄ syderū, 2d̄o a J̄ tertio
 a d̄ ete. quare autem dies n̄ ita ordinat̄, sicut in calo, r̄pl̄
 ē r̄eo, quamū prior h̄c ē, r̄sonantia illa dia-re-66āeov, qua
 rientū et harmoniam calorū, creditū est, p̄tinere; Altera vero
 ex diurna reuolutiois in horas 24 partitione defungta, q̄
 veritati rei magis r̄sentire videt̄; si n̄ singulis horis singu-
 las tribuamz planetas, p̄d̄oq; illa planetarū 7. ter in die
 absoluit̄, et tres insug Sora fuisset, q̄b̄ si tres planeta denz, factū iuro ab illis diei planeta, fiet, ut
 ab eo quartz ja Sora sequit̄is diei p̄sit, ac p̄inde notū ei tribuit, ut dies saturni ja Sora d̄at̄ saturno
 item absoluta vna p̄d̄o 8 illis diei Sora iterū saturno, tū 15, demq; 22 ac p̄inde 23 erit Jouis, vltima
 v. et 24 martis; vtzq; sequit̄. Sora ja sequit̄is diei erit solis ut in exemplo, h̄c solū vides. +



Tabula Sorarū inaequalium, seu planetarū, Soris equalit̄ tam diurnis, qm̄ nocturnis, iuxta regimen planetarū, accommodata. +

H O R E D I E I . +		1	2	3	4	5	6	7
H O R E N O C T I S . +		8	9	10	11	12	13	14
DIES SOLIS . +	Feria . 1.	ja sabb.	☉	♀	♂	♄	♃	♁
Dies Luna . +	Feria . 2.	2. sabb.	☾	♃	♂	♁	♀	♄
Dies Martis . +	Feria . 3.	3. sabb.	♁	♁	♀	♂	♄	♃
Dies Mercurij . +	Feria . 4.	4. sabb.	♂	♃	♁	♂	♁	♀
Dies Jouis . +	Feria . 5.	5. sabb.	♂	♁	♁	♀	♂	♃
Dies Veneris . +	Feria . 6.	6. sabb.	♀	♂	♃	♁	♂	♁
Dies saturni . +	Feria . 7.	7. sabb.	♄	♂	♁	♁	♀	♂
Astrologorum . +	Christiano- rum.	Judo- rum.						

Vetus Tabula . +

Cupis scire, quom̄ quavis Sora, quouis die heptemada, planeta regnet, q̄re heptemadis diem et Soram
 nocturna vel diurna, singulz cōs dabit planetā regnantē. ut si die solis Sora 8 gradz q̄ tunc planeta
 regnet, q̄re a latere die solis, in vertice Sora 8 diei, inuenies tū in angulo cōi ☉ regnantem. +

Romani eū q̄ insigni eiq̄ vtilite, in Kalendario aureis litteris, inscripserunt, vt testat̄ Iacoboseo: munc v. hū dicit̄ ad epactas inueniendas: ceterū epi Chaldaei primi hoc cyclo forte vsi sunt; in q̄ graecis tū q̄ eū docuit, p̄bely q̄ fuisse Melon Atheniensis circa Olympiadem 86. . .
 4. finis gl'bet hūq̄ aurei numeri cū decembris, et incipit cū Januario; q̄ō eruat̄ auraḡ numerū, iā dictū ē q̄d̄ vsq̄ Sabab, vsq̄ hūq̄ facile, cū se p̄petua serie sequant̄. . .

Caput 7. De Epactis.

Epacta nihil ē aliud, qm̄ numerū dierū, q̄bz̄ annū solaris cois dierū 365 annū coem lunarem dierū 354 supat, ita vt epacta j̄ anni sit ii, cū hoc numero annū solaris cois lunarem coem excedat, atq̄ ade sequenti anno nouilunia p̄tingunt ii diebz̄ priq̄, qm̄ anno j̄o, ex quo fit epactam 2i anni ēē diebz̄ 22 citiq̄, q̄a additi ad ii dies ad j̄i anni epacta efficiunt 22: Epactam vero 3i anni esse 3i, q̄a si ii ad 22 addas, efficiet̄ numerū 33, a quo si reuocant̄ 30 dies, q̄ vnā lunem embolismicalem p̄stituant, relinqunt̄ 3 atq̄ ita deinceps; p̄p̄t̄ient̄ n. epacta p̄m̄mo q̄ augmentū ii dierū, abiecijs tū 30, q̄d̄o reici p̄ti; s̄m̄, q̄d̄o p̄uenti erit ad vltimā epactā aureo numero 19 p̄ntem, q̄ ē 29, addant̄ 12 vt abiecijs 30 excomp̄sito numero 41 Sabab rursū epacta 11, vt in iuris, q̄d̄ idē fit, vt vltima lunā embolismica corrente aureo numero 19 sit tū 29 dierum, si n. 30 dies p̄tinet, vt alia 6 lunāes embolismica; n̄ redirent nouilunia post 19 annos solares ad eodē dies, s. vtz̄ calēem mensū glaberent, p̄tingerentq̄ vno die tardiq̄, qm̄ ante 19 annos. Epacta a d̄i ab Etayio. i. infero, adiq̄. et ē r̄plex, veteris et noui

30. Kalendarij, siue Gregoriani et Iuliani; q̄d̄ vt meliq̄ vtz̄as: Nota. 1. Iulij caesar, cui sup̄putationem septibz̄ Kalendariū antiquū, anno solari attribuit dies 365, et integras 6 horas, q̄ hora, cū driennio faciant̄ j̄ diem, iussit Iulij caesar quouis driennio diem vnū in Kalari, verū illa anni gutitas ē iusto maior, nec vly postea sydonomq̄ tū regit, plura n. minuta desit, q̄ spatio 400 annorū induunt drientem 3 dierum; vnde si Ecclia falsa bari Guliana sup̄p̄tōem retinuisset, 24500 annis, agnoctia et solsticia sedes suas p̄mutassent, et vtz̄ in autūm seu p̄ntem; kutumq̄ in Martiū incidisset, vt in

20. solara tractat̄. Not. 2. etsi r̄plet sup̄p̄tōem Gulianam falsa ēē; n̄ h̄. in hunc diem p̄uenit inq̄ astronomos de p̄sua anni tropici p̄tate (q̄ incipit ab ingressu solis in aliq̄ signū, et d̄i syderez̄ annū, vel ab vsis punctis agnoctiorū, et d̄i p̄rie tropicū) omissis veterū sententijs Ptolomaz̄ anno circit̄ 330 post X̄m̄ natum suis obseruatiōibz̄ desēderit anni magnitudinem dierum 365, horarū 5 minutorum 55, et 12. Albatēniq̄ circa annū Dni 880 inuenit, annū p̄tinerē dies 365, horas 5, minuta 46, et 24. . .
 Ptolomaz̄ Rex anno 1250 statuit annū p̄tare diebz̄ 365, horis 5, minutis 49, et 16. Itaq̄ ex horū sentētia colligit̄, annū ēē inaequale, ac mx̄m̄ q̄dem fūre t̄p̄e p̄tolomaz̄, minimū Albatēniq̄, medio a se m̄do Sabuisse, t̄p̄e Alphonzi. Cognicq̄ vero t̄mos quosdam incrementi, et decrementi q̄ annis afficit; et annū mx̄m̄ q̄dem paulo maiorem, qm̄ Ptolomaz̄, et minimū q̄dem paulo minorem anno

30. Albatēniq̄, inq̄ quos p̄e mediāt̄ annū Alphonziq̄. . . Not. 3. Ecclia in sua correctioē Kalendarij
 40. secuta ē sup̄p̄tōem Alphonzi. q̄ illa m̄da ē, miniq̄ p̄inde magno errori obnoxia. . . 4. Anno Dni 324 quo fuit celebrata synodus Nyuena, p̄tigit agnoctiā vtz̄m̄ die 2i martij, s. ab eo t̄p̄e ad annū 1582. iā totis 30 diebz̄ p̄ueterat̄ sedē suā, et incidit in ii martij; item nouilunia n̄ bene in Kalendi designat̄, correctio 90 Kalendarij in his 3 p̄stibat, s. in agnoctij r̄st̄tūe 2 in reteritioē in eodē semē die, et meliq̄ cyclo.


50

cycloru innovoe 50. restituo agnotij facta e sublatoe 30 dieru ab octobri anni 1582, quo anno post diem 4^{to} sublatoe s^c seu desierunt numerari dies 30, et imediate post festu S. Francisci cepit numerari post diem 15. Retentio agnotij eodem die 23 martij facta e, aliqua imutoe anni intercalaris, na cu antea quarto quoq anno fieret intercalao, ia spatio 400 annoru debet ter interrumpi in triq centesimis post. annis, ut qd annu 1600 fuit intercalaris, sequentes erunt coes. Vg. 1700^{us} 1800^{us} 1900^{us} rursu 2000^{us} erit intercalaris; Vide iuxta Regula cap. 9 de computoe dyssiditlis, si sublatis 1000. 100 et 20 cadat annu in minimu digitum inchoando ad m. diea, erit annu intercalaris; si vero ijs sublatis nil remaneat, erit ipse intercalaris, nisi fit ex ijs triq centesimis, q post kalendariu correctu n amplig erunt intercalaris. Nouilunij expectum est q comendatioris cyclus, de qly postea. 1. 6. Etji agnotiu eutrasiu ut ia dixi, semp fit affixu 23 martij, astronomia tu n qd semp illi diei attribui, tu ob anni inagltm tu m. ob minuta illa supra dies 365; veru ia expectu e, ut n nisi biduo distet a 23 martij recedendo ad 23 v. 19 martij; na defum q oris ex inagltate annoru, corrigat infruptio anni intercalaris; qmprimu n. spatio annoru 134 agnotiu vel ad vnu diem vterq hyemem retrocedit, omittit intercalao. Instabilitas item agnotij, q ex minutis anni residuis puenit, abunde corrigat q infruptioem anni dyssiditlis. 1.

70

Ex dictis colligit, qd in correctioe kalend. passu fit a Greg. 13, cuius auctoritate kalend. correctu e anno 1582. Patet item kalendariu hoc correctu n deo diei expectu, qd agnotiu nuqum sua sedem delecturum fit, v: qd nulla vngm in ipso kalend. mutao facienda; na cu anni qfusa gntitas n fit adue, dita ob annoru inagltm, nullu Mathematicu ex ijs, qly Greg. 13 vsq e ad corrigendu kalendariu, expectu vocavit, quasi nuqum postmodu qpua mutandu fit, ut Clauis ipse de se aliq testat; imo ipse Pontifex in compendio correctiois, qd misit ad oes Principes et Regitates Christianas, anno 1577 clare inuuit, varietem aliqda et dyssiditioem inq dies aliq kalendarij, et solis cursu poe interuenire, tu addit hec verba: qd si aliq accident (e varietas se dieru) eadem hac via bellissima gnt restitui; sic ille. 1. Itaq kalendariu de expectu, qd via correctiois eig q. pecta; inuentu n e qda cyclus stablis epactary, in quo nil inmutandi e, etji alia gntitas anni repiat, qd terea dies aliq sint adinendi; vel etji alia luna pioda dyssidit, is n cyclus ad oem anni gntitate et qdodi accomodat. his pnotatis:

Epactam kalend. Iuliani sic inuenies: aureg nuerg anni ppositi multighicet p 11, ductu p 30 diuidat, residuu epacta anni Iuliani ostendit; si ex ductu 11 in aureu nueru pducas nuerg minor 30; erit is nuerg epacta; si vltra 30, abiechs 30 reliquu erit epacta. 1. ut sic in exemplo aureg nuerg an: 1633 se. 19 ductu in 11 facit 209, q di: 209 p 30 p qdote (q hie n curat) relinqt 29. erit go 29 epacta 2du Iul. kalend. uisa p 30, p qdote (q hie n curat) relinqt 29. erit go 29 epacta 2du Iul. kalend.




Gregoriana siue Noui Kalendarij inuentio.

Ponant cyclus aurei nueri in directu serie sua naturali ad finem vsq cycli decemnuenialis (v: sub fine sic vides) sic factis, obserua, q nueri in ea serie tu stinuo locu occupent, nueri n. quouis loco 40 pphicti erunt semp infallibilis epacta currentis anni cu aureo nuero coincidentes; qd si aureg nuerg fuerit datu, q p a punctato nuero seu coincidente locu obtineat, addent ad eu 30, ut vera habeat epacta; si iteru datu fuerit aureg nuerg, 2du a punctato nuero locu obtinens, addent ei 20 pro vera

vera currentis anni epacta, tertio iterum coincidit cu epacta, 30 et 30 addant, in ea abijci debet.

Tabula cycloru	j.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
-------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ufus Epactarum in Nouilunijis inuestigandis.
 Nosse debet nouilunij quouis mense, assume epacta currentem, eamq in cyclo epactaru Calendarijs
 fere in pleriq officijs v. Breuarijs primo (5 in epacta ordine retrogrado notant, ut sic facilius a diebus
 mensis dignoscant), dies mensis huius epacta currenti respondet nouilunij; qd m. bre potes ex
 tabula apposita, si epacta currentem ponas in superiore parte abaci, arealis n. dies mensi respondet
 nouilunium. †.



Et h[ab]et nouilunium astronomicu[m] n[on] esse cadat in illos dies (ex Thebomico n. calculo Anno, Vg. 1628, cuius epacta e[st] 24, v[er]o alias nouilunium est 9 Ianuarij, 5 febr. 7 martij etc. ille vult e[ss]e nouilunium 6 Ianuarij, 4 febr. 5 martij etc.) nullu[m] t[ame]n sine error[ibus] notabilib[us] oriri pot[est]; na[m] ia[m] cautu[m] e[st] q[ui]a[m] pat[et] rei difficultas, ne epacta vel vo[ca]b[ul]o die nouilunium vero, nisi rarissime, p[re]cedant: s[ed] plerumq[ue] pot[er]it sequant[ur] vno die, v. biduo q[ui]d[am], et saep[er] in eundem diem incidat. Nota v. q[uo]d vno nouilunio ad alteru[m] s[un]t dies 29, hora 12, minuta 44, et 3. cu[m] q[ui] epacta p[re]cedant p[er] dies integros, minuta illa n[on] p[oss]unt p[ro]p[ri]e delibent in dies integros, vt si lunorib[us] aliq[ui]b[us] assignent[ur] dies 30, alijs vero 29, atq[ue] ita lunos hora 6 mensiu[m], februarij, aprilis, Junij, Augusti, Septembris, Nouembris s[un]t 29 dieru[m], in istis mensib[us] epacta 24 et 25 vni et eidem die in Calendario assignant[ur], sc. 5^o februarij, 5^o Apr. 3 Junij, 30 Aug. 29 Septembris: et 21 Nouembris. veru[m] q[uo]d utraq[ue] illa epacta s[un]t e[ss]e in vsu, scribenda e[st] 25 alio colore, vel caractere ad lat[er] 26^a immediate p[re]cedentis: porro extra haec 6 loca epacta 25 alteris coloris scribi debet ad lat[er] 25^a ordinaria.

Not 2^o. q[ui]do currit epacta 25 cu[m] nu[m]ero aureo maiore, q[ui]m ii; tunc in vsu erit epacta 25^a scripta ad lat[er] 26^a dig[no] colore vel caractere, q[ui]do v. currit epacta 25 cu[m] aureo nu[m]ero n[on] maiore, ii, tunc in vsu erit epacta 25 ordinaria, q[ui] in 6 locis ia[m] notatis vna cu[m] epacta 24^a scribit[ur]. Itaq[ue] Anno 16^o septis[imo] seculi in vsu erit epacta 25^a ordinaria, vt apparet ex cyclo n[ost]ro .†

Not 3^o. q[ui]do epacta e[st] 19 et simul aureg nu[m]er[us] 19, in fine Decembris ad lat[er] epacta 20 apponenda e[st] epacta 19 alteris characteris, q[ui] tunc in vsu erit; q[ui]d[am] t[ame]n s[un]t Anno 1634 et iteru[m] s[un]t Anno 1633, et postea n[on] nisi bis v. ter ante aliquot milia .† .† .†

Caput 8. De cyclo solari .†

Cyclo solaris fuit literaru[m] dominicaliu[m] e[st] reuolutio 28 annoru[m], posterea q[ui] litera illa post 28 annos eodem ordine reuertant. Procreant hic cyclo 28 annoru[m] ex multiplicat[ur]e 7 p[er] 4, cu[m] 7 s[un]t litera dominicales ob 7 dies septimanae, et 4 quous[que] anno vni[us] interual[is] ~~annu[m]~~ ac p[er]inde ordo illa 7 literaru[m] tunc interrumpat[ur], inuestigat[ur] a. hic cyclo eo modo. Anno 16^o dato addant[ur] 9. (Xij n. fuit natus anno 9 cyclo solaris) et collecti diuidat[ur] p[er] 28, nu[m]er[us] in quotiente indicat, quoties cyclo a natiuitate 16^o sit reuolut[us]; Residu[us] v. erit nu[m]er[us] cyclo solaris anni p[ro]positi; si aut[em] nil relictu[m] fuerit post diuisionem, vltim[us] cyclo solaris s[un]t 28 agitur .†

Caput 9. De inuentioe bissexti et littera dominicalis .†

si ad annos 16^o p[ro]positos Vg. 1633 vis bissexti currentem et littera dominicalen regere; partire annos 16^o p[ro]positos p[er] 4, si nil sup[er] e[st], ann[us] p[ro]posit[us] e[st] bissextilis; si aliq[ui]d, cois, quotiens a. ex diuisione p[ro]ducta indicat annos bis sextiles elapsedos. Illud itaq[ue] (sc. quotientem coniungito ipsis annis, q[ui] in sup[er] fugaddito, si q[ui]dem d[omi]n[us] littera dominicalen idu[m] Juliamu[m] Kalendariu[m]; si Gregorianu[m], q[ui] erunt addenda: q[ui] bene obseruand[us] hanc deinde sumam diuide p[er] 7, q[ui] sup[er] fuerint, erunt currentes instantis anni soc itaq[ue] q[ui] sup[er]ant, vel 7 si nil sup[er]uit subtrahito ab 8 et residuu[m] computa in ordine literaru[m] ab Amispendo, et littera responderi currenti seu vltimo nu[m]ero, erit littera dominicalis, q[ui] in anno coi renouat[ur] a Kalendis Ianuarij ar. in bissextili v. a 25 febr. vsq[ue] ad finem anni. NB. bissextilium idu[m] diei, q[ui] bis legat[ur] in martyrologio Romano; sexto Kalendas martij, 2 se. dieb[us].

1633	408	1 ^{us} post bissextili
444		
1633		De L. dominicalis
408		
add. 9		8
1642	242	7
777		
63		

hig

mensi in Kalendario e affixum, sed ineta luna motu nunc ferig, nunc citig stringit; discessit tu
 Ecclia a more Sadaoru in hoc, qd Pascha n in ipsa 14^a luna ji mensis, vt Sadaei, s. in dnica sequente
 14^a iugerit celebrari, vsq ad luna 23^a vt decreuit S. Victor de conse: Dist: 3. cap: celebritem circa annu
 Dni 198, qd colligit antea paulo ab 8 Pio ee decretu, affirmatig e in iulio Nicensi ealedonensi ek.
 qd Ecclia deo fecit jo in Senoren resurrexerat Xti, q post Pascha Sadaei resurrexerit. 2o ne cu Seneiens
 quartadecimanis aggruamg. t. Vt v. xitas celebrandi pascha q totu mundi. (quatu distas meridi.
 anori patib) seruareb, statuit Conciliu Nycenu, vt agnoctio verno tribueret dies 21 martij, ex quo
 definiti dicit luna 14^a. vide colligit illu diem 14^a luna, q antecedit 21 martij, spectare ad vltimu
 anni lunaris mensem, nec ee aptu ad celebritem pascha; q v. dies 14^a luna cadit in 21 martij, vel q
 post 21 martij occurrit, apta e ad celebrandi Pascha; vide patet jum seu citissimu pascha versu by-
 emem celebrari post 22 martij, na si dies 21 fit sabbatu, et in eundem diem cadat 14 luna, sequiti
 die erit pascha. quare paschale nouiluniu n pt citig cadere, qm in 8 martij. s. quo die ad 5 Aprilis
 inclusiue, et n vteriq stringere pot nouiluniu Paschalia; si a. 5 Apr. fit nouiluniu, die 18 erit 14 luna,
 in qm diem si cadat dnica, distat pascha in septem dnica, q erit 25 April: post qm diem ex decreto
 Nyceno pascha celebrari n pt; dies itaq qly pt pascha celebrari st 35, nimiru a 22 martij ad 25
 April: de quo versu antiquus:

Pascha, nec vndenas Apriles ante kalendas; iijus kalendas Apr: e 22 martij.
 Nec post septenas maij valet esse kalendas. t. 7^o kalendas maias, 625 Apr: festu s. Marci. t.

Inuentio Pascha. t.

Dato quouis anno epacta currentis anni qre in cyclo epactaru, qstuentiu plenilunio paschalia inuallu
 (Pascha n vt dicit e dte celebrari die dnico, q qre succedit 14^a luna primi mensis Nisan. v. con:
 Nycenu) Ita qo epacta, ab illa inclusiue nuera 14 dies, seu 14^a luna, q cadit vel in 21 diem agnoctij verno,
 vel ea seq. Sabito qo die nouilunij inuestiga littera dnicalem currentis anni, et hanc nota in cyclo
 literaru dnicalu, dies n q hui responderit dabit Pascha. vt v. qo epacta huius anni 1632 e. 8. notata
 ad 23 Aprilis, si inde deorsu nuerent 14 dies, luna 14^a cadet in 5 Aprilis, q est dies luna; qrendo qo epacta
 littera dnicalem sequentem q e. C. pascha celebrabit, ii. Aprilis; hae praxis antiquo versu ita exprimit;

Post Martis Novas, vbi fit noua luna require;
 Bis septem completo dies, vt pascha sequatur. t.

Flabito Paschata facillima erit reliqua festa computare, si n. retrorsu ab illo die paschatis, nueres 7 dies,
 Sabebis dnica palmaru, si 14, dnica passiois, si 21; latate; oculi, Romingere, quingagesima, sexage-
 sima, tuagesima. ek. quadregesimalis vero dnica zhenet hoc verba: PILORI, cuius ja littera seqat
 dnica palmaru, da, Adia ek. Antioru si computabis; a Paschatis die nuera 7 dies, e dnica in albis,
 iteru 7. e dn. misericordias; iteru 7 p. dn. iubilate; 7 p. cantate, 7 p. vocem iuuentutis, q et initiu e
 septimana rogationu; stientig hoc vocabulo ois illa dominica: AMICVR. in feria 5 Rogoium e festum
 ascensionis dni, hanc seqt dom: Exaudi, altera v. hanc seqt Pentecostes, et seqt hanc dom: ita trinitatis,
 cuius feria 5 est festum corporis Xti, post qd nullu toto anno occurrit mobile festu, nisi dom: Prouentis.
 Amue.

Inuentio Dominica Adventus.

Vide in qm diem mensis cadat littera Dominicalis currentis anni, inter 26 Novemb. et 4 Decemb. dies mensis in hoc spatio completis. Adens littera Dominicalis currentis anni est Dominica adventus.

Not. 1. si Pascha incidat eam littera Dominicali, eod. die n. ea celebrandi s. in sequentem diem Dominicam differendum, ne 2. in iudicis consideramus. Not. 2. Index intervallu s. mag. et ming; mag. e. spatu inq. pentecosten, et ja Dom.

Adventus, qd. intervallu, s. septimanar. s. s. in investigat. Vide qd. sunt Dominica post Pascha vsq. ad diem s. Georgij inclusivè, q. in 23. Aprilis incidit, tot n. Dominica addenda s. ad 24. ut compleat. nuers. Dominicaliu inq. Pentecosten et Adventu; si v. Pascha in ipsum festu. incidat, erunt s. s. s. septimana 24. si v. Pascha post festum s. Georgij incidat, erunt 23. . . .

ming. intervallum. e. s. v. Nativitate Xti, ac Dom. quingagesima; qd. sic inveniunt, adde dies 6. ad 31. nimiru. reliquos dies a Nativitate Xti vsq. ad Kalendas Januariar. ad ipsos dies Januarii. et collecto huius adde dies q. s. a Dom. Esto mihi etc. vsq. ad finem Januarii, sumam hanc divide q. 7. quotiens dabit septimanas; fractio. dies. . . .

De 4. Temporibz.

4. tempora, seu quatuor Ecclia. Secunda. occurrunt fere feria 4. 6. et 7. quia post festu. s. Lucia, post ja. Dom. quingagesima, post Pentecosten, post festum sancta. crucis in Septembri. . . .

Caput. 12. A quo die Seditomada. glibet dies mensis anno quovis ppo.

hito denominet, item feria. inveniunt q. totu. annum. . . . Primo loco dixerunt est, q. littera Dominicalis ja. diei cuius mensis in Calendario pfigat, qd. ex soru. versuum vobis facile colligere potes.

Istra, Dabit. Dns, Gratiss, Beabit, Egenos, Gratia, Christicola, Teret, Aurea, Dona, Fideh.

Nam ja. vox istra ja. mensi Januarii, da. februario etc. venit; ja. a. littera cuius vocula refert eam Dominicalem, q. cuius mensis kal. nis e. pposita. sic kalend. Januar. dedit. A. februarij. D. martij. D. etc. mita. n. ja. littera Dominicali cuiuslibet mensis facile illes a qua feria. quis mensis incipiat; na. si in digitoru. articulis a littera Dominicali anni ppositi. inclusivè nuers. in sequentes literas ordine alphabeti vsq. ad ea. littera, q. kalendis dati mensis pfixa e. indicabit. nuers. articuloru. quos in digitis pcurrit. nuersum feria, a qua mensis incipit ducit; si vero festu. aliqd. cadat. Vg. in 25. martij, abiectione 7. quos potes. serva. nuersu. reliquum, deinde ut ante fecisti in articulis digitoru. a Dominica littera ista. mensi pfixa vsq. ad littera. Dominicale. currentem istij. anni nuera. et ante relictu. nuersu. ex abiectione 7. a littera mensis, et finis nuersationis dabit feria. . . .

Caput. 13. De Inventione loci solis in Zodiaco.

Vt. seras. quoniam in signo et gradu. Zodiaci. plq. ming. sol. quotidia. comoret, nota. ja. oportet, in qd. signu. quovis. mense. sol. ingrediatur, qd. ex his versibz. diges.

sunt: aries, taurus, gemini, cancer, leo, virgo, libra, scorpis, arcitenens, caper, amphora, pisces. . . .

Hac

Hae n. 12 signa eodem ordine 12 mensibz anni, sumpto a Martio principio, veniunt, sicut n.
signu .i. arietem ingrediens sol in martio, & in aprili etc. deinde dicendum est, quo mensis die sol
in signu ei attributu ingrediatur; qd vt facilius operis, dicendi sol sequentes versz, & dentes singulis
cuiqz mensis, signis: *Incluta, Laus, Iustus, Intendit, Haresis, Horret,*

Garrula, Grex, Gregu, Faustos, Gratia, Honores.

Nam 12 voces horu versz eodem ordine respondent 12 anni mensibz, initio factu a Januario, ita
vt ja vox, *Incluta* tribuat Januario etc. igit vt diem habeas, quo sol in signu prout mensis intret,
vide, quata littera sit in alphabeto ja littera eius vocis, q opposito mensi dedit, sol n. unitates ex 30
subtrahat patefaciat diem ingressu solis in signu illig mensis, vt Vg. siue volo quado ingrediatur sol, & sub-
traho 8 (ga littera maij e 8o in loco alphabeti) a 30 diebz Aprilis scilicet, remanebit 22, qd 22 die Aprilis
sol tauru ingredi; si v. cupias siue, quo in gradu sol sit quousqz tauru Vg. 26 Aprilis, adde diebz mensis,
in quo factu siue vis, tot unitates, qd ja littera ipsi mensi dedit in alphabeto locu obtinet ab. s. m. b. o.
ando, q in Aprilis Vg. e. H. *Bona* littera alphabeti, et addita 26 faciunt 34, q numero, ga fugat 4 unita-
tibz 30, in sol n. amplius e in arietis s. in 4 gradu 8. t.

Caput 34 De computu luna .i.

Not. Anny embolymicqz lunaris sumit a graeco, ἐμβολιμικῶν: infero, iniicio, eo qd in 12 lunae aliquando
inferat 13 lunae, hoc a. tunc fit, quado in aliquo ex his 12 diebz Ianuarij incidit nouilunium,
seu qd idem e. si 12 diebz finiat aliqua luna, certu erit, illu annu ee embolymicu, na annu eois sola-
ris fugat eois lunare 12 diebz, vt supra dictu e cap. 30, ille n. et dies 365, die 354. qd si 12 diebz
Ianuarij finiat luna, ea spectabit ad Ianuariu, et addu vsqz ad fine anni sufficiens spatiu erit qd 12 lu-
naribz, sicut erunt 13, vti anno 1628 scigit, ga tunc luna finita e intra 12 dies Ianuarij .i.

Not. in spatio 19 annoru solaru, recurrit annu embolymicqz lunaris septies, scilicet 3. 6. 9. 11. 14. 17.
et 19, cu n. annu solaris fugat lunarem 12 diebz, post tres annos fugat 33 dies, quoru 30 sumunt qd
lunae embolymica anni 38, et ita in alijs demiceps .i.

Inuentio Nouilunij .i.

Nouilunij regies, si exactam currentem ab exacta 12 diei mensis auferas, v. si exacta currentis sit
maior, qm ja mensis, a 30, et reliquo numero exacta 12 mensis adicies, numero n. reliquo, vel conce-
uatq, addita prout unitate, dabit diem Nouilunij; vt vis siue quoto die maij anno 1632 incipiat Nouilu-
niu, exactam currentem, 8 se. subtrahat ab exacta 12 diei maij, qe 28 manebit 20, et adde unum
st 21, qd 21 maij erit nouilunium. Auerte tn. in mensibz, in abq exacta 24 et 25 eisdem diei affer-
pta st, inq exacta currentem et ja diei mensis nihil addendu e, numero illi reliquo, vel sublato: quare
a siue possis cuiqz mensis jam exactam, docebunt te sequentes versz:

Stella, Inuat stellam, Inuat, Haec Gaudere, Fidelem,

E Vere Clamores, Benedicat et Astra Viator. Cuiq ja littera spectat Ianuariu,
cui haec vox respondet, iniice ab x. asterisco se. 2da vox, Inuat, ja littera spectat februariu
cui haec vox respondet, habere exactam 29 etc. vide potius in officio, v. Breuiario. t.

In-

Inuentio atatis luna.

Mediante numero epactary atas luna quouis tpe sic dependit, accipe anni, in quo grs ata-
 tem luna, epactam currentem, deinde nuera a martio facta, quora, qd sint menses, ad tuum
 oppositu mensem, nuera illu adde epactis, ducto tandem adice dies dato, et habebis atatem luna
 qd si nuera maior fuerit 30, siue reiectis residua erit atas luna; sic 60 nuera retro tot dies, et
 totius numeraris dabit tibi diem nouilunij. Vel m. quot dies efluxerunt post nouilunium, tot die
 era luna erit: Vel sic: epacta illig anni, et dies mensis currentes simul addant, summa eoru si n
 exceperit 30, erit atas luna, si exceperit, ille excessu erit atas luna; et sic tm regit qd januar.
 et febr: Vg. si 25 Januarij qto atatem luna, addo 2 ad epactam currentem sic fm. 1632 sc
 8. et sunt 30, qo luna tunc e 30 dierum, si 19 Januarij, addo 18 et erunt 23, qo tunc erit 23 dieru
 atas luna. An reliq v. mensibz decem addant infus nuera kalendarij: q singulis kalendis vnu
 incipiendo a martio, ut Vg. si 27 martij grat, qm atate habeat luna addant 27 ad epacta. Vg.
 24, sunt 53, cui qd martiu addit vnu, et sic erunt 52, na abiectis 30 restant 22, et tot di:
 era e luna. q aprili addant duo q maio 3. q Junio 4 etc. +

De loco luna in zodiaco.

Quo in loco zodiaci, gradu, signu luna,posito quouis tpe verset, collige sic: atatem luna inuenta
 zodia, addita grig vnta, nuera q ductu e 5 partire, quotiens n dabit, qd signu integris lu-
 na a sole rdu successioem signoru distet: vntes a reliq si q fuerint, dabunt quas partes signu +

Vel multiplica atatem luna e 13, ductu e 30 diuide, quotiens nuera signoru, qd luna rdu signoru successio-
 em distat a loco, ubi in nouilunio erat, dabit, reliq v. nuera dabit grad: inuenta qo loco solis tpe
 illig nouilunij faula regies locu luna.

Inuentio aspectu solis et luna.

Inuenta certa die et hora nouilunij, reliq eig 26 figuree inuenta n erunt difficles; na si a tpe coitu
 luna cu sole supputaris dies 40 horas 22, 7 minuta, 20, qd si feceris, habebis aspectu, quo luna distat
 a sole 60 gradibz, seu duobz signis: rursum si ab hoc puncto nouilunij nuera 7 dies, horas 9, minuta 11,
 habebis hora ja, seu aspectum jm quadratu, quo luna distat a sole 90 grad: seu 3 signis; hinc si rursum
 a die nouilunij nuera dies 9, horas 20, 14 min: 43, quoniet trigon aspectu, quo luna a sole abe
 120 gradibz, seu 4 signis. porro si rursum a die nouilunij nuera 34 dies, 38 horas, min: 22; obtinebis
 plenilunium, sua horam rda: si modo q aliorum 7 dieru totidemz horary et minutary. (qoo supra
 factu e in nouilunij ja hora) numerarem a die plenilunij, rdtu 3a hora, luna iam decreseente.

Quot horas luna a iunctioe digredens luceat sup horizonem.

Si hoc dies quouis die; multiplica atatem luna tpe dati q 48 ductu diuidat q 60, quotiens dabit
 horas, reliquum minuta, qd supra horizonem occidit sole luceat. si vero atas vltra 15 gesserit,
 tunc subtrahit illu a 30, et reliquu die in 48, qd si, ut ante factu q 60 diuideris, dabunt hora luis
 luna sup horizonem, post occasum solis. + +

De eclipsi.

Nunqm fieri eclipsin, nisi in plenilunio, vel nouilunio, seu qd idem e, in iunctioe seu op-
 positioe luminariu; ut a inuenias, vtrum dato quouis tpe nouilunij, vel plenilunij stingat
 Eclips.

1630	1
	2
	3
	4
	5
1635	6
	7
	8
	9
	10
1640	11
	12
	13
	14
	15
1645	16
	17
	18
	19
	20
1650	21
	22
	23
	24
	25
1655	26

Eclipsis, sic operare; in ingre iuxta superiores regulas nouilunium, aut plenilunium ali-
 cuius mensis, deinde observa, in quo gradu Zodiaci sint; sol, luna, caput et cauda Draconis; si
 ue nodi ecliptici, q̄ q̄a, si in vno gradu veniant, nris erit eclipsis solaris, q̄ xtingit sp̄re no-
 uilunij; si v. duo lunaria cent in opposito gradu signora, et Nodi in alterutro, erit eclipsis luna-
 ris nris, q̄ semper xtingit in plenilunio; vt a. inuenias locū nodorū, observa radicem positam ad
 annū 1631 cuius initio nodus fuit in 30 gradu 8, mouet autē 19 dieb; vno gradu, et 3 minutis.

Tabula veri motus . . . siue nodorum capitis et cauda
 Draconis

Motus in Annis				Motus in mensib;			Motus in diebus.					
Radice es	Signa	grad	minu ta.	Mon ata	Signa	Grad	Min uta	Dies	Signa	grad	min:	
1630	1	2	17	35	Janu arij	11	12	9	1	11	29	57
	2	1	28	16					2	11	29	54
	3	1	8	56	Febr uarij	11	30	40	3	11	29	50
	4	0	19	33					4	11	29	47
	5	0	0	13	Mar tij	11	28	22	5	11	29	44
1635	6	11	10	54					6	11	29	41
	7	10	21	34	April is	11	26	46	7	11	29	38
	8	10	2	11					8	11	29	35
	9	9	12	51	Maig ij	11	25	8	9	11	29	31
1640	10	8	23	32					10	11	29	28
	11	8	4	12	Jun ij	11	23	32	11	11	29	25
	12	7	14	49					12	11	29	22
	13	6	25	29	Jul ij	11	21	54	13	11	29	19
	14	6	6	10					14	11	29	16
1645	15	5	16	50	Aug ij	11	20	15	15	11	29	12
	16	4	27	27					16	11	29	9
	17	4	8	8	Sept ij	11	18	40	17	11	29	6
	18	3	18	48					18	11	29	3
1650	19	2	29	28	Oct ij	11	17	2	19	11	29	0
	20	2	10	5					20	11	28	56
	21	1	20	45	Nov ij	11	15	26	21	11	28	53
1655	22	1	1	26					22	11	28	50
	23	0	12	6	Dec ij	11	13	48	23	11	28	47
	24	11	22	43					24	11	28	44
	25	11	3	23					25	11	28	41
	26	11							26	11	28	37
									27	11	28	34
									28	11	28	31
									29	11	28	28
									30	11	28	25
									31	11	28	22

versus tabula . . .

Conducatuꝝ ob et v. spaco-
 nis, verū in zodiaco locū sic
 opare. Vide indiciem anni dati
 in 1a colūna, et nūeros in sig-
 nis, gradib; et minutis. Addeat
 exceꝝe; simili; mensis dati nūeros
 in 2da colūna, demū diei in 3a
 colūna, quos cōs xxxlxxv
 positos ita ordinato, vt signa sig-
 nis, gradib; grad; ek. Addeant q̄b;
 positos, addeat oēs illos nūeros a
 minutis incipiendo, notando in-
 ferim, si occurrerint minuta
 vltra 60, 60 eē gradib; addenda,
 reliq; 9 minutis relinquit; sicut si
 grad; creuerint vltra 30, totos, quo-
 tias fieri p̄t, reliq; relinquit eē
 addenda signis; pari rōe si signa
 creuerint vltra 12, abiectis semper
 12, reliqui nūeru dare signa ab-
 soluta (ab ariete inclusive inci-
 piendo) grad; et minuta. . . .
 NB. si radices annorū fuerint re-
 uoluta, tū addendū eē vnu gradū,
 et 15 minuta, et sic rursūm rā-
 bere 93 annis, bis re-
 uolut; rursū tot ad-
 denda, et sic in
 infinitum . . .

Nota q̄ hac tabula q̄ dñr in fine hui; tractat; cap: 15.

1^o Cuius mensis 30 dies dicitur Kalenda, a Mensis. +
 verbo latino, obsoleto, vel a graeco. Idem et alij sequentes dies denotant a Nonis: nona a. n. hnt in sin-
 gulis mensibus dies 30 multos a se denotatos, na alij hnt 6, alij 4 hnt iuxta hunc versum:

Maius 6 Nonas, october, Julij et Mars,

quatuor at relig dabit Deus cuiuslibet octo. + Itaq dies 29 maj dicitur 6^o Nonas
 maias, dies 29 Januarij 4^o Nonas Januar: etc. In quilibet autē mense sūt 8 dies denotati
 ab Idibz, ut in versu citato dicitur, dies sequens Nonas alieius mensis vocat 8^o Idz, ut Vg. Dies 6^o Iu-
 niarij, octavo Idz Januar. Quorum nomen putat indedictu, qd mensum fere equalit diuidat, na
 in ijs 4 mensibz, q hnt 6 Nonas, incidit in diem 15 mensis, in alijs vero in 13. Reliq dies ab
 Idibz ad finem mensis denotant a Kalendis mensis sequentis. Vg. dies 17 martij dicitur 17^o Kalendas
 Aprilis etc. Ex his sicut et ex precedentibz patet, eas 4 series, q in Kalendario Breuiarij Rom:
 v. in libellis pccū inferri solent, ita ee videntur, ut in ja serie ad singulam ponat cycly epactaz
 in 2^a littera dominical, in 3^a denotio dieru a Kalendis, idibz etc. in 4^a seu intima sūt dies mensis,
 qd a colligat, quod dies quilibet mensis habeat, dictu e supra de mensibz, cap. 2 vel 3^o.

Caput 16. Erroru piquatuz mexio. +

- 1^o Erre noie hie vlgim certam annoru seriem, ut sūt Vg. anni mundi, anni Iohis, anni olympiadu,
 anni Xti etc. cuiusqz fregis de ijs fiat mentio in ephemeridibz, cumqz e epactas vltuz indagari
 possit, cu deniqz e chronologia astronomica vtilis sint, breuit supua abtingam. +
- 2^o Per Era autem Xti e in ordine ad qm reliquas aras exponem. Vgo ea annoru seriem, qua annos
 a Xto computamz, et iuxta qm hunc sistentem hntu dnuim e annu Xti 3632. Hunc v. modu supu-
 tandi Era q annos Xti, q docuit Dionysij exiguus, Abbas iuxta annu Xti 527 spte Theodorici Re-
 gis Italia, cu antea in Xti nos in vsu eent Era Diocletiani, postmodu v. circa annu dmi 600,
 canon Dionysianz festoru mobiliu passim in ecclia receptz est. +
- 3^o Anni mundi seu a creaco ja mundi dngimode a dngis nuerant, orientales seu Graeci nuerant a creaco
 mundi ad Natiuitem Xti dmi annos 5508, occidentales 5198 ut in Romano martyrologio: Hebraei
 recentiores nuerant pauliores se 3760. Item Historici pleriqz, quoru alij ponut 3949, alij (ut
 Salsiang) aiunt, Xti nati anno mundi 4102, Bellarming vero, et nouissa Petauis, ponunt natu 3984.
- 4^o Olympias vna stnebat 4 annos solares, quoru quis dicitur annu olympiadu 24ans diebz 360, 199 sic-
 bant varia olim intercalates, olympias v. stnet dies 1448. Anni a Iohis supputant a ja olympi-
 ade, ita ut hnt 5 Iohis sūt annu 39 olympiadu, 78 olympiades iuxta quosdam capunt annis 114
 ante Xti: Bellarming paulo alit, ponit 114 labentes. +
- 5^o Anni ab vrbē condita nuerant ab olympiade 6^o anno 3^o iuxta Varrone; itaq pcedunt Natiuitem
 Xti annis 153. soling a. art. Romam conditam olymp: 7. anno jo. itaq pcedit Xti Annis 153.

38

Idem ex Dionysio Halicarnassaeo alijsq; colligitur.

- 6^a Era Nabonassarum cepit anno 747 ante X^m, qua era vltis plurimū Ptolomeg. 1
- 7^a Annos Regni Graecorum nuerant libri malabaron a Rege Seleucido ante X^m an: 308, vel Drimalios 312. vocant era Seleucidarū, vel Seleucarnaim. 1
- 8^a Anni Juliani dicitur, q; edito Julij caesaris apud Romanos in vsu fuerunt; Julij n. anno vita sua penultimo Kalendarū Romanū correxit, n̄ ita tū. q; p̄ errorem supra dicti, alius, et ex Pontificū vitio obrepperit; illi sc̄t, q; q; Kalendarij cura data fuit, diem vñū intercalarunt 3^o quouis anno, q; d̄ dōbat m̄si 4^o anno fieri; long factū ē ab anno 70 Juliano ad 37 inclusiuē; vnde 12 sequētes anni iussu Augusti intercalōe caruerunt, nempe ad annū 49 Julianū, vt sic prior error corrigere, itaq; anno Juliano 53 ja legitima intercalō facta ē; de hac correctioe vid. Macrobi. l. 1. Saturn. c. 14. vbi annū 2450^{is} seu correctiois aut suae dierū 4404. Anni Juliani p̄cedit annos X^m annis 45 iuxta suggestioem Varronis; verū iuxta Halicarnassaeū annis 44. Alij Imperiū Rom. incēant a fore, quo Julij Caesar Pompeium deuicit; alij a triumuirata Augusti. 1
- 9^a Era Hispanica, cuius saepe mentio fit in rebus Hispan. incepit 37 vel 40 anno ante X^m.
- 10^a Monarchia Romanorū, seu anni Aetnae victoria cadunt in annū 30 iā q; 4 menses inelobatu ante X^m; anno 1. 31 casta Alexandria q; festam victoriā et monarchiā asseutge Augusti, extinctis Antonio, et Cleopatra. Vnde hic q̄dam nuerant annos monarchia Romanorū, alij annos Augusti; q; q; nonnulli eos solos Augustorū annos vocant, q; fluere capunt ab anno, quo Octavianus Caesar jum Augusti ē appellatus 27 vel 28 anno ante X^m. 1
- 11^a Era Diocletiani, v. factorū martyre, incepit anno post X^m 285. 1
- 12^a Era Christi cepit anno Juliano 46 iuxta receptā calculi, iuxta q̄m nuerant hunc annū p̄ sentem 1632 vel Julianū 1678. 1. Era Gregoriana cepit anno X^m 1582. His annis p̄ q; adijcere alios, vti in ephemeridib; addunt anni Persarū, Arabū, Turcarū etc. Item p̄ q; suggestare arā libanum, seu X^missimorū Regū Gallia, a baptismo Clodouai Galliarū Regis sub annū Dni 499, vel iuxta alios 495. Item arā Imperij Austriacorū a Rudolpho 1^o Imperatore Austriaco sub annū Dni 1273. 1
- 13^a Haec dicta sunt ad aliquā sciam p̄cipuarū epactarū, ex q; facile p̄t q; ipsas int̄ se coniungere, et dicere de quolibet anno X^m corrente, quotus sit annus mundi, olympiadis etc. iā n. cu dictū sit, q; alia era p̄cedant aut sequant̄ annos X^m, hinc facile q; subtractionem et additionem poterit eas ad se mutuo reducere. Vt si gran de hoc anno, quotus sit annus mundi, ita ven inueniam, q; ante X^m fuit annus 19. 39846, illi nūero addam 1632 completos, et d̄dit summa annorū mundi; et sic in alijs p̄cedendū ē. Ceterū etsi annus natiuitis X^m sit valde incertus int̄ Chronologos, passim tū. arā X^m des incēant, Anno Juliano 45^o labente, aut inuenite 46, et eodem sp̄te X^m eē natū vulgo supponit. Sed Baronij X^m natiuitem ad biennium p̄uertit, tribuitq; eā anno Juliano 43 Cornelio Lentulo, et Valerio Messaliano Cons. Beckering.

Quo Numeri apud Romanos notari sint soliti.
 Ad quatuordecim numerum & vntes scribebatur, quatuordecim autem & vocalem sicut V denariis & X quatuordecim
 conueniens apud Graecos. L representabat quinquagenarium. C centenario. D. 500. M millenario. &
 quodsi alium numero transversa linea superduah, tot significabit millenarios, quod si se valebat vntates, sic
 I millenario significat V quing millia etc. praeterea, quod ex apostrophis DC fiunt numeri, vide hae tabula.

IDD	V	5000	quing millia.
CCID	X	10000	Decem millia.
IDDD	L	50,000	quinguginta millia.
CCCID	C	100,000	Centum millia.
CD	D	500,000	quingenta millia.
CDM	M	1,000,000	Millena millia.

Quam humoru mixtura g^o signu zodiaci causet.

In ipse in 4 digitis dempto pollice numerare ab ariete et signis idu carmina signoru
 se mutuo sequentiu cap. 13 computu eunt allata, et q in indice cadent, indicabunt nam cholera
 ricu, q in mediu digitu, melancholicu, q in penultimu, sanguineam, q demig in vltimu,
 significabunt nam phlegmaticu, vti in hae tabula subiecta vides. +

Nota & inueniendū capite aut cauda Draconis.
 cap: 14 computu eclepiasticu.

siue vis, in quo gradu zodiaci sit an. 1634. 24. Aug.
 scribere secundu radicem numeru signoru, gradua et
 minutoru, ita vt gradus denotent ea in sequenti signo
 tali gradus.

Anni	1634	Min.	13
Mensis	11	25	54
Dies	11	28	44
multipl.	22	49	111
Abiecho et addis.	11	20	55

Abiecho itaq 11 signa
 ab V. et e ob (cf.
 tali anno 24 Aug.) in
 20 gradu DC et 55 mi
 nut. cuius oppositu gradus
 in zodiaco V Draconis e 20 Virginis, na V = 8 m.
 II = 5 Dg 11; D = 11; no H; opponit, sine ex
 aspectu luna moxci et, in quo signo sit Vg. si febrilis.
 Significabit 2 signis a sole, si □, trisq; si plentium, 6. etc. tract.

Signa	♈	♉	♊	♋
Zodi.	♈	♉	♊	♋
aci.	♈	♉	♊	♋
Humores	calidu et siccum	siccum et frigidu	calidu et siccum	frigidu et siccum
Naa	Ignea	terrea	aeria	aq ^a
	choleric	melanch.	sanguinea	phlegmatica


Tractatus 3. De Geometria.

eiusq[ue] partib[us] subiectivis, seu potentialibus.


Sicut Geometria proprie sit mensura terre, in. ut e[st] et ex disciplinis mathe-
maticis partib[us] g[en]erib[us] q[ue] mensuræ rei uiginti, terra, agror[um], distantia locor[um], altitudinis turri[um], la-
titudinis fluvior[um], capacitatis arcar[um], montiu[m], sylvar[um], oppidor[um], magnitudinis totiq[ue] globi terrestris
corporis celestis, aëneis poli, æquatoris, solis supra horizontem etc. atq[ue] ut sic sumit, definit, et
suam q[ue] mensuram et gignit magnitudines et figuras, et terminos, q[ui] his insunt, p[ro]pterea ingruit res et
affectiones his accidentes, deniq[ue] varias positiones et motus, q[ui] doctrina antiquos geometra in duas
distinxerunt partes, in e[st] q[ue] proprie geometria dicit[ur]. q[ui] in planar[um] figurar[um] s[er]u[er]e consistit, et in altera
q[ue] stereometriam vocant, q[ue] e[st] corporu[m] solidor[um] s[er]u[er]e: Nos e[st] in 4 partemur species, in cyclotri-
gonometria, Spherographia, stereometria, statica, de q[ui]b[us] o[mn]ib[us] theorice et practice in sermo tra-
ctatu agetur. p. 1.


Definitiones.

1 Magnitudo e[st] id[em] q[ui] aliq[ui]s dicit[ur] g[en]er[is] s[ub]iectu[m] etc. 2 terminus e[st] extremitas magnitudinis. 3 pu-
 ctu[m] e[st] termin[us] nullu[m] divisibilis. 4 linea e[st] magnitudo longa s[ed] in, linea termin[us] s[unt] puncta. 5 linea re-
 cta e[st] q[ue] ex æquo suis terminis interijcit, puta linea recta e[st] A ————— B
 si o[mn]es e[us] partes equalit[er] iaceant intra terminos A et B. ita ut nulla pars p[ro]uberet ulla in parte
 alij. linea recta e[st], cuius extrema obumbrat o[mn]ia media. 6 superficies e[st] magnitudo longa et
 lata s[ed] in. 7 superficies s[er]u[er]e s[unt] lineæ. 8 plana superficies e[st], q[ue] ex æquo suis terminis interijcit, q[ue] ex
 definitione linea recta colligit[ur]. 9 Plana singul[ar]i e[st] duar[um] linearum in eod[em]
 plano n[on] in directu iacentiu[m], altera q[ue] ad altera[m] inclinatio; ut dua linea, A, B, C, B.
 exhibent angulu[m] planum A B C si iacentes in ead[em] plana superficie, incline-
 tur, et se tangant in puncto B. nec iacent in directu, q[ui]a si iacerent in dire-
 ctu, sicut linea A, B, C, n[on] angulu[m] sed una linea A, C exhiberent. cu[m] q[ui] ang-
 gulu[m] sit duar[um] linearu[m] inclinatio, n[on] id[em] maior erit angulu[m], si maiora sint la-
 tera, vel si maior sit lateru[m] diu[er]sio, neq[ue] poterea angulu[m] augebit[ur] a[ut] diminu-
 eb[ur], si e[us] latera augeant[ur], vel diminuant[ur].



10 Angulu[m] rectilineu[m] e[st], q[ui] rectis lineis exhibet[ur], curvilineu[m] q[ue] curvis. 11
 Angulu[m] angulo æquilatero e[st], si eor[um] latera alteru[m] alteri equalia sint,
 ut anguli A B C, D E F, si in se æqualiter, si lat[us] A B lateri D E,
 et lat[us] B C lateri E F equalia sint, q[ui] et alio no[m]i[n]e d[icitur] utru[m]q[ue] utru[m]q[ue]
 æquale, vel unu[m] unu[m], alteru[m] alteri. 12
 Anguli rectilinei æquales s[unt], si in æqualiter sumpti fuerint,
 ab æqualib[us] rectis subtendant[ur]; ut anguli A B C, D E F, er[un]t æ-
 quales, si in unig[is] anguli, latera, alterig[is] anguli laterib[us], alteram
 alteri equalia sumpta fuerint; puta si lat[us] B, A, ipsi E D, et
 lat[us] B, ipsi E F sumpta, æquale, ab æqualib[us] A C, D F subtendant[ur].





13. Inaequales v. anguli st. si, cu a lateri sumpti fuerint, ab
 inaequalibz subtendant; et maior qdem e, q a maiori,
 minor, q a minore subtendit. +

14. Quando recta sup recta existens, aequales utrimq fecerit
 angulos, erit linea perpendicularis, seu normalis, et uterq an-
 gulus erit rectus, et si recta AB existens recta CD, angulos
 ABC. et ABD aequales fecerit, uterq angulus e rectus, et re-
 cta AB ipsi CD, dicitur perpendicularis, siue ad rectos angulos, sicut
 et inaequalis recta CD, ipsi AB e d rectos et perpendicularis. +

15. obtusus angulus e q maior e recto, ut e BC.

16. si utqz vero, q minor e recto, ut angulus e BD, q recti minor e BD.

17. figura e magnitudo, q sub vno, vel pluribz 3mis distinctis.
 Rectilinea vero figura st, q rectis lineis continetur; atq ea utri
 multiplicibz diuidunt, in trilateras, seu trigonas, eo qz possent 3
 lineis, quadrilateras, seu tetragonas, q 4 lineis, polygonas, seu mul-
 tilateras, q pluribz possent lineis.

18. Inq figuris trilateras aequaliteri anguli, siue Isopleurus e, q
 3a latera st aequalia, ut e BC.

19. Isocales v. seu aequilateri anguli e, q duo tm latera st aequalia,
 ut F. G. H.

20. Isocales seu gradati anguli dicitur, qd oia latera st inaequalia, ut e BC.

21. anguli rectanguli e, qd st aliquid ex angulis suis, rectum, ut
 angulus KLM, in quo angulus L sit rectus.

22. trianguli amplioris, seu obtusanguli e, qd aliquid e
 suis angulis st obtusum, ut N O P. ubi angulus O e obtusus.

23. anguli oxigoni seu acutanguli e, qd oes 3, angulos st
 acutos, ut K R S. +


De quadrilateris figuris. +

24. quadrati siue tetragoni e figura constans 4 lateribz ae-
 qualibz, et totidem angulis aequalibz, ut figura ABCD. cuius
 AB dicitur vertex. DC caps. AC et BD costa, seu latera
 aut perpendicularia, AD linea diagonea, vel diagonalis a dia-
 metris dicitur. +


25. Parallelogramon, siue altera parte longior e figura
 quadrilatera, cuius opposita latera int se st parallela, ean-
 gula eodem figura e, at n aequalia, ut CDEF, cuius oes
 anguli st aequales, n v. oia latera. +

26. Rhombus e uerso e figura aequaliteri, n tm. angula ut
 SPVT. in qua oia latera aequalia, n tm. oes anguli. +


27. Rhomboides figura e nec agangula, nec aglatera, opposita
tu. latera et angulos oppositos s^t aequales, et N O P M.



28. quing v alia figura similitera, trapezia vocant, q^u in
regulares s^t et infinita, ut in figuris adiectis patet, a b c d. e f g h. etc.




29. linea parallela seu aq distantes dnt, q^uo s^ump^t licet in
infinitu^m ducant, aequalit^{er} distant, sicut q^uo a quouis puncto ad
alteru^m p^{er}pendiculares sunt aequales, ut linea A B. D C.




30. figura aequales, seu isoperimetra s^t, q^u superficies, seu areas
aequales continent, p^{er} n. figura aequales areas continent, egi
latera et angulos salcant inaequales, ut claru^m est, q^u n. anguli
area, p^{er} rati aequalis ee, nec tu. illaz figuraru^m anguli aut,
latera erit aequalia, et figura s^upe d^uca aequales int^{er} se ee p^{er}t
circuly p^{er} rati, parallelogramon angulo cuiusq^{ue}, de q^uo demicq^{ue}.
De Circularib^{us}.


31. Circuly est figura unio^m s^umo seu linea stenta, lineam
ambitu^m seu circumferiam dicunt, intra q^u punctu^m q^uodam est,
ex quo oes linea^e ad ambitu^m ducta int^{er} se s^t aequales, ut cir-
culu^m A. Diameter v. circuli est recta q^u centru^m aita, et ad am-
bitu^m utriusq^{ue} terminata, qualis est recta C E. ex q^uo patet
illos circulos int^{er} se ee aequales, quoru^m diametri fuerint a-
equales, et est verso.



32. segmentu^m circuli est figura, q^u ab arcu seu parte cir-
ciferia, et a recta linea stent^{er}, semicirculy v. est segmentu^m
circuli, q^u a diametro subtendit, ut A B C. q^u stent^{er} arcu
A B C et recta A C. segmentu^m vero D E F, q^u stent^{er} arcu
D E F, cui subtendit diameter D E. s^t.




33. in aequalib^{us} circulis, arcu^s et segmenta s^t aequalia, q^u ab
aequalib^{us} rectis subtendunt, ut arcu^s superioris figura M C
F N, in eodem aut aequalib^{us} circulis erunt aequalia, si recta
subtensa M N. T O. fuerint aequales. item sicut arcu^s,
ita et segmenta erunt aequalia. s^t.




De corporibus solidis. s^t.

34. corp^{us} solidu^m abstracte videratu^m est, q^uo longitudo, latitu-
dine et p^{ro}funditatis dimensionem habet, cui^{us} q^uo^{dam} ext^{er}io-
ritates s^t superficies, et q^uo n^{on} nisi in sensibilib^{us} reb^{us} haec corpo-
ra p^{ro}dicant, n^{on} tu. q^uo^{dam} ma^{xi}m^e s^u sola figura p^{ro}stat, q^uo sensibilib^{us}
ine, ideo no^{men}ant^{ur} figura solidoru^m corporu^m, quoru^m ha^{ec} s^t s^upe.



35. Sphara est figura solida capax^{is}, unica superf^{ie} stenta,
ad q^uo^{dam}

44 ad gm ab vno aliquo puncto in medio posito, ses linea recta obliqua int se snt aequales, fita
 ex circūducta semicirculi mādīs, in punctu, a quo moueri coepit,
 partes eig snt axis et diameter.



35 Long e figura solida, q circuli snt a basi, et ad vnu pūc
 tū colligit; nam si a puncto sublimi ad circuli circūferentiā
 fuerit ducta linea recta, q circūduat, donec ad eundem locum
 redierit, figura solida, q gūrat est cong.

37. Cylindrus e figura solida, q circulis sntuati ad distā
 tibus, et interuista superficiē cylindrica, fitz ex circūdu
 choe parallelogrammi in locū, vnde moueri inuaperat.

38. Pyramis e figura solida, q a basi zlatera, aut zpolilate
 ra, aut m. multangula colligitur ad vnum punctum.

39. Tetraedron, sive m. pyramis ztrilatera e, q sntes
 4 trigonis, q ailatera, et aqangula sunt.

40. Cubus e figura solida, sex aequalibz et aqangulis
 quadratis stenta, stinens in se oēs mspicias proportiones.

41. Parallelepipedon e figura solida 6 stans parallelogram
 mis, et subinde 4 et duobz quadratis.

42. Octaedron e figura solida 8 trigonis aequalibz et aq
 lateris stenta.

43. Icosaedron e fig. solida 20 trigonis aequalibz et aq
 lateris stenta.


Geometriae speculatiuae Theoremata.

Theorema de puncto. stactz linea sup lineā aut planū erecta
 iten linea et sphaera snt et sphaerā stactz fit in puncto. rāe
 ga linea latine n nulla snt, et circuli seu sphaera nulla partem recti
 exemplū si e A E B tangentis in puncto N. lineam E B, iten
 sphaera G H tangentis se in puncto O.

Propositio 1a Theorema 1u.


Recta in recta cadens aut duos rectos, aut duobz rectis aequales
 angulos facit; nā si recta A B cadat ppendicularibz in C D
~~faciat utrimqz angulos rectos, qd si alia~~
 cadat, exicitat ad ppendiculu B E lineā, tunc v ga angulz
 A B C valet rectum E B C, et supē pars E B A, q cū an
 gulo A B D, valet alterū rectū E B D. patet qz duos angulos
 A B C et A B D duobz rectis eē aequales.

Prop. 2.




Prop. 2 Theorema 2.

Si duae rectae se invicem secuerint, angulos ad verticem oppositos aequales facient: si duae rectae AB, DC se mutuo secuerint in puncto E; anguli ad verticem oppositi AEC et DEB, erunt aequales, nam quae recta CE cadit in AB, anguli AEC et CEB, valent duos rectos iuxta oppositum jam, sed et recta BE cadens in recta CD, itaque causabitur angulos aequales duobus rectis BED, et BEC, ablato quod communi CEB, anguli AEC et DEB manent aequales: si alii quibuslibet, angulos AEB, et CED, quae in oppositis ad verticem, aequales esse, quod si duae rectae etc. r.




Prop. 3 Theorema 3.

Qua alterutri parallelarum perpendicularis, utriusque perpendicularis. Recta AB cadat in parallelas CD, EF, et alterutri illarum, puta CD sit perpendicularis; dico eandem BA ipsi quoque EF esse perpendicularem; sumantur namque anguli aequales BCB, et ad punctum C et E existenti ipsi perpendicularibus CE, EF, duanturque CA, DA, quae quod in triangulis ABC, et ABD latera BC et BD aequalia sunt, et BA communis, anguli ad B recti, et inde aequales, erit basis CA basi DA aequalis, angulis correspondentes ACD ipsi ADB, et CAB: BAD aequales. Itaque ostenditur angulus ECA. ADF in eum aequale; ergo et alterutri etc.




Prop. 4 Theorema 4.

Qua eadem sit parallela, in se quoque sit parallela, ut si recta AB, una eadem EF sit parallela, erunt in se quoque parallelae. Ducantur namque recta GH secans ad rectas ipsam EF in puncto G, quae quod recta GH una parallelarum EF est ad rectas, alteri quoque AB erit ad rectas, et itaque GH sit parallela EF. CD erit perpendicularis; rectae quoque AB, CD una et eadem GH sunt perpendicularis, itaque in se quoque parallelae. quod quod eadem sit etc. quae erat demonstrandum.



Prop. 5 Theorema 5.

Diameter sphaerae est incomensurabilis costae, quod probatur, quia si commensurabilis esset, numerus par esset aequalis numero impari, quod est impossibile. Demonstratur: sit sphaera, cuius diameter sit AB, costae una AC, tria, scilicet diametri sunt se ad costam AC, ut sphaerae AB ad sphaeram AC. ex 7 oppos. l. 10. Eucl. sed sphaerae AB est 25, et sphaerae AC est 9, et rursum sphaerae diametri AB dupli est ad sphaeram AC costae. igitur numerus 25 sphaerae diametri 5, dupli erit ad 9, igitur




sphaerae

et si angulus minor sit, a maiore latere subtenditur, ut si angulus ABC latq f C maior sit, qm AB. dico ipsu angulu ABC, ipso f CB esse maiorem, sumatq n. recta AD, ipsi AB equalis, duatq recta BD. qd qd angulus ABD e isosceles, anguli ABD. et ADB int se st aequales, sed angulus ADB, e ext. itemq BDC et ipso angulo BDC maior, inde internis et opposito C, quare angulus m. ABD maior e angulo C; multo go maior totus angulus fBC angulo C. qd erat ostendendum. e rursus si angulus fBC maior sit angulo C, mag m. erit latq fA subtendens maiorem angulu B, qm latq fB subtensu angulo minori C. n n erit aequale, nec minq, alias angulus fBC aequalis est, aut minor C, go erit AC mag, qm AB. sine effectu, cum lineary q ab aliquo puncto ad recta gmpia ducty, breuissima ee perpendicularis in angulo. sine aliud enonit, qd se. duo os anguli latera suul sumpta maiora sint reliquo. f.


Prop: 10 Theorema 10.

in parallelogrammo oppositi anguli et latera aequalia st, ipso vero parallelogrammum diamet. bixariam diuidit; na in parallelogrammo AB CD ducta diameter AD, anguli alterni BAD, ADC st aequales, sicut m. anguli alterni CAB et ADB. cu go angula ABD et ADC quos angulos aequales habeant, et latq correspondens AD id e angula st vndiq aequalia. quare opposita latera AB. CD st m. aequalia, oppositi iton anguli C et B, itemq A et D, et qa angula ABD, ADC st aequalia, diameter AD bixariam diuidit parallelogrammum. in os go parallelogrammo etc.




Prop: 11 Theor: 11

Parallelogramma sup eadem basi, et in eisdem parallelis constituta int se st aequalia; sup eadem basi AB constituta sint duo parallelogramma AD, AF, sintq AB. CF linea parallela, considerent deinde duo triangula CAE, DBF, in qby latq a c, aequale e ipso DB, et CE alteri DF, na CD. e F aequalia st vni et eidem AB, et addito coi DE linea CE, DF. st pares, f. et angulus BDF, aequalis e ipso C, cu in rectas CA, DB cadat CF, st go triangula CAE, DBF iuxta pdicta vndiq aequalia; quare ablato coi angulo DGE, trapezia relicta CDGA. FEGB st aequalia, et addito coi angulo ABG, tota parallelogramma st paria. f.



Corollaria.




1: Parallelogrammorum, sup basibz aequalibz et in iisdem parallelis constituta int se ee aequalia, quomuis ducantq, ut paral. legramm. ECDG et GHCD st via aequalia parallogro ABCD.



2^o. si zangulū et parallelogrammōn eandem habuerint basim, sintq; in eisdem parallelis, erit parallelogrammōn zplum zangulū, ut patet qm: $ABCD$ ē zplū zangulū DEF , e uerso uero, si basis alicuius zangulū fuerit dupla basi parall: int; eadē parallelas zstituti, erit zangulū equalis parallelogrammō, ut zangulū OMC , cuius basis ē zpla ad basim parall: BCD ē eīdem equalis, item qđt; scribens zangulū sup basim OC ad altera usq; parallelā, et qđcūq; describas, ut POC , oēs int; se sūt aequales, et parallelogrammō, cuius basis ē zstinet. 1

3^o qđs pōnt; offiri zangula uicūq; ztrati, aut parallelogrammō equalia, item zangulū dato parallelogrammō, aut e ztra zangulū equalē zangulū, aut parallelogrammōn. 1

4^o. Eīdem altitudinis zangula et parallele: sive se ut bases, ut si zangula ABC DEF habeant aequales altitudines AG PH sicut et parallelogrammā $ABCE$ et $EFDK$, ē n. altitudo figura linea ppendicularis a vertice ad basim ducta, uide figura in eisdem parallelis AD BH zstituta, eandem hnt altitudinē, et e uerso; dico tam zangula, qm parallelogrammā in eadē rōe ēē, in qua sūt bases, nā si basis BC , dupla aut zplū maior sit basi, ita m. zangulū ABC maior erit zangulū DEF , zangulū n. eā rōem int; se hnt, qm bases, et qā zangula sūt parall:orum dimidia, qm pportioem hnt zangula int; se, eadē quoq; habebunt parallelogrammā. 1



Prop: 12. Theor: 12. Parallelogrammōn oīs, eorū q; circa diametrū sūt, parallelogrammōn complementa sūt equalia; Parallelogrammā $ABDC$. $BEGF$ zstituti circa diametrū CG . complementa v. sūt parallelogrammā $ABEH$ et $DBGF$, q; dico int; se ēē equalia, nā qā diameter CG bisaria dicitur parallelogrammā circa diametrū zstituta, equalia m. erūt zangula EBG . BFG . itemq; zangula ABC et BCD , si qđ ad aequalib; zangulis HGC , et GCB sufferant; equalia EGB . et BGF , item ABC , et BCD , complementa $ABEH$ et $DBGF$ remanebunt equalia. 1

Prop: 13. Theor: 13. In zangulo rectangulo ztrati, lateris angulū rectū subtendentis equalē ē duob; sūl ztratis laterū aliorū angulū rectū zstinentiū, et si ztrati vniq; lateris duob; sūl ztratis reliquorū equalē sit, angulū qm reliqua latera zstinent, ē rectū. in zangulo ABC , angulū A rectū sit, fiants; sup laterib; AB et AC quadrata BG . CH , item fiat sup latere BC angulū rectū

sub-

subtendentis
lateris
aut AC
angulū
erunt angulū
latera AB
qđ BC et
parallelogrammō
lū BD et BC
vniq; ztrati
 BE et BC
erunt duob;
parallelogrammōn
 BE et BC
qđ BC et BC
erunt zangulū
eadēm parā
ut zangulū
ad zangulū
basi AD ad
si BC ager
ad BC ad zang
 BC ita ē
zangulū BC
fiat sit
qđ, suffer
 BC later
 BC et BC





subtendente Δ BK , qd dico est aequal^e duob^{us} aliorum lateru^m Δ ABK sicut sumotis, ducta n. AE parallela, ipsi BD . aut CK ; ungan^t n. recta AD F C , qd q^o angul^{us} D BC angulo F BA rect^{us} recto, est aequal^{is}, addito coi^o ABC , pares erunt anguli D BA , F BC , s^{ed} igit^{ur} zanguloru^m ABD , F BC latera DB , BF ipsi BC , BF singula singulis aequalia. zangula igit^{ur} ABD , et F BC s^{ed} aequalia, sed zangulu^m ABD est dimidiu^m parallelogrammi BE , cu^m sit sup^{er} eadem basi BD , ins^{er} parallelas BD et AE , et eadem ob causas zangulu^m F BC est dimidiu^m Δ ABK . quadratu^m q^o BG aequal^e est parallelogrammo BE cu^m eoru^m dimidia sint paria, qd si puncta B G , A K iun^{gan}t^{ur} duab^{us} lineis rectis; eadem plane methodo g^{er}atib^{us}, parat. parallelogramm^o EC , quadrato CH est aequal^e; totu^m q^o Δ ABK reliq^{ua} duob^{us} aequal^e est. In oi^o q^o zangulo est t .

Prop: 14 Theor: 14.




si ad unu^m zanguli lat^{us} parallela ducta fuerit, recta q^{uod}dem linea hae^c p^{ro}portionalit^{er} secabit ipsiq^{ue} zanguli latera. In zangulo ABC , ducta q^{uod} recta DE parallela lateri BC , dico latera AB et AC secta e^{ss}e p^{ro}portionalit^{er} in D et E . i. est ut AD ad DB ita AE ad EC , vel ut a ad b ita d ad c . ita AD ad DE , vel ut AB ad AC . ita AD , ad AE , ductis n. rectis CD , et BE , erunt zangula D EB et D EC sup^{er} eadem basim DE , et ins^{er} eadem parallelas DE . BC p^{ro}hibita ins^{er} se aequalia. quare ut zangulu^m A DE ad zangulu^m D EB , ita est zangulu^m idem A DE ad zangulu^m D EC , atq^{ue} ut zangulu^m A DE ad zang. D EB , ita est basi^s AD ad BD , cu^m hae^c zangula sint eiq^{uod}dem altitudinis, ut p^{ro}bat, si DE agat^{ur} parallela, recta ipsi AB ; et eadem r^{ati}o ut zang. A DE ad zang. D EC . i. basi^s AE ad basi^m EC , ut igit^{ur} AD ad DB , ita est AE ad EC , cu^m hae^c dua p^{ro}portio^{es} eadem sint p^{ro}portio^{es} zanguli A DE ad zangulu^m D EB et D EC , qd est p^{ro}positum.

Corollarium.

Hinc fit, ut linea recta, q^{uod} parallela ducta, un^o lateri in zangulo, auferat zangulu^m toti zangulo sicut, ducta n. in zangulo ABC lateri BC parallela DE , dico zangulu^m A DE zangulo ABC e^{ss}e sicut, q^{uod} anguli n. s^{ed} cu^m anguli A DE et A ED aequal^{es} sint



50 sunt angulis ABC et ACB externis, et angulus C int. quare ut dicitur hinc, circa angulos aequales latera sunt proportionalia, et homologa. ¶



Prop: 15 Theorema 15.

In triangulo rectangulo perpendicularis ab angulo recto ad basin, ducatur ad perpendicularem scilicet triangula, ad totum triangulo, et int. scilicet scilicet, et illa perpendicularis erit media proportionalis, in triangulo ABC sit angulus BAC rectus, et ex basi CB ad basin scilicet ducatur perpendicularis AD, quare in triangulis ADB, ADC anguli DAC, et ADC recti sunt, et angulus C communis, tertius ABC, DAC erit aequalis, ac proinde triangula ADC, ADB sunt aequalia et similia. si aliter ostendatur triangulum ADB esse simile toti triangulo ABC ac proinde sit in similia int. scilicet triangula ABC, ADC. ex quo patet perpendicularem ab angulo recto ad basin ductam esse mediam proportionalem int. duo basis segmenta, nam ut est CD ad DB, ita DB ad DA. ¶


Prop: 16 Theorema 16.

Datis duabus rectis media proportionalis invenire. data recta ABC in directu collocata, ac super AC fiat semicirculus ADC, cuius ad punctum B excutatur perpendicularis DB secans semicirculum in D, recta DB erit media proportionalis, ductis n. rectis AD, DC angulus ADC est rectus. quare recta DB est media proportionalis int. basis segmenta, hoc est int. duas rectas AB, et BC. datis ergo duabus etc.


Inventio media proportionalis per numeros. ¶

Media proportionalis de quatuor media int. duas, quata se habet ad minorem quoniam maior ad media, sic invenitur: due sunt in ultimis seu tertio, ductis radix quadrata dabitur media proportionalis, ut plura et multiplicare media hoc int. tria et 12, ducantur 3 in 12 sunt 36, quorum radix quadrata 6 scilicet est media proportionalis, item int. 4 et 9, quibus in se ductis sunt 36, cuius radix quadrata est 6 media proportionalis; duo a media proportionali inter quoscumque numeros invenies hanc; minorem due in se, producti in maiorem, quotiens radice cubica ostendit minorem numerum tangit media proportionalis mediantem, et in proportionali educti; ut int. 3 et 24 sic invenies due media; due 3 in se sunt 9, hanc in 24, sunt 216, cuius radice cubica est 6, deinde ut 3 in se habes, ex priori regula due 6 in se sunt 36, si divisas per 3 manet 12, est ergo triqua proportio 3.6.12, cuius proportionales duo media sunt 6 et 12 scilicet. ¶

Probl.



Probl. 5.



Coroll. j.
Problem. 5.



Dodegonu la
scrito circulo
in scriptu. Cor. 2 et 3.
Probl. 5.

Wallenstern St 30000 estu et mag-
na copia peditu parata aduersus fueru
An. 1632. 30 maij s. nondu obsequium
pabuli egnoru pofit in campos. o Jesu!

2. ex hoc patet. qd quis angulus bifaria diuidi potest, item quis linea data recta, aut perpendicularis erigi. p.

Problema 3.

Sup data recta perpendicularem erigere. Centro facto C et inter-
uallo quouis eodem describantur duo arcs secantes recta data in f
et B, deinde ex f et B eodem intervallo, v. alio si placet, descri-
bantur alij duo arcs secantes se in D, na ducta recta CD secans
AB in E erit perpendicularis ad AB. Aliter. ex quouis puncto
in linea data, et intervallo quolibet usq in C agnpto, arcs circuli
describantur, deinde ex puncto B, quolibet alio intervallo usq ad iten
C, arcs describantur, priorem secans in C et D, eritq ducta recta CD ad
AB perpendicularis. p.

Probl. 4. ad data recta parallela duere.

Ex centro f ad quous spatium describantur arcs secans BC in puncto B,
et eodem intervallo ex D sumat punctu E in recta eadem BC
deinde eodem intervallo ex f et E describantur duo arcs secantes
se in F, na ducta recta f F erit parallela BC. Aliter.
Triant duo linealia ex ligno solido ABCD, quoru extrema exa-
cte parallela duobz brachijs ST VX in vertebz suis sum-
gant, vt xpingi et dilatari gant plibitu, et paratu sibi ingitum,
q parallels, quousq n ponet lineale ABCD, semz eodem erit pa-
rallela vtraz linea quolibet modo xprita et dilatata. p


Problema 5. Circulu exacte in suas partes diuidere.

Circulu quouis fit, diuidit in 360 partes seu gradz hac methdo: jo
secat in 4 aequalis partes, seu quartantes, q diametros se ad angulos
rectos interfecantes. 2o diuide qmz quartantem in 90 partes aqua-
les, quo facto s' totu circulu diuisu. Vg. fit circulu f BCD diui-
dendz in 360 gradz; diuiso eo prius in 4 partes, vt ducti q diamet-
ros ad xcos octas ductas ABCD, diuides unu ex quartantz Vg
f C in 90 partes aequalis eo modo. sume qmz gubitem semidiametri
circuli diuidendi urino, et ex C versz f interceptam gubitem
transfer sup arcu C f, et iteru inuariato circino ex f versz C
eandem gitem transfer sup arcu f C, et s' quadrante diuisum in
3 aequalis partes, quos si circino q totu circulu transferas, erit di-
uiso in 12 partes seu horas, si hac spatia iteru bifaria, s' b' et
q diuidendi mag mxam bt vtilitem in sciosteris horologis. diuiso
itaq quartante in 3 partes, quaru qq s' 30 gradz, ter n 3 faciant q
se quartantem, diuidat q s' s' tertiaru in duas, deinde quis ex duobz
in 5 gradz, et s' b' quartantem diuisum. p.


Coroll. j.

Corollarium 1. Hexagonum describere, due semidiametru in pipheriam circuli, et meite pucta lineis, s'bis hexagonu, q'si zanguli ailateru circulo inscribere velis, iunge puncta quis 3o loco posita, medio omisso, et s'bis q'situ. **Coroll. 2.** Dodecagonu describere seu figura lateru 12, diuide circulu in 12 partes aequales iuxta dicta pbl. 5 et iunge puncta lineis, et s'bis q'situ. **Cor. 3.** quadratu describere: iunge 4 extrema diametroru circuli lineis rectis, et s'bis q'situ, si vero extra circulu d'nes, fiant particulares ad extrema diametroru iuxta pbl. 3. et p'ducta ad occursum optinent forati, cui circuly inscripty. **†**


Probl. 6. Heptagonu describere, iuxta pbl. 5 coroll. fiat zangulu ailateru in circulo, et sit ABC, quo facto due lineam ex centro A ad punctu vnu ex ante relictis, Vg ad V. secabit zangulu laty in O bifaria, dico OB et laty heptagoni, q'd si applies pipheria, habebis p'fectu heptagonu, cuiq' lateris arcu bifaria si diuidas, et puncta punctis mectas, s' sepperadecagonu. i. 14 angulorq. octogonu sic facies, describi forati in circulo iuxta pbl. 5 coroll. 3, arcuq, qm laty forati sustendit, diuide bifaria, et has partes due p' reliqm pipheria, lineis n. rectis a punctis ad puncta ductis s' octogonu, cuiq' latera si itera bifaria diuidas, s' i 10 lateru figuram. **†**



Probl. 7. pentagonu, hexagonu, et heptagonu, decagonu in vna figura describere. Fiat circuly ABCD secty suis diametris ad rectos ABDC, diametruq, o C diuide bis fariam, et ex puncto s ad internallu SA fac arcu ex s vq, in V, fiat zangulu sV, cuiq' laty AV erit laty pentagoni, A O laty hexagoni, o V laty decagoni, linea a p'pendicularis SP, laty heptagoni.



Probl. 8. enneagonu, siue nonagulu describere. Facto circulo LMN, describat' inuariat' circino tres radij, seu p'seruum regia LY, NV, MV, diuiso vno radio ex illis iuxta semidiametru circuli in 3 aequas partes, ductaq' linea p'pendiculari transuerse, ex 3 puncto sectionis vel 2 ad vtriusq' radij LV extrema, hae n. linea erit laty enneagoni, media lateris octodecagoni. **†**



Problema. 9. Hendecagonu seu 11 laterum figura describere. sume 4 partem diametri, et ad huc insup qua partem eisdem Ha, hae dabit laty hendecagoni. **†**

Probl. 10. ovalem figura describere. Fiant duo circuli CB. AF. occulti sup data rectam AB int' secantes se in punctis H et L. his factis impone pedem circini, sup punctu L et describe arcu PR radius sufficiens circuloq, CB.



dabit latq quadrati, qd aequale fit parallelogramo. +

Probl. 3. Datis duobz foratis, zangulis aut circulis, aequale eis foratu, zangulu aut circulu describere. +




Sint data duo forata $V T S P$ et $A M N O$. qbz inscribantur circuli et circulis zangula, qzibz debeat dari foratu foratis, circulu circulis, zangulu zangulis aequalis; zphituaq ex lateribz duoz foratoru, zangulu reitangulu $B C D$, et sup basin subtenentem angulu reitu zstruat foratu, cui inscribat circulu, circulo zangulu; duo foratu hoc ee aequale duobz foratis alijs, circulu circulis etc. iuxta theor. 13.

Coroll. Cum hoc duum inventu n habeat fine inventionem, poteris quicqz figura data aequale facere duobz alijs datis inaequalibz, et e ztra; na si dato forato reitangulo quouis, a latere quouis figurae descriperis, sibi th. fles, semp eadem figura ex subtenente descripta, erit dupla ad duas a lateribz descripta. +

Probl. 4. quadratu multiplicare. +

Nota. sicut se et foratu ad foratum, sic circulu ad circulu ysdem foratis inscriptu, ita ut, si foratu ad alteru fit zplu, eade analogia quoz se habeant circuli ysdem inscripti. Multiplicatur itaqz circulu a. foratu, describat foratu iuxta coroll. probl. 3, qd fit $A C B D$, ducto diagono $D C$ iuxta dati diagona describat aliqz circulu, et circulu uruudet alio forato; duo foratu hoc ee duplu ad foratu $B C D A$, sicut et circuli ysdem foratis inscripti, qz $D A C$ angulu reitu e, pnde cu forata $C A$ et $A D$ sint iuxta sint aequalia $C D$ forato, qz foratu $B D$ duplu e foratoz $C A$, $A D$. +

Probl. 5. Dato circulu zpla, zplu, zplu facere. sit dati circuli diameter $A B$, qm volumz zplare, elonget $A B$ in C , et fit $A B$ aequalis $A C$ et fit $A B$ aequalis $A D$, duo circulu ex $D C$ descriptu ee zplum priori datum. +




Finis Tractatus tertij.

tract. 4.

Tractatus 4 De Geometria Practica.

Partis ja De Doctrina finium. 1.

Simul doctrina nihil e aliud, qm scia quantitatis rectarum linearum in circulo subtensarum, ad semi-diametrum eidem circulo in certas partes divisam tantum certa portioem qm cu infinita usu habeat, in oi negotio mathematico, ideo de hac dicendi restat 1.




Definitioes. 1. ja. subtensa linea q et chorda dr, e recta in circulo inferi-pta totu circulu in duo segmenta dividens, et utruq segmentu parib subtensens, talis e in adiuncta figura, recta BC q dr subtensa arcu BCD et BCG. 1.

2o. sing recta sine recta q, e dimidiu subtensa seu chorda subtendens anglu eiq arcu, cuius dr sing recta; ut recta BH e sing recta arcu BCG et arcu BDG, q e dimidiu subtensa BC, subtendens anglu arcu BD et anglu arcu BCG, sic CH e recta sing CD et arcu CIG. 1.

3o. sing versu, q et sagitta dr, e pars diametri int arcu et sinu rectu intercepta, ut sing versu arcu DB vel DC est BH recta, et sing versu arcu BCG vel CIG e recta HG, et sing versu arcu BFG est EF.


4o. sing complementi, q et sing recta adq dr, e sing recta illiq arcu, quo datq arcu a fronte differt, ut recta BE e sing complementi arcu DB et arcu BFG, e enim sing recta arcu BF, quo prior datq arcu a fronte superat, et quo posteri-rior datq frontem superat, sic recta BH e sing complementi arcu DF et arcu BCG, cu sit sing recta arcu BD. 1.



5o. sing totu e semidiametru circuli, hoc e, sing recta, et sing versu frontis, ut FH et DH dr sing totu, qm oim sinu mixt e, cu gradibz 90. i circuli sora A respondeat, atq huc e basis oim finium alioq, q dividit sphaerometru slij in 100000 alij in 10000000. slij in plures particulas, ut haru partiu toe ois alios sing metiant, et portioes oim finium ad sinu totu exprimant; nobis satis erit in 1000 partes divisisse p dimensionibz tam geometricis qm astronomis.

Problema primum. 1.

Data semidiametro, seu sinu toto 1000 partiu guttem linearu subtendentium arcu 60. 36. 72. 18 regere. sit data circuli semidiameter AB, eidem aequale erit latu hexagoni eidem circulo inscripti p ppoem 5. probl. 5. atq hoc e subtensa sexta circuli partis. 1. 60 grady. porro dividat semidiameter bifariam in C et ducta recta CD abscindat, iuxta pblema 7. ei equalis CE, ex qua subtrahat C relinqt BC latu decagoni eidem circulo. 1. arcu 30. hac praxi additis sdratis DB et CB notis, si a puncto extrahas radicem sdratam, nota erit CB linea, iuxta 15 theor. pythagora. a qua si subtrahas linea CB, nota erit BE lineam, seu




0	0
10	000
20	4
30	13
40	52
50	72
60	207
70	272
80	296
90	220
100	24
110	406
120	410
130	414
140	418
150	36
160	59
170	59
180	59

seu decagoni latera subtensum gradibus 36, iterum foratū DE inuenta addat forato sing totiq BD. et extracta radix forata dabit linea DE, latera pentagoni seu subtensam 72 gradibus.

Probl. 2. Dato sinu toto 1000 partium, sinu rectū arcus 45 graduum inuenire.

Cum sing rectū sit cū sinu verso forantis subtensens, et unguis representet sinu totum, hoc modo procedit: Sicut illi hae praxi: foratū sing recti forato sing verso iunge, latera summat dabit subtensa arcus 90, cuius dimidiū ē sing q̄sito. ut foratū sing recti CA ē 1000 partium, foratū sing verso BA sicut ē 1000 partium, quorū forata addita faciunt 2000, cuius radice forata dabit subtensa arcus 90 graduum, cuius dimidiū q̄sitū dabit sinu 45 graduum. Similiter quod ex prop. 15 theor. 2. y. h. g.



Probl. 3. Dato sinu recto arcus forante minoris, sinum complementi eidem arcus reperire. Quadratū sing recti aufer ex forato sing totiq, latera residui ē sing complementi.

E. g. foratū sing totiq AE ē 1000000. foratū sing recti CE arcus 30 graduum ē 250000, hoc deducto de sinu toto manent 750000, cuius residui latera dat sinu complementi F. A. V. E. g. n. seq̄ ages de reliquis sinibus inuestigandis, q̄d facile fieri poterit, si primarijs sinibus erutis, reliquos subsidijs regula sinu inuenias.

Sequitur Tabula sinuum rectorū seu semichordarū posito sinu toto 1000 partium.


Min:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0	000	17	34	52	69	87	104	121	139	156	173	190	44
15	4	21	39	56	74	91	108	126	143	160	177	195	30
30	8	26	43	61	78	95	113	130	147	165	182	199	15
45	13	30	47	65	82	100	117	134	152	169	186	203	0
60	17	33	49	66	83	100	117	134	152	169	186	203	
75	21	37	53	70	87	104	121	139	156	173	190	207	44
90	25	41	57	74	91	108	126	143	160	177	195	212	30
105	29	45	61	78	95	113	130	147	165	182	199	216	15
120	33	49	65	82	99	116	133	150	167	184	201	218	0
135	37	53	69	86	103	120	137	154	171	188	205	222	44
150	41	57	73	90	107	124	141	158	175	192	209	226	30
165	45	61	77	94	111	128	145	162	179	196	213	230	15
180	49	65	81	98	115	132	149	166	183	200	217	234	0
195	53	69	85	102	119	136	153	170	187	204	221	238	44
210	57	73	89	106	123	140	157	174	191	208	225	242	30
225	61	77	93	110	127	144	161	178	195	212	229	246	15
240	65	81	97	114	131	148	165	182	199	216	233	250	0
255	69	85	101	118	135	152	169	186	203	220	237	254	44
270	73	89	105	122	139	156	173	190	207	224	241	258	30
285	77	93	109	126	143	160	177	194	211	228	245	262	15
300	81	97	113	130	147	164	181	198	215	232	249	266	0
315	85	101	117	134	151	168	185	202	219	236	253	270	44
330	89	105	121	138	155	172	189	206	223	240	257	274	30
345	93	109	125	142	159	176	193	210	227	244	261	278	15
360	97	113	129	146	163	180	197	214	231	248	265	282	0
375	101	117	133	150	167	184	201	218	235	252	269	286	44
390	105	121	137	154	171	188	205	222	239	256	273	290	30
405	109	125	141	158	175	192	209	226	243	260	277	294	15
420	113	129	145	162	179	196	213	230	247	264	281	298	0
435	117	133	149	166	183	200	217	234	251	268	285	302	44
450	121	137	153	170	187	204	221	238	255	272	289	306	30
465	125	141	157	174	191	208	225	242	259	276	293	310	15
480	129	145	161	178	195	212	229	246	263	280	297	314	0
495	133	149	165	182	199	216	233	250	267	284	301	318	44
510	137	153	169	186	203	220	237	254	271	288	305	322	30
525	141	157	173	190	207	224	241	258	275	292	309	326	15
540	145	161	177	194	211	228	245	262	279	296	313	330	0
555	149	165	181	198	215	232	249	266	283	300	317	334	44
570	153	169	185	202	219	236	253	270	287	304	321	338	30
585	157	173	189	206	223	240	257	274	291	308	325	342	15
600	161	177	193	210	227	244	261	278	295	312	329	346	0
615	165	181	197	214	231	248	265	282	299	316	333	350	44
630	169	185	201	218	235	252	269	286	303	320	337	354	30
645	173	189	205	222	239	256	273	290	307	324	341	358	15
660	177	193	209	226	243	260	277	294	311	328	345	362	0
675	181	197	213	230	247	264	281	298	315	332	349	366	44
690	185	201	217	234	251	268	285	302	319	336	353	370	30
705	189	205	221	238	255	272	289	306	323	340	357	374	15
720	193	209	225	242	259	276	293	310	327	344	361	378	0
735	197	213	229	246	263	280	297	314	331	348	365	382	44
750	201	217	233	250	267	284	301	318	335	352	369	386	30
765	205	221	237	254	271	288	305	322	339	356	373	390	15
780	209	225	241	258	275	292	309	325	342	358	374	394	0
795	213	229	245	262	279	296	313	329	346	362	378	398	44
810	217	233	249	266	283	300	317	333	350	366	382	398	30
825	221	237	253	270	287	304	323	339	354	370	386	402	15
840	225	241	257	274	291	308	327	343	358	374	390	406	0
855	229	245	261	278	295	312	331	347	362	378	394	410	44
870	233	249	265	282	299	316	335	351	366	382	398	414	30
885	237	253	269	286	303	320	339	355	370	386	402	418	15
900	241	257	273	290	307	324	343	359	374	390	406	422	0
915	245	261	277	294	311	328	347	363	378	394	410	426	44
930	249	265	281	298	315	332	351	367	382	398	414	430	30
945	253	269	285	302	319	336	355	371	386	402	418	434	15
960	257	273	289	306	323	340	359	375	390	406	422	438	0
975	261	277	293	310	327	344	363	379	394	410	426	442	44
990	265	281	297	314	331	348	367	383	398	414	430	446	30
1000	269	285	301	318	335	352	371	387	402	418	434	450	15
1005	273	289	305	322	339	356	375	391	406	422	438	454	0
1010	277	293	309	326	343	360	379	395	410	426	442	458	44
1015	281	297	313	330	347	364	383	399	414	430	446	462	30
1020	285	301	317	334	351	368	387	403	418	434	450	466	15
1025	289	305	321	338	355	372	391	407	422	438	454	470	0
1030	293	309	325	342	359	376	395	411	426	442	458	474	44
1035	297	313	329	346	363	380	399	415	430	446	462	478	30
1040	301	317	333	350	367	384	403	419	434	450	466	482	15
1045	305	321	337	354	371	388	407	423	438	454	470	486	0
1050	309	325	341	358	375	392	411	427	442	458	474	490	44
1055	313	329	345	362	379	396	415	431	446	462	478	494	30
1060	317	333	349	366	383	400	419	435	450	466	482	498	15
1065	321	337	353	370	387	404	423	439	454	470	486	502	0
1070	325	341	357	374	391	408	427	443	458	474	490	506	44
1075	329	345	361	378	395	412	431	447	462	478	494	510	30
1080	333	349	365	382	399	416	435	451	466	482	498	514	15
1085	337	353	369	386	403	420	439	455	470	486	502	518	0
1090	341	357	373	390	407	424	443	459	474	490	506	522	44
1095	345	361	377	39									

N	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
0	743.	754.	766.	777.	788	798	809	819.	829	838.	848	857	45
15	746	757.	768.	779	790	801.	811	821	831.	841	850	859	30
30	748.	760	771	782	792	803.	814.	824	834	843.	852	861	15
45	751	763.	774.	785	796.	806	816	826	836.	845	854	863	0
0	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71.	
0	866	874.	882	891.	898.	906	913.	920	927	933	939.	945.	45
15	868	876.	884.	892	900	908	915	922	928	935.	941	946	30
30	870	878	887.	894	902	909.	917	923	930	936.	942	948	15
45	872	880	889	896.	904	911	918	925	932	938	944	949	0
0	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83.	
0	951	956.	961	965	970	974	978	981	984	987.	990	992.	45
15	952	957.	962	967.	971	975	979	982	985	988.	990.	993	30
30	953	958.	963.	968	972	976	979	983	986	989.	991.	993	15
45	955	960	964	969	973	977	980.	984	986	989.	992	994	0
0	87	85	86	87	88	89	90						
0	994.	996	997.	998	999	999	1000						45
15	994	996	997.	998	999	999	1000.						30
30	995	996	998	999	999	999	1000.						15
45	995	997	998	999	999	999	1000						0

Finis Tabulae Sinuum
Hedding in Arteria 1632
3^o Martij. f. f. v.

Appendix De Sinubz tangentibz et secantibus. & Definioes.

1^a. Sinus tangens, quem alij profinum vocant seu asynptomam, est linea perpendiculariter, et in puncto tangens semidiametru circuli simul et extremam circuli superficiem, ut linea Ad est tangens, quae tangit circulu una cu semidiametro CA in puncto A.



2^a. Secans, quae alij hypotenusa vocant, seu transgressa, est linea recta ex centro, per eundem arcu, quae secat, ad tangentem usque ducta, in qua angulu facit, ut linea CD. basis deniq est semidiameter eisdem circuli, sup qua linea parita fundantur ad exhibendu zangulu rectangulu, cuius basis semp est sinus totus.

Tabula tabulae tangentiu et secantiu, ex tabulis sinuum. f.

Ex tabulis sinuum rectae, istius tabulae sinuum tangentiu et secantiu sic: si sinus arcus cuilibet in sinu totu multiplicet, quod fiet facile, si ei ad dexteram tot. 0, got in sinu toto stinet, nepe tria (ut nobis) vel 5. si sinus totus sit 5, 0, ductusq numerus dividat per sinu complementi eisdem arcus, invenietur tangens illius arcus, cuius sinu rectu in totu multiplicasti; ut si tangens graduum 30 gradus, aduincemq eius sinui 500, tria, 0, hoc modo 500000, et hunc numeru per 866 sinu complementi eisdem arcus partieris, na quotiens dabit tangentem arcus graduum 30, scilicet 577. Item si sinus totus in seipso multiplicet, numerus ductus per sinu complementi cuius arcus dividat, regetur secans illius arcus, et cuius sinu complementi divisio facta est, ut si secans 30 gradus, diuide paratu sinus totus per 866 sinu complementi arcus 30 gradus; numerus quotiens 554 dabit sinu; non secus in alijs facies. f. f. f.

Tabula

Tabula sinuum tangentium et secantium .i.

	Tangens	secans.	Tangen	secans	Tang.	secans	Tang.	secans	tangens	secans	tangens	secans.
	j 0		j 1		j 2		j 3		j 4		j 5	
0	176	1015	194	1018	212	1022	230	1026	249	1030	267	1035
15	180	1016	198	1019	217	1023	235	1027	253	1031	272	1036
30	185	1017	203	1020	221	1024	240	1028	258	1032	277	1037
45	189	1017	208	1021	226	1025	244	1029	263	1034	282	1039
	j 6		j 7		j 8		j 9		20		23	
0	286	1040	305	1045	324	1051	344	1057	363	1064	383	1071
15	291	1041	310	1047	329	1052	349	1059	368	1065	388	1072
30	296	1042	315	1048	334	1054	354	1066	373	1067	393	1074
45	300	1044	320	1049	339	1056	359	1062	378	1069	398	1076
	22		23		24		25		26		27	
0	404	1078	424	1086	445	1094	466	1103	487	1112	509	1122
15	409	1080	429	1088	450	1096	471	1105	493	1114	515	1124
30	413	1082	434	1090	455	1098	476	1107	498	1117	520	1127
45	419	1084	440	1092	461	1101	482	1110	504	1119	526	1129
	28		29		30		31		32		33	
0	531	1132	554	1143	577	1154	600	1166	624	1179	649	1192
15	537	1135	560	1146	583	1157	606	1169	630	1182	655	1195
30	542	1137	565	1148	589	1160	612	1171	637	1185	661	1199
45	548	1140	571	1151	594	1163	618	1175	643	1189	668	1202
	34		35		36		37		38		39	
0	674	1206	700	1220	726	1236	753	1252	781	1269	809	1286
15	680	1208	706	1224	733	1240	760	1256	788	1273	817	1291
30	687	1213	713	1228	739	1244	767	1260	795	1276	824	1295
45	693	1217	719	1232	746	1248	774	1264	802	1282	828	1300
	40		41		42		43		44		45	
0	839	1365	869	1325	900	1345	932	1367	965	1390	1000	1414
15	846	1310	876	1330	908	1350	940	1372	974	1396	1008	1420
30	854	1315	884	1335	916	1356	948	1378	982	1402	1017	1426
45	861	1320	892	1340	924	1361	957	1384	991	1408	1026	1433
	46		47		48		49		50		51	
0	1035	1439	1072	1466	1110	1494	1150	1524	1191	1555	1234	1589
15	1044	1446	1081	1473	1120	1501	1160	1531	1202	1561	1245	1594
30	1053	1452	1091	1480	1130	1509	1170	1539	1213	1572	1257	1606
45	1063	1459	1100	1487	1140	1516	1181	1547	1223	1580	1268	1615
	52		53		54		55		56		57	
0	1279	1624	1327	1661	1376	1701	1428	1743	1482	1788	1539	1836
15	1291	1633	1339	1671	1389	1711	1441	1754	1496	1799	1554	1848
30	1303	1642	1351	1681	1401	1722	1455	1761	1510	1811	1569	1861
45	1315	1652	1363	1691	1414	1732	1468	1776	1525	1823	1583	1874

M ^{is}	58		59		60		61		62	
	fangens	secans	fangens	secans	fangens	secans	fangens	secans	fangens	secans
0	1600	1887	1664	1941	1732	2000	1804	2062	1880	2130
15	1615	1900	1680	1955	1749	2015	1822	2079	1900	2147
30	1631	1913	1697	1970	1767	2030	1841	2095	1920	2165
45	1647	1927	1714	1985	1785	2046	1861	2112	1941	2184
M ^{is}	63		64		65		66		67	
0	1962	2202	2056	2281	2144	2366	2246	2458	2355	2559
15	1983	2221	2073	2301	2169	2388	2272	2482	2384	2585
30	2005	2241	2096	2322	2197	2411	2299	2507	2414	2613
45	2026	2260	2120	2344	2219	2434	2327	2533	2444	2640
M ^{is}	68		69		70		71		72	
0	2415	2669	2605	2790	2747	2923	2904	3071	3077	3236
15	2506	2698	2639	2822	2784	2959	2945	3111	3123	3280
30	2538	2728	2674	2855	2823	2995	2988	3151	3171	3325
45	2571	2759	2710	2891	2863	3033	3032	3193	3220	3372
M ^{is}	73		74		75		76		77	
0	3270	3420	3487	3627	3732	3863	4010	4173	4331	4445
15	3322	3469	3545	3684	3798	3927	4086	4207	4419	4531
30	3375	3520	3605	3741	3866	3993	4105	4283	4510	4620
45	3430	3573	3667	3801	3937	4062	4246	4362	4605	4713
M ^{is}	78		79		80		81			
0	4704	4809	5144	5240	5671	5758	6313	6392	Inis Laus Geo. J. M. Marie	
15	4807	4910	5267	5361	5819	5904	6497	6573		
30	4915	5015	5395	5487	5975	6058	6691	6765		
45	5027	5125	5530	5619	6140	6221	6896	6968		


André Weicque a fait cela en la ville de Hesdin
An. 1632, troisieme jour de May.

Pars 2^a Applicatoria. De Instrumentorum Geometricorum confectioe. †

Consistit tota Geometria practica in 369. i. in linearum, rectorum dimensione q^{ue} etiam deo grammo-
metria d^{icitur}, ad q^{uam} reuocant^{ur} omni^{um} altitudinum, longitudinum et profunditatum dimensiones. 2. in sup-
fuerum inuestigoe, q^{ue} et planimetria d^{icitur}, ad q^{uam} reuocant^{ur}, Schemographia, Geotesia, Geographia,
q^{ue} adde^{re} geographia, q^{ue} expediant^{ur} agrorum, sylvarum, montium, regionum, et quinciarum dimensiones.
3. in corporum solidorum dimensione, q^{ue} et stereometria d^{icitur}, ad q^{uam} reuocant^{ur}, conorum, columnarum, cuborum, va-
sorum, sphaerarum, similibus accurata dimensio. de q^{uibus} oib^{us} in serie huius tractatus. †


Problema j. quadrantem et foratū Geometricū delineare. †

Erat ex ligno solido aut metallo tabula forata ABCD, ex puncto A describatur forans B
C, q^{ue} accuratissime iuxta p^{ro}po^sit^{um} 5 p^{ro}bl^{em} 5. in 90 grad^u cu^m affixis numeris diuidat^{ur}; iuxta hunc
forantem describatur aliud foratū ATVO, cuius lat^{itudo} A
TO diuidat^{ur} in 12 aequales partes, sicut et lat^{itudo} OV. vo-
cabitur lat^{itudo} TO umbra recta, q^{ue} nil est aliud, q^{uam} spatium
tale, in q^{uo} si cadat perpendiculari, semper abscondit lineam,
v. umbra^m minorem re^{cte} eleuata^m seu gnomone, AT. lat^{itudo} v.
OV vocatur umbra versa, q^{ue} nil aliud est, q^{uam} spatium illud, in
q^{uo} si cadat perpendiculari, aut linea fiduciae, ostendit spatium
illud e^{ss}e mag^{is} re^{cte} eleuata^m seu gnomone AT. His ita posit^{is}
mag^{is} foratū ABCD. curua forantem BC descriptu^m sic
diuides, latera BC et CB diuides in 100 aequales partes.
His m^{od}o desc^{ri}ptis, imponant^{ur} lateri AB, duo dioptra
seu p^{er}isidia, deinde ex puncto A forantis, demittatur pen-
diculi, vel fila^m cu^m plumbo, vna cu^m regula mobili, suis in-
structa dioptris, et paratū habebis instrumentum. † †



Probl. 2. Data quavis turri, domo etc. vnica statioe earū altitudine absq^{ue} vlla
arithmeticā, sulgidio forantis metiri. Cum volueris metiri rem aliquā altā, et liberū accessū
h^{ab}ere potueris, pone regula^m in scala altimetra sup^{er} 12 punctū, libratosq^{ue} instento p^{er} perpendicularum
accide et recide, donec ap^{er}icius rei eleuata^m fastigiu^m, sic factis metire spatium int^{er} te et turrim, na quot
pass^{us}, aut pedes inuenieris, tot turrim vel domū passib^{us} g^{er}untib^{us} altam e^{ss}e, sine vlt^{er}iore inuestigoe,
C addita interim illi spatio tua statura vsq^{ue} ad oculos. si v. aspecto fastigij perpendiculari ceciderit in punctū
6 umbra recta, metabis spatium int^{er} te et rem eleuatam, hoc n. duplicatū dabit altitudine rei. 6 n. ad
12 est in dupla portioe, q^{uod} si 24 pedes inuenieris, dices domū e^{ss}e altā 48 pedib^{us}, q^{uod} semper adicies tua statura,
si v. ceciderit in punctū 4 umbra recta aspecto fastigij, dimensio spatii int^{er} te et rem eleuata^m, dices umbra
3pla

3^{ta} est in^{ter} se et rem eleuatam: quare sic inuentos pedes Vg. 20 3^{tes}, dies rem est altam 60 pe-
 dibz; si iteru^m ceciderit in 3 punctu^m umbra recta, dies umbra est 3^{ta} ad rem eleuatam. Desi^t cei-
 derit p^{er}pendiculum in umbra versam, atq; adeo in 3 partem, dies umbra est 3^{ta} maiorem, qm rem eleuatam,
 quare inuentoru^m pedu^m aut passu^m in^{ter} R et rem eleuatam, ita pars dabit altitudiⁿi rei, si in 4 punctu^m inuentu^m,
 3^a pars, si in 6 inuentoru^m pedu^m ita pars dabit altitnem rei eleuata, et sic de ceteris; q^{ui} sine arithmetica, q^{ui} sola
 sola arithmetica cuius rei altitudo s^{ci} pt. t.



Prodicta p^{er} arithmetiam et sing expedire. t.

si ceciderit p^{er}pendicu^lu^m in punctu^m s^uperius Vg. 6 in fugiori seu paruo^m foratu^m umbra recta, vel 50 in inferiori, die
 sicut se hnt 6 dimidiu^m se lateris geometrii forati ad 12 totu^m latq; v. sicut se hnt 50 ad 100 sic se hnt spatiu^m
 in^{ter} se et rem eleuata Vg. 30 pedu^m, facta opo^e iuxta regula^m triu^m inuenies turrim est alta 100 pedibz. t.

Per sing^ul^os tangentes et secantes dic: ut totu^m sing^ul^o seu radiu^m a. c. 1000 partiu^m se hnt ad tangentem h^u ang^u gra-
 duu^m 63 et 30 minut: q^{ui} tangens est partiu^m 2005, sic 50 ad rem mensuranda tangent^e; fractio h^u $\frac{250}{1000}$ et
 A 100 facta opo^e p^{er} d^u bunt. t.

Prob. 3. subidio simplicis styli, eisdem g^{ra}u^latione umbra cuius rei altitnem
 metiri, auige styli^m pedalem A B qm in 12 aequales partes diuides et infiges p^{er}pendicularit^{er} in lineali B C in
 30. 40 aut 50 partes aequales styli partibz diuiso, et s^uis inst^{ru}mentu^m paratu^m. Vsq; lucente sole inst^{ru}mento ad libel-
 lam posito hinc inde vertes ta^m diu, vsq; du^m styli solis radijs obuersy umbra sua p^{er}iciat sup^{er} lineale, et statim
 videbis in partibz ab umbra abscissis, q^uant^u umbra styli excedat v. excedat a stylo, Vg. abscondit 14 partes,
 quare mensa umbra turris vel domy, inuentu^m Vg. 24 pedibz dic. 14 dant 12 q^uant^u 24. et facta opo^e s^uis styli


Prob. 4. p^{er} speculu^m inuestigare altitnes reru^m. t.

Pone speculu^m planu^m in aspectu rei eleuata in ipsa fugiⁿem terra, et para baculu^m, q^{ui} h^uad vsq; ad oculos est
 statura, cui certas iniquales diuisioⁿes notulas Vg. 12, iuxta quas rei metienda longitudine dependes; qui
 factu^m accede et recede a speculo, donec rei eleuata sumitum in speculo q^{ui} baculi recti extremitatem videas,
 factu^m in ocul^o portio in^{ter} ipsu^m speculu^m et basiu^m rei metienda ad ipsa^m altitudiⁿe, qualis est in^{ter} pedes tuos et
 B speculu^m et statura sua vsq; ad oculu^m. quare inuentis partibz in^{ter} se et speculu^m aequalibz partibz baculi
 Vg.

Vg. inuentis i4 int' te et speculi, et 24 int' speculi et rem mensurandam dic: i4 dant i2, qd 24. facta opoe dabit rei altitudo. †

Probl. 5. p duas stationes metiri cuius rei altitudinem.

Esto proposita turris EF circumposito lacu impedita, cuius altitudo gretz, elige locu glamu duabz stationibz aplu, in ja qo statione leua iustitru cadente ppendiculo supra punctu G, viso rei fastigio, signabis qo meta' suaz stationis ja, gressq alia' accedendo et recedendo, vsq du' denuo vi- deas fastigiu rei, penamq regula' abscindere 3 punctu, qd dalmont' notandu, muerabis deinde passy, q st int' vtramq stationem Vg 30, ablati autem his 3 punctis a G prig inuentis remanebunt 3 puncta, q st 4a pars duodenarij, qo 30 pedes int' duas stationes muerati erunt 4a pars turris, erit igitur turris alta 120 pedum. †



Aliter.

sit accesa difficultis altitudo EF, stringat ja radij visualis biniu obseruao in puncto ff et incidat idem radij visualis ad punctu J. cadat autem filu in C aut i2, erit igit' latq ad latq, sicut vnu ad vnu, postmodu retrocedendo idu radij visualis incidentia, pdenq ex- anabis, qm partem filu abscindat in latere AB ad punctu E sitq EB partiu 4. qualiu item latq i2, et qa 4 zola 5t pportione ad i2 seruabis tria; his factis subtrahere ja denotiatorem sicut vnu ab vltimo, tribz, remanebunt 2, qz diuides pedes int' ja et idu stationem inuentos Vg 30 et quotiens dabit altitudo rei 15. †




Probl. 6. Profunditates reru metiri. †

sit putei AC gunditas mensuranda, sic ages: statue foratu' tui sup orificiu putei parallelti, et regula' cu dioptris hinc inde vnta, vsq du' videas sufficiens ag 3minantis sufficiens muri, his factis nota partes ab regula' abscissas, q sint Vg 3 mensurata demu latitudine fontis, et inuentis 6 Vg. pedibz dic: sicut se st totu latq forati ad partes abscissas, sic latitudo fontis ad sua gunditatem, dic qoz regula aurea. 3 dant i2. 6 gntu, facta opoe inuenies gunditatem. †

Probl. 7. De Eiaculatione tormentorij. †


Notanda st tria in zangulo rethangulo, jo linea ppendicularis AC z basis CD. 3a hypotenusa AD, qm potissimu obseruare debent artifices tormentoru' explodendoru, cuius praxis huc est. Cam qz globu igneu eicere conat' et certu' scopu tangere, oportet illu' in primis scire vnu illig machina ac deinde distiam loci, in qm eiaculari conat'; cognitis his duabz distis, q se sint ad instar basis et hypo- tenusa, inclinanda e machina iuxta affixi forantis norma, vt globu' hypotenusa' tramtem recte incidat, ac deficiens in cursu suo descendendo cadat in destinatu' locu: Ne a. hic artifex erret. NB machina poe impellere globu' e graa 800 pedibz aut passibz, inclinandz e forans machina affixz vna cu machina. 48 gra-





48 gradibus et medio; q̄si globus 900 passibus hypothenua terminare valet, et machina abest are tangenda, inclinanda ē machina 43 grad: verū vt sic oia in praxi melius videas, p̄tue forantem sic

Basin forantis diuides in 100 aut 1000 partes, cuius centro affiges regula basin 240 excedentem in aequales, glibet partes 1165 partibus basi diuisam, atq; ha diuisiones sufficiunt q̄bus tormentis explodendis. Vſus ē iſte: explodens tormentū in circuitu inuestiga prius distantiam tormenti a scopo, iuxta geometriam, et inuentū numerum pedū a passuum v.g. 320 gre s̄iſ in basi forantis partibus, et hunc diligens notato, in hypothenua deinde gre uirtutem tormenti v.g. 600 pedū, sicce m. notatis in regula applica perpendiculari in puncto, o, dimittasq; sup basi lineam, deprimendo n̄r vel eleuando vsq; dū perpendiculari abscondat gradus 320 in linea basi distantiam se inſi tormentū et scopum, his partibus vide qm gradū in forante abscondat regula, et iuxta hunc gradū eleuabis tormentū, vt globus in designatū locū pueniat.



Probl: 8. Radiū Geometricū fabricare.

Accipe baculū ex solido ligno foratū, qm diuides in 4 aut 5 aequales pedes geometricos, et vnāq; pedem iterum in 12 partes aequales. et accipe aliū baculū pedale s̄iſ in 12 partes aequales diuisū, qm p̄dictū baculū 5 pedū ita transuersū infiges, vt uolui et reuolui p̄ uirtutis arbitrio possit ad perpendiculari, et erit instrumentū paratū. Vſus: si uis rem metiri sine arith: Elige planū aliqd̄ duabus stationibus aptum, et radiū seu baculū eleua uertig altiternē mensurandā, imposito prius ad iam diuisiōem transuerso baculo, et ex h. respice p̄ extremitatē utrāq; cursoris, donec tā apicem qm basin rei mensurandae videas. hoc facto retrocede ad uerū rectā lineā, imposito cursorē ad 2dā sectionē pedis, tunc reuide donec iterū basin et apicē rei alta cernas p̄ extremitates cursoris, deinde metire spatium inſi ja et 2dā stationē, numerūq; inuentū dabit altiternē rei. Per arithm. dic. 12 dant 60, q̄ntū dant 24 pedes inuenti inſi jam et 2dā stationem.



De pla

Planimetria seu Geodesia nihil e aliud, qm sua mensurandi superficies, technographia e sua mensurandi sylvas, montes, agros, oppida, quincias regiones ad pedem cu oibz platis et angulis ea portioe, ut eis earz capacitas statim in pedibz, passibz, stibz, figuris bri possit.

Probl. 1. latitudinem alicuius fluvij, prati etc. subsidio dantis, a danti geometria metiri. ascendere turrim, aut ste qd, mobilibz collocato danti supra lymbu fenestra, ita ut latera ppendicularia danti turri sint parallela, respice signum in litore trans fluvium positu, et nota quale umbram vel gradu tibi regula abscondat.

si n ultra 12. sexta partem absunderit, dies, altitudinem turris aut domz ee dupla latitudinis, si 4ta, 3pla, si in 3a. duplam, si in 12. aequale, si n ultra 12. absunderit 6, dies turrim ee subdupla et sic de relijs portioibz .

Per trism. sic opabere, cadente linea fovea ultra 12. in 6. du. 6. dant 12, qntu altitudo rei cui insisto, Vg. 20 pedu, facta opoe docent 40 pedes latitudo fluvij .

Per sing. tangentes et secantes. gre tangentem gradz in dante abscessi, ille n dabit latitudinem rei, recita prig una figura a dexteris, posita turri 100 pedu . q arithm. fovea sic longos 19 1000 partiu st tangentem area 60 graduu Vg. 1732, qntu dabit 20. facta opoe prodibit latitudo fluvij .



Probl. 2. Radio geometrico qmuis latitudinem metiri. Designa tibi in utraq ripa fluminis signu, his positis aude et recede cu baculo geometrico, ponendo cursorum sup ja divisionem, donec ex extremis cursoris videas utruq signu in ripis positu; signata igit ja statoe positq cursore sup ee divisionem retrocedendo, donec p dita signa demuo p extremitates cursoris tibi appareant, his ita factis metire spatu inq utraq statione, et nuerg pedu dabit latitudinem rei, n seg mensurabis latitudinem sectorum .





Probl. 3. Instrumtu Geometricu holoetra fabricare, cuiq subsidio faculte roe cuius rei mensuraton expedire primz . fiat semicirculu ABC ex solido ligno vel ere, cuiq diameter sit pedalis, relicto tm. semicirculi diametru spatio aliquo indifferentis magnitudinis; semicirculu porro dividat in 180 partes seu in duos dantes, his n. 90 faciut 180, assignatis nuers, his factis fiant due regula ex st ligno VBMN, q ita in centro affigens, ut claudi et apiri possit q libite vtentis, ad modu inforti partiu, his dividet in 1000 aequales partes, posito in unaquaq uno diestro mobili OF. his parafis accipe alia regula GH ab alijs separata et libera in 1000 quoz diuisa partes, q diceb demecqz applizatorna, OB. tm in centro apicem poni debere, ut regula centra circuli imponit; et paraueris instrumtu. Vg circa.

Vsq circa latitudines inuestigandas p duas stationes.

Probl. 4.

Latitudine Mori Beni etc. duas stationes inuestigare +
 Felice locu align planu in litore, et metire chorda aliqua
 spatii plani quibet, cuius spatij extrema representabunt stationes
 quare diligenti baculo, aut invisibili signo notabis. His ita factis
 eunde ja stationem, et obverte instrumenti semicirculi versus aquas
 vna a. ex motibz regulis versus alteris stationis signu. altera v.
 regula respice signu trans flumen positu, et firmatis regulis p:
 eade ad 2da stationem, in qua stitij obverso semicirculo agi
 instrumentu cu pede verte, donec p ja regula videris prioris
 stationis signu, hoc viso metra pedes int ja et 2a stationem in
 ante p chorda inuentos Vg. 26. in eadem regula, q directae
 versus signa stationu, et ad fine volue dioptru, firmatoq in-
 stituto respice signu trans flumen positu p dioptru vtriusq pael
 2a regula, qua dioptra tam diu volues sup regulas, donec
 cu signo trans flumen positu vna linea efficiant, his positis
 applica baculu separatu GH ab vno dioptra ad alteru, et
 abscondet tibi latitudo fluminis in regula. r. p. r.



Probl. 5. Altitudines reru p dno instrumento metiri.

Affigat circuly ABC trochlea ad latu pedis instrumenti in hunc
 fine aptata, ita vt in altu circuly erecta sit, hoc facto diri-
 ge inferiorem regula versus rem mensuranda, eaq bene firma-
 ta, altera regula eleua et deprime, donec p dioptra rei
 fastigiu appareat, hoc lto firma regula, et in inferiori regula,
 seu fundamentali tot pedes numerabis, qd pedes inuenti p certa align mensura int te et rem
 mensurandam, sup vltimu a. pedem pone baculu GH ei ppendicularitq insistentem, et nota
 qd pedes abscondantq a regula illa GH representante hypotenusu, tot n. pedibz alta erit res. r.



Probl. 6. instrumentu ichnographicu, seu Geodeticu fabricare. r.

Fac tibi afferculu bene planu, et foratu cuiuslibet magnitudinis, hoc aduertas pedi ea roe, vt
 immobilis et planu in eo iaceat, folia quoz chartaz cera ita agglutinabis afferri, vt m. demere,
 si libuerit pois, hoc facto para vnu lineale vel regula, cuius media linea vtriusq extrema pa-
 rallela in aequales partes qlibet Vg. 300 diuidatq, sup qm pones qntalibet distia, aciculas duas
 tanqum dioptra, et instrumentu ichnographicu lris. r. p. r.

Probl. 7.


Probl. 7. latitudinē gniug loci in hnto ingrene.

Est fluvius mensurandus Rhenus Vg. elige locū duobus stationibus
 Captū, quarū intervallū explorabis virga aut chorda mensu-
 ria, mueniaturq 50 pedū; his factis pone pedem et supra pedē
 afferem in loco A ja statio, impositaq lineali sup afferem
 verte versq signū C idē statōis, et due lineā sup chartam
 afferi agglutinata, quo facto interice ciruino ex lineali pede
 inq vitram stationē ante inuentos et transfer sup lineā, q
 ducta idē lineale vtrāq stationē respicit; nā in charta
 extera huius lineae representabunt duarū stationū intervallū
 in minori licet portioē. signatū itaq his punctis A et C posita
 regula sup A verte in eo seu centro quōdā lineale, donec signū
 trans fluvīū positū p dioptra tibi appareat, ductaq lineā ex
 puncto A iuxta sitū linealis versq signū transfluvīū directi,
 pede ad 2^a stationē C, positog lineali iterū sup lineam
 q representat intervallū stationū, respice p dioptra in A, vt
 sitq lineā prioris stationis habeat, hoc sūo verte lineale
 versq signū H transfluvīū, et qdem ita, vt foratū motū ma-
 neat, stmg lineale in centro C tandū vertat, donec p dioptra
 signū H videas, et facta lineā iuxta directū lineale nota intersec-
 tiōem prioris lineae visualis
 cū posteriori, hoc n. spatū circino interceptum dabit latitudinē fluvīi in media lineā partū.




Probl. 8. Ichmographie describere agrū aliquū

quocumlibet laterū, aut ortū aut lacū, cuius tri. anguli videri possunt.
 Elige tibi vni latq agrī mensurandi, ex quo comode reliquos angulos
 videre poss. Vg. AB 300 pedū; pone instrumentū sup B stationē dā
 et imposito lineali p dioptra respice in A ja stationē, ductaq sup
 charta afferis lineā, afferem ita firma, vt dimoueri loco negat,
 deinde posito lineali sup punctū B respice in C, ductaq lineā
 sup afferem idē lineale, iterū ex B respice in D, ductaq lineā
 deinde ex B in E. F. G angulos ductiq lineis ad puncta angularū
 pede ad alterā stationē A, notato priq signo aliquo visibili in locis B,
 his positū rectificato instrumentū iuxta priorem sitū, firmatog afferē respice p dioptra ex A in B, vt
 priorem lineā stationū regas, deinde ex puncto A respice in Angulos. G. F. E. D. C et diligēt nota
 in charta intersec-
 tiōem lineā visualium ja et 2^a stationis, hoc n. intersec-
 tiō dabit angulū, quos inter-
 sectionē si oēs rectis lineis iungas, hōis aream spita, cū orbz angulis suis, et limitibz, qd erat faciendum.




Probl. 9



Problema j.

56 = 8
22
28 pedu e area.




Probl. g. Sylva, cuius anguli aut limites videri nequeunt, imperio montis aut arborum, adu oes angulos describere. Sit sylva cuius anguli et limites sunt A. B. C. D. E. F. etc. capere lineare hoc institum, sic ages: pone institum tuu in angulo A, respiciens in angulo B, p diestra linealis afferri superpositi, mensura p. r. i. m. A et B chorda v. virga aliqua mensura, inuentos pedes interceptos, ex lineali seu regula in suas partes diuisa transfer sup afferen iuxta situ linealis representantis linea spatij m. p. et 25 statum interceptu, qd sit v. g. 40 portiaru. De notata p. statum pedu in B, posituq lineali sup linea A. B. rectifica institum et respice ex B in C, ductaq linea pedes p chorda inuentos m. B et C interceptos in lineali partiu, sup afferis linea ia facta transfer. His factis pedu ad punctu C, rectificatq institum ex C respice in D, factaq linea transfer pedes p chordam inuentos in ia ante facta lineam, iteruq ex D in E, ex E in F etc. sic vt prius, et sic circueundo, vsq ad redeas ad priorem locu, diligenti interim notanda limites, q si oia rite paueris, videbis sylua tota in suos angulos resolutam, qoo a. in pedes v. iuga resoluenda sit, diuis in septe appendice. t.

Appendix de computu zangulorum. Probl. primum: Zangulu rectangulu Isocetes metiri. Dne alteru equaliu lateru in se se, et ducti meda pars area ipsiq d. rati dabit, vel si duas vnu equaliu lateru in dimidia alteriq partem, h. s. area vt sit zangulu A. B. C, sintq latera AB et AC vnita 6 pedu, qm se ducta facient 36, cuius mediu dabit area, s. h. s. offerat zangulu scalenu rectangulu, duces latera in se rectu angulu componentes, vt ducti medietas det area capacitatem. t.

Probl. 2. zanguli oxigonei seu acutanguli aream inuenire, dne vnu equaliu lateru in se, et ductu inde nueru multiplica p 13, et eu q demu resultabit, partire p 30, na quotiens ostendet aream q. sitam excong. graa sit. Δ A. B. C. cuius q. libet latq sit cubitoru 6, hae in se ducta facient 36, rursu 36 in 13 ducta facient 468, q diuisa p 30 dant q. Quotiente 15 et $\frac{18}{13}$ seu tres gntas, tot cubitoru erit area; s. h. s. area p 30 multipli. caueris et ductu diuiseris p 13, quotiens demu radix d. rati dabit singuloru lateru nueru. Perpendicularen v. sic inuenies, dne vnu et lateru 6 pedu in 13, et ductu diuide p 15, quotiens dabit


Dabit perpendicularem, quare ut habeas aream, sic age; duc perpendicularem in latq, et dimidiu' ducti dabit aream. t.

Probl. 3. Isosceles origines area invenire t.
 Sit Isosceles origines $\triangle DEF$, cuius duo latera equalia 30 sint cubitorum, ducatq' basis dimidiu' 6 in sese, fiet 36, multiplicata rursu' ioin se, fiet 100, a q'q' aufer 36, relinquent 64, radix autem extrata huius e' 8, totidem q'o cubitoru' e' perpendicularis, ducta tamen hanc radicem 8 in basis dimidiu' 6, fiet 48, tanta erit area.




Probl. 4. vniuersali methodo invenire areas triangulorum quorūlibet. t.

Adra int' se cuiusq' obtusi anguli latera, et convergentis inde numeri dimidium serua, a quo iteru' subtrahat singula anguli latera, diligens obseruando diffinas, iteru' dimidiu' summa lateru' due in maiorem diffiniam, ductuq' in media a dā diffiniam, et ex hoc surgens in vltima dnam sex 36, cuius ductu' dabit area anguli. ut sit angulus $\triangle ABC$ cuius latq' AB 6 cubitoru', AC 8 BC 10 dnamq' in summam vnam, fiet 24, quoru' dimidiu' sit 12; ab hoc dimidio subtrahat singula latera, ut 6 a 12 manent 6. 8 a 12 manent 4. 10 a 12 relinquent 2, has dnas diligens nota, his factis dimidiu' summa lateru' scilicet 12, due in 6 q' e' maior dna d'ribuntq' 12 hoc in 4 mediam dnam, fiet 288, et hoc ductu' demu' in vltima dnam, fiet 576, cuius radice extrata dabit aream 25.



Probl. 5. De circuli dimensione. t.



AB. Archimedes demonstrasse aream circuli equalem ee' angulo rectangulo, cuius vnū latq' ex his q' rectu' comprehendit angulu' ipisq' circuli semidiamet' relinquit v. circūferia fuerit equalis; cu' n' semidiameter in totam circūferentiam multiplicat, fit rectangulu' vltu' circuli, cuius rectanguli dimidiu' e' dem angulu' dato circulo equalis, ex qua subtilissima demonstracō manifestata, q't semidiameter in dimidiu' circūferia multiplicata vel vtra, rectangula ducat aream dato circulo equalen. e' q'o sola difficultas in inuestigacōe recta linea, q' circūferia circuli sit equalis, q't nobis archimedes dia potiq' qm' sua d'ncōe reperit, tradidit; inuenit n. circūferentiam ad diametru' circuli q'ortisem obtinere minorem 3pla. sesq' septima, maiorem vero tripla. sesq' octaua; ut eadem circūferentia ad ipsa diametru' se habeat, veluti 22 ad 7. q' res hactenq' obseruata fuit ab oibz, et huic negotio absq' sensibili errore existimat' facere satis. sit q'o circulus $\triangle B.A.$ cuius centru' C sitq' diameter eius 14 pedu', igitur



igitur inuenta ferehmedis et regula etior proportionalium. circumferentia erit cubitoru 42, quoru dimidia 21, due itaq; semicirculi 21 in semidiametrum 7. fiet area zanguli $CD = 4.7$, totidem cubitoru e area ipsiq; circuli. qd si radice extrahas de 147, tibi dabit illa latq; circulo, aqua-
lis extrahi fuit 12 et $\frac{5}{12}$. p. n. p.

Probl. 6 De solidoru corporum dimensioe .i.

Cubi aream inuenire sit cubq; $ABC D$, cuiq; unigq; latq; pedu 5, si duxeris itaq; $A B C$ extraham 25 in latq; $B D$ 5 pedu, surgent 125 soliditas cubi; vel due unu latq; in se, ut pote 5, et fuerit 25, hoc rurq; in 5 pducentq; 125, tot n. solidoru pedu e $ABC D$ dati cubi. soliditas: qd si applicaueris 125, fuerit 250 quoru radice cubica 6 et $\frac{5}{12}$ totidem pedu erit latq; cubi, dupli ipsiq; $ABC D$ et ita de 3 pla extrahatq; indicabis; n. fecit metiere columiam extrahi seu parallelogramum solidu, ut sit parallelogramum $C F$ et H cuiq; latq; $E F$ sit pedu 6, $F. H$ 4; $E H$ 11. due qd 6 in 4, fuerit 24, qd 11 multiplicata faciunt 264. Hinc patet, qd facile sit rectanguli portem vnica vel plurib; partib; aut se-
negris itidem rectangulis extrahi metiri; ut sit paries alijs extrahatq; cuiq; crassities $I K$ sit 3 pedu, latitudo $K L$ 12; altitudo $L M$ 11; sitq; in eodem puncto altitudinis 6, porta alta 6 pedu, lata 4. due qd 12 in 3 fuerit 36, hoc in 11 fuerit 396 crassitudo totiq; si scit oio solidu eet, vacuitem a porta sic desubentes multiplicata 4 in 3 scilicet latitudinem in crassitatem porta et ductu in 6 altitudinem porta, scilicet 72 qd a toto auferenda scilicet a 396, ut reliqua-
tur reliqua muri crassities. p. n.



Probl. 7. Aream columna inuenire. due circumferentiam columna in altitudinem et summa facienti adde bis aream circumferentia, et huius sufficiens colunaron; ut crassitatem paruo habeas, due aream in columna altitudinem et huius capacitatem, ex qd; patet, qd; capacitas puteoru inueniri pot. p.

Probl. 8. Sphera soliditatem regere .i.

Due sphaera diametri in circumferentiam maioris circuli eidem sphaera et ductu sufficiens sphaera magnitudinem ostendet; vel due area ipsiq; mixi circuli in 4 et idem huius quoniam ipsa sphaera sufficiens extruata e area mixi circuli in eadem sphaera descripti. sit Vg. diametru circuli 14 pedu, qd p. porta cuiq; circumferentia erit 44 area v. 154; due qd 44 in 4 scilicet 616, idem mueratis si area 154 in 4 duas, totidem igit; totiq; sphaera sufficiens terminatiua pedu est, cu autem volumus eidem sphaera metiri crassitatem, sic ages: Cuba diametri, multiplicando ductu p 11, qd; emergerit, diuide

f

§ 21, quotiens dabit eragation. Exempla de terreni globi crassitie. ex audentissimis dimensioibz 71
 spat. diametri mundi eē miliariorū germanicorū 3718, q̄ circūferia eadem iuxta gl. 5 erit 5400
 fere, area vero huius 2319300, siq̄e huius due diametri in circūferiam, et huius totam area sup̄ficii tri-
 natūsa Johana miliar. 3211200, idem inuenies si 4 duxeris in aream circuli mxi, cū autem diamet̄
 miliar. astronomicoꝝ vel germanicoꝝ sit 3718, erit huius diametri cubz miliar. 5070738 232
 § 22 multiplicata p̄reant miliaria 53777900352 q̄ diuisa § 21 relinquent in quotiente crassi-
 tatem terra pedū scilicet 2656090502 $\frac{1}{2}$


Appendix de vaporū dimensione et p̄paroe virgatz vijonariū cubicē et edrate.

Probl. 7. Virgam edratā vijonariā describere q̄ curabit fieri ex ligno, a lamina ferrea, vel
 simili māa vasculū aliq̄ rotundū p̄ueniens exactissime certā aliam in eaq̄ patria vsitata mensuram
 puta vel mensurā vel stala, vel si q̄ maioribz vasis virgam p̄parare velis, vnā vnā, sitz hoc p̄
 fundū virga p̄paratoria. 2. Longitudo huius vasculi representabit longitudinem vasis
 quorūvis metiendorū, q̄funditas eiq̄ qm et diametri imp̄p̄terū duemz, q̄funditem vasis.
 hoc s̄t sic p̄cede. scilicet virgam 4. 5 aut 6 pedū longam q̄ magnitudine vaporū mensurā
 radorū, in hanc virgam transfer diametri AB vasculi minoris quoties poteris, representā
 buntz ea aequalis diuisioes diametros vaporū quorūvis minorū qm sit virga. in ex-
 pla, vasculū q̄ fundo p̄paratū sit A B F, cuius diameter A B referat q̄funditatem vasis,
 longitudinem v. A F, et sit baculz



3. mens.	4. mensura	9. mens.	16. mens.	25. mens.
----------	------------	----------	-----------	-----------

sup̄ qm transferes longitudinem vasculi
 seu diametri A B q̄ representet q̄funditatem. toties, quoties poteris, representabit igitur q̄ diuisio iam vir-
 ga diametri, q̄ e vna mensura Vg. 2da diuisio seu diameter 2da diametri 4 mensuraru, 3a q̄ dia-
 metri 9 mensuraru. 4a quartam 16 etc. vt vides in baculo v. s. Quarū v. media mensura p̄parā
 tionaliū virga inscribantz. Nota q̄, accipe vnā diametri, eiq̄ q̄ntitatem transfer seorsim in lineale ab-
 solū, q̄ diuides q̄ in 30 aequalis partes. 2. vnāq̄q̄ 30 partū vterū in aliaz 6, vt videre ē in lineali



C. B. Hoc etiam facto sic aggredere p̄parā
 tionalem reliquarū mensurarū inscriptionem, accipe tabulā q̄ edratā virgā inscribendis, in qua videbis
 in 1a columna m̄surū diametrorū virgā, in 2da m̄surarū mensurarū in tertia puncta inscri-
 benda, in 4a minuta. vt factū vides pagina sequenti. His ita rite p̄paratis pone tabulā q̄ virgā
 edratā ante te, applica quoz lineale huius C. B. in 30 partes et vnāq̄q̄ huius in 6 aliaz diuisam sup̄
 virgam p̄paratā, ac in diametros suos aequalit̄ iā diuisam hac cautioe, vt q̄ diameter semp̄ maneat
 indiuisa, tali itaq̄ arte applicabis ad virgam, vt lineale ponat sup̄ initū 2da diametri in virga de-
 scripta, hoc ita posito firmet̄ lineale, et iuxta puncta mensurarū in tabula signatarū fac signa in virga,
 et q̄ occurrēt 1 mensura, cui a latere p̄dent 30 puncta et minuta, 0, q̄ representabit q̄ mensuram
 diametri indiuisa; 2 diametro duarū mensurarū vero accipe e regione 4 puncta et 8 minuta
 q̄ra

72 In lineali inuenta imprimes virga, p diametro vero triu mensuraru excepte 7 et 19 minuta, 3
 inuenta in lineali imprimentis quoz virga, p diametro 4 mensuraru, cu nulla nuerg occurrat, scias
 eadem diametru iam in 4 partes diuisa, emoueat igitur lineale ad 3a diametru, et p diametro 5 me
 suraru lege, ut in tabula apparet, et diametro hui quoz absoluta pedre ad 4a et operis long
 smadmodu in initio, vsq du ad finem duodecima diametri puenias. p. v. v.

Tabula visoria pro virgis quadratis. p. v. v.

Pi.	Me.	Pu.	Min.	Di.	Me.	Pu.	Min.	D.	M.	P.	M.	P.	m.	D.	M.	P.	m.	D.	M.	P.	m.		
1	30	0		5	25	50	0	7	49	70	0		73	85	26		97	98	29	11	121	110	0
2	14	8			26	50	59		50	70	42		74	86	1		98	98	59	112	110	27	
3	17	19			27	53	57		51	71	24		75	86	36		99	99	29	113	110	54	
4	20	0			28	52	55		52	72	6		76	87	10	10	100	100	0	114	111	21	
5	22	21			29	53	51		53	73	48		77	87	44	10	101	100	29	115	111	48	
6	24	28			30	54	46		54	74	29		78	88	18		102	100	59	116	112	14	
7	26	27			31	55	40		55	74	9		79	88	52		103	101	29	117	112	41	
8	28	17			32	56	34		56	75	49		80	89	25		104	101	58	118	113	8	
9	30	0			33	57	26		57	76	29	9	81	90	0		105	102	28	119	113	35	
10	31	37			34	58	18		58	76	6		82	90	33		106	102	57	120	114	1	
11	33	9			35	59	10		59	76	48		83	91	6		107	103	26	121	114	27	
12	34	38			36	60	0		60	77	27		84	91	39		108	103	55	122	114	53	
13	36	3		6	37	60	49		61	78	6		85	92	11		109	104	24	123	115	19	
14	37	25			38	61	38		62	78	44		86	92	44		110	104	52	124	115	45	
15	38	43			39	62	26		63	79	22		87	93	17		111	105	21	125	116	11	
16	40	0			40	63	14	8	64	80	0		88	93	48		112	105	49	126	116	37	
17	41	13			41	64	2		65	80	37		89	94	20		113	106	18	127	117	2	
18	42	25			42	64	48		66	81	14		90	94	52		114	106	46	128	117	28	
19	43	35			43	65	34		67	81	51		91	95	23		115	107	14	129	117	54	
20	44	43			44	66	19		68	82	27		92	95	54		116	107	42	130	118	19	
21	45	49			45	67	5		69	83	7		93	96	26		117	108	9	131	118	44	
22	46	55			46	67	49		70	83	39		94	96	57		118	108	37	132	119	10	
23	47	57			47	68	33		71	84	15		95	97	28		119	109	5	133	119	35	
24	48	59			48	69	16		72	84	51		96	97	58		120	109	32	134	120	0	

Absolute.

Abfoluta tandem virga hac methodo, representabit unigatq punctu, mensura, vel tale, vel qd flax
 stentis arbitrio. Longitudines porro vasaq fac inserites. accipe longitudine A F vaseuli A B F et ad
 alteru latq virga eam folies, quobis poteris transfer q longitudine virga, et vbi ultima longitudina
 cu vltima diametro virga succerint, terminabis quos virgam reliqua referand.

Jesus . Maria . Ignatius . Andreas .

Tabula visoria pro virgis cubicis

j	0	0	26	9	36	51		77	2	30	103	6	54	130	0	36
2	2	30	27	10	0	52		78	2	42	104	7	1	131	0	42
3	4	24	28	0	18	53		79	2	54	105	7	10	132	0	54
4	5	48	29	0	42	54		80	3	5	106	7	18	133	1	3
5	7	4	30	j	4	55		81	3	16	107	7	26	134	1	6
6	8	6	31	j	20	56		82	3	24	108	7	36	135	1	12
7	9	6	32	j	42	57		83	3	36	109	7	45	136	1	24
8	10	0	33	2	j	58		84	3	45	110	7	54	137	1	33
9	0	48	34	2	18	59		85	3	47	111	8	3	138	1	36
10	j	24	35	2	42	60		86	4	7	112	8	12	139	1	48
11	2	12	36	2	60	61		87	4	18	113	8	19	140	1	54
12	2	48	37	3	18	62		88	4	28	114	8	28	141	2	3
13	3	30	38	3	37	63		89	4	38	115	8	36	142	2	6
14	4	6	39	3	54	64	10	90	4	48	116	8	45	143	2	15
15	4	36	40	4	6	65	0	91	4	58	117	8	54	144	2	25
16	5	6	41	4	24	66	0	92	5	8	118	9	2	145	2	32
17	5	42	42	4	42	67	0	93	5	18	119	9	11	146	2	36
18	6	12	43	4	j	68	0	94	5	27	120	9	18	147	2	46
19	6	36	44	5	18	69	1	95	5	36	121	9	25	148	2	49
20	7	6	45	5	30	70	1	96	5	47	122	9	33	149	3	0
21	7	30	46			71	1	97	5	57	123	9	42	150	3	6
22	8	0	47			72	1	98	6	6	124	9	58	151	3	12
23	8	44	48			73	1	99	6	15	125	10	0	152	3	18
24	8	48	49			74	1	100	6	24	126	0	7	153	3	30
25	9	12	50			75	2	101	6	33	127	0	12	154	3	36

X

76	2	18	102	6	43	128	0	21	155	3	42
129	0	24	156	3	48						
157	3	54									
158	4	0									
159	4	6									
160	4	12									
161	4	18									
162	4	24									
163	4	36									

Paris

Praxis pro virga dorata .i.

Indagatur vasis capacitatem demitte virga p epistomium perpendicularit, diligens notando qd
abscindant, postea exempta virga, metire sicut duos fundos vasis, semper notando puncta profunditatis,
absissa; comparata qd maiori cu minori profundite mediu huius dabit tibi vera profunditem, qd ni-
hil e aliud, nisi mediu proportionale int parvam et magna guttatem, Vg. deplendyti demissa
virga p epistomiu in fundu vasis 40 puncta, in posteriori v. fundo profunditem 36, mediu differe-
boru nuorum dabit medietatem rectificata profunditatis Vg. 38 puncta, hanc diligens nota se-
ntim; post huc inuenta virga metire quoz longitudine vasis, et demotis exstantis, et offerat se
Vg. 6 longitudines in virga absissa; multiplicata qd 6 p 38, longitudinem se in profunditatem,
puenient 228 mensura capacitas qdita, qd p 4 diuisa ducunt 4 stalia .i.

si vero n aequales partes absiderit, sic age: 30 multiplicata integra puncta profunditatis, cu longitudine
integrus, et ductu obserua; postea multiplicata fracta profunditatis cu fractis longitudine, et qd p-
ueniet, dabit mensuras, q addita integris dabunt capacitatem vasis. Vg. mensurato vase inue-
nio 7 stalia, et duo puncta supra 1, item longitudines inuenio 14, multiplico 7 in 14 fiet
98 quartalia, postea duo quoz relicta multiplico in 14, puenient 28, septem scilicet stalia,
q addita priori summa 98 ducunt 126 capacitatem vasis .i. p. p.

Notanda p constructione virga cubica .i.

1^o selige tibi regulu certa mensura stalis aut vna, cuius diameter transversa dabit vera profunditatis
diametru; quare toties, quoties poteris, hanc inuentam transfferes in virga longitudinem cu
assurgitis nuers cubicis, reliqua v. puncta profunditatis ex tabula cubica n fecit,
qm ex dorata inscribenda sunt. Et vteris hoc modo: mensura vas de-
mitte virgam transversaliter, medietat profundite vide, quot
puncta abscindant, illa n dabunt vera vasis profunditem
sine vltiori arithmetica inuestigaoe.

Amen. Finis Geometria

Practica .i. p. p.

Tract:

Tractatus 4. De Geographia. 1. Introductio ad Geographiam. 1.

In primis nosse debet geographia studiosus circulos sphaerae mundi, eorum officia, de quibus passim agit, deinde sibi debet comparare mapam vel globum, in quo stant descriptio totius orbis terrarum: ex terra et aqua compacti. Cuius suppono in agni et terrae in uno globo coire: nam haec descriptio vrbis proprie est geographia, particularis a regionis descriptio vocatur chorographia.

Propositio 1. Determinos circulos, qui in globo describuntur. 1.

In globis vrbis passim describuntur hi 8 circuli, Horizon, meridianus, aequinoctialis, zodiacus, duo tropici, duo polares, quorum primi 4 vocantur circuli maximi: et qui globum in partes aequales secant, et qui quidem ex suo centro sunt ipsius globi centrum, alii duo minores, qui globum in partes inaequales diuidunt, et sunt centrum desumunt. Horizon est circulus, qui partem mundi visam a non visam diuidit, seu qui caelum in duo hemisphaeria diuidit. Meridianus est circulus maximus qui verticem et mundum polos transiens, quoniam ubi sol attingit, meridiem efficit supra horizontem, et sub horizonte mediam noctem. Aequinoctialis est circulus maximus quoniam ubi sol attingit, dies artificiales sunt aequales noctibus. Zodiacus est circulus maximus signa 12 continens et aequinoctialem interfecans in 2 punctis, scilicet arietis et librae. Tropici 6 sunt minor circuli ab aequinoctiali 23 gradibus: cuius medio distans versus septentrionem eius parallelus, quoniam ubi sol decurrit, longissimus sit dies apud nos, et nox brevissima. Tropici 2 sunt circuli minor et eodem modo distat ab aequinoctiali: versus austrum, quoniam ubi sol decurrit, et apud nos dies breuissima, funis est solstitii brumalis. Circulus polaris arcticus est, qui a polo mundi arctico seu boreali distat 23 gradibus cuius medio. Antarcticus est, qui ab alio polo totidem gradibus distat. Hi sunt 8 circuli in globo positi, quorum 4 sunt distributi rubro colore in suis gradibus 360 scilicet horizon, zodiacus, aequinoctialis et meridianus, reliqui rubra linea notantur, eorum gradus sufficienter et aequinoctialem iungunt, cuius sunt aequinoctiali paralleli. In horizonte in notari solent litterae diuersales, et e regione uigilaret dies longi solis in zodiaco etc. praeterea ad globum appenditur cyclus horarum et altitudinis etc. quorum usum postea docebimus. 1.

Propositio 2. Zonas, parallelos, climata exponere in globo. 1.

Zona terrestres sunt 5, orbes inter 4 circulos aequatori parallelos continentur. dicitur Zona 1. fascia quae terra circumcingant. Zona torrida inter utrumque tropicum continentur, Zona v. temperata hinc utrimque assident, ac continentur intra tropicos, ac circulos polares, reliqui duo frigida inter duos polares circulos, et extrema sphaera frigoris clauduntur, unde non habet ea Zona formam, quoniam priores, sed rotundam et circulanam. 1. Quod haec Zona omnes habitentur, saltem quoad aliquam sui partem, iam constat, ac notandum, quod ad zona torrida spectat, id Brasilis septentrionalis. Clima est zona parua totam terra circumcingens, in qua dies excrescit usque ad semihora, computando a termino ipsius australi ad borealem. in clima ductus est Meritum, quod iunctus est Ethiopia distans ab aequinoctiali 16 gradibus 4 minutis, in cuius climatis initio seu termino australi dies est 12 horarum seu quadrantium, in fine a seu termino boreali est 13 horarum et unius quadrantis, in vrbis autem meritis quod in medio climatis est, dies est horarum 13. dicitur clima ductus est Cyrenem vrbem Egypti, sub tropico 69, ubi dies est horarum 14 cuius media 3^{mi} Alexandria metropolim Egypti, ubi dies est horarum 14. 4^{mi} et Rhodu insula, ubi dies est 14 cuius media

media . 5^m Romana urben, ubi dies horarū 15. 6^m Borysthenon Jarmatia, sive Nepedi, 16 horarū. 7^m montes rhybaos eidem Jarmatia, vel podolia, hae 7 climata posuerunt sentig, totidemq; ex aduerso ad austrū eidem noib; adiuncta hae voce tra vel sh. Vg. in clima australe di clima 2^{te} Mericia. 2^{da} clima tra Alexandria, sive ex opposito Alexandria est.

Recentiores multo plura ponunt climata, imo alia extendunt usq; ad polū, ubi diem hnt ad mediū annū. Geographi, ut melius adue terra vitam distribuere, pter Zonas et climata alios circulos enoci- turunt equatori parallelos, eoz; pcedendo ad Borea distantes tanto spāo, qm̄ requir; ut m̄ca dies unig differat vno forantē hora a m̄xo die alterig paralleli p̄cē sequētis. Hinc patet ad clima r̄stendū, 3 parallelos currere, Ptolomag posuit tm̄ 21 parallelos, quorū vltimū ē Iuliam insula, nunc passū ponunt 48 cū medio, quorū vltimū distat ab aequotiali 66 grad. cū medio, ubi dies m̄x ē horarū 24, hinc parallely coincidunt cū circulo polari arctico, alij a parallelos septua serie extendunt ad polū usq;, quos in meridianis globi geographi describunt, aut apponunt ad margines mapparū vltimā; in nro globo ponunt paralleli ad 30 qm̄ gradū meridiani usq; ad polū; vltimū qō s̄t paralleli 18 in v̄sa.

Prop: 3 longitudinē locorū exponere.


- 1^o in explicando spatio terra, put celo Edet ac eig sitū positionemq; Geographi qm̄ plurimos meridianos ē equatorem ducunt, quorū parū ē 15, q; transit ē insulas fortunatas, seu canarias in mari Atlanticio ultra Hispaniam, ab illo meridiano, q; antiq; erat occidentaliss; ceteri oēs nūerant v̄s; ortū.
- 2^o licet innūeri duci possēt meridiani, Geographi t̄ r̄fusiois vitanda grāa pauciores describunt in ipsis globis, nā Gemma Brygig in suo globo ponebat 24 meridianos, inq; binos n. quoslibet interponebat 15 gradū aequotialis, alij v. ad quos gradū ponūt meridianū, corū ia a Spherographo Belgij notat qdem 5 quibet gradū aequotialis parua lineola, sed ad 30 tm̄ gradū fractū integer meridianū. itaq; iuxta hanc vltimā proximū ponunt in globo integri meridiani 18 seu semi-meridiani 36. Nam longitudo loci alieusq; nil ē aliud, qm̄ distācia eig ab occidentali vltimo vltimo fractu, seu a meridiano insularū fortunatarū. †

Prop: 4 longitudinem locorū et horarū v̄s; diēas ex globo noscere †.

- 1^o obserua meridiana fortunatarū insularū, tū v̄s; ortū nūera in aequotiali, qd gradū illa meridianū distat a loca quopia, et totidem gradū erit longitudo illig loci. Vg. si vltimū sitū, qm̄ longitudinem habeat Antuerpia, inspicio meridianū fortunatarū, et ab illo incipio nūerare in circulo aequotiali, distācia usq; ad meridianū antuerpiensem, et inuenio gradū 24, tanta qō ē longitudo.
- 2^o hinc a. facile erit videre, qd horis sol meridiem et alias horas oēs vni loco citiq; faciat, qm̄ alteri nam ea loca, q; distant 15 gradib; ab insulis fortunatis, citiq; vna hora hnt meridiem et alias horas. ite loca q; distant grad. 30 citiq; hnt 2 horas, et sic sequit; usq; ad horas 24, et vltimū ins; quā loca s̄t 15 gradū aequotialis, v̄s; illa ē diēa v̄s; hora, si 30 duarū horarū, si gradū 7. cū medio, erit mediā hora. †
- 3^o v̄t v. s̄; usq; p̄mte q̄s; retineat, vide tabulā sequētē, in qua facile id fiet. minor n. tabella hinc oēs horas in centro maioris affigat, sic vt volui pot, maior v. oēs semi-meridianū r̄stendat, quas

quos diximus eē 36, ita ut q̄ om̄m sit canariarū et inde incipiat nūcrao, deinde post 10 gradū ē meridiana insula sancta crucis, tū hispania, Gallia, Germania etc. et poterit q̄q̄ facile in una carta plura loca colligere, qm̄ hīc sint, et ex globo illorū longitūnes exhibere.

40^o His tabellis ita colligatis, si q̄s velit scire, q̄ sit horarū distitas q̄ totū mundū, id fiet hoc modo: in minori circulo hora, q̄ tunc in sua patria ē applicet meridiano eisdem patrie et in eodem circulo scilicet de bit, quata sit hora q̄ totū mundū, Vg. vult q̄s scire sac hora q̄ ē 8 uestima Hesperij in Belgij, quata sit eo momento q̄ totū mundū, applicet hora 8 meridiano Belgij, et videbit eū tunc fere q̄ Roma v. in Germania, et sic de relijs, et apud Antipodas eē hora 8 diurna. vide sctm̄ sctm̄ ma. 4. 4.



50.

Propo. 7. Divisio globi terraq. jo globi terrestris ex supradictis dividit in terra
 et agn, aga v. vel e dulcis, et fluminu, vel salsa, et maris, rursus mare multiplici di nunc bybo-
 rei ope polu borealem, nunc atlantica ope Africa etc. mare gassiu in media asia nulla sensibile coeem
 bt cu oceano, mare v. mediterraneu di, et inq europam asiam et Africa fluit, etsi inq terra sit,
 cu oceano tri iungit. 2o sing e mare, qd inq terras se insinuat, vt sing pfrig. fretu v. angustu mare,
 qd inq duas terras fremit, vt fretu Gabitanu. 3o. terra v. supines in 4 partis dividit, Europa
 Asia, Africa et America, in singulis varia adue noia abendi dnt, vt an sit stinens, insula etc.
 stinens a di vel terra firma, q mari n ambis; peninsula vel Gergonesq di q fere mari iungit,
 relicta tm exigua terra parte (qm vocant Istmu) qua stinenti iungit, talis e Damia. t


Propo. 8. Declarat exemplis ras servanda in diggitione terrar. t.

jo dot geographi singulas et terra partes notatas ignoscere, et hac t psertim in singulis pderare,
 noia locoru, limites, qbz loca circumscribunt; figura loci, eig qritem seu magnitudinē, situ celeste
 q noisq ex longitudine et latitudine; pterea indaget loci naam et ingeniu, quas plantas, macha etc.
 gignat, deniq sua a aliqua, mores, politiam etc. ga v. n pnt oia loca seripto tradi, exemplo vno vel
 altero reliqua explicabimq, psertim adhibito ipso globo. Itaq Europam pderemq, ea videns, stinente
 insulas ac penninsulas complecti; di sic ab Europa Agenoris Regis filia, qm a Ioue aduuta in Grefam
 fabulosa credit antiqtas t. limites eig st a meridie, mare mediterraneu, et Gades, siq ab Africa
 separah, ab occidente claudis oceano, a stentione m. oceano byboreo, siq ab America separah, li-
 mites eig ab oriente st pntq eusing, nunc mare magior Paly maot's, fluuiq tanais, q hodie Dom di, atq ita
 iuxta illu uerfu. Europa atq Asiam tanais determinat amnis. magnitudo Europa seu qritas nuerah,
 quo ad longitudinem a Gadiobz vsq ad tanaim fluuiū miliaribz 3000, latitudo a a Sicilia vsq ad caput byg-
 boreu miliaribz 2400. Attende a hanc loci longitudinem explicare loci magnitudinē, adeoq desm ea ab
 ea, vt supra ppoae 5 explicui, q tm explicat situ celestem, qm et Europa iam explicabo. Itq itaq respectu
 celi in Europa talis e, extremitates Europa australes st in latitudine gradie 35, boreales v. in latitu-
 dine grad. 70, longitudo m. et situ, tm signoz zodiaci in globo apparent. Na terra Europea fertilis e
 floru, fructuū, frumenti, cu varijs mineris, et odoribz et genis pfectioribz careat, q ex Asia adferit,
 qd ad sua spectat, in ea fuit olim Macedoni monarchia, et Romanoz chamnu e, summy Bonifex
 Imperator Ferdinandus 2^{us} etc. fuge de Europa figura, qm antiq Geographi slem dixerunt ee
 Draconi, cuius caput Hygama, ala Italia, et insula Britannica, pectq Gallia etc. eodem modo
 lustranda Africa, q e Gergonesq ac Istmo inq mare mediterraneu, et mare rubru seu sinu ghu Africa
 iungit. ab ortu stinat eodem mari rubro, ac Istmo, a meridie, vbi ad caput bore spei, in acumen de-
 sint, oceano aethiopic alluū, ab occasu mari Atlantico, qd nunc mare delnorth vocant, sine limites
 Asia et America patent, in qbz t illa puncta exarient, vps ita finibz t partiu mundi acadat ad
 partes pncipias, vel regna. ju in Europa incipiendo ab hypermia insula Britannica, vt facit Pto-
 lomag in ja tabula Europa, deinde vicina Anglia, Gotia, postea Hyganiam, Gallia Germaniam,
 tam

tam inferiorem seu Belgii, qm superiorem, Italia, Illyricum, Graecia, Italia, Mysiam, Hungaria, Moldavia, Polonia, Moscoviam, Balcia, uria q loca haec adverte, jo Hybernia in vulgarijs globis et magis vocari Irlandt. 2 Illyricum comprehendere Dalmatia, et Croatia, et vtriusq noie Jelauonia appellat. 3o sub graecia et Thracia complector peloponesu, q hodie morea vocat, itemq alias terras vicinas, quas nunc Turcia occupat. 4 sub Myfia Thines Wallachia, Bulgaria, Suecia. 5 Scandinia seu Baltia, sicut Dania, Northuegia, Sueciam, Groeculandiam, Lappia, et insulas maris Baltici. 6 Hic demum aduagam noia vtrius totius orbis celebrioru, vbi resident Reges, Principes cuiusq patria, aduicula earu longitudine, vt inferuire possint horis vbiq dignoscendis iuxta sps. 4

Dublinu in Hybernia longitudine 12 graduu, Londinu in Anglia 20 gr. Edemburgu in Scotia 27 gr. Madritu 20. Lisbona in Lusitania 5 grad: 50 minut: Parisij in Francia 24 gr. 30 minut: Bruxella in Belgio 27 grad. 42 min. Nanciu in Lotharingia 28. Vienna Austria 37 gr. 45 min. Monachiu Bavaria 32 gr. 50 min. Praga Bohemia 39 gr. 15 min. Copenhagen Dania 34 gr. 30 min. Stockolm Suecia 35 gr. Mediolanu in Italia 37 gr. Laurinu 30 gr. 30 min. Florentia 34 gr. Mantua 32 gr. 45 min. Parma 32 gr. 30 min. Roma 36 gr. 30 m. Neapolis in Campania 39 gr. 30 min. Genoa Italia 30 gr. Venetia 34. Ragusa in Dalmatia 44 gr. 40 min. Constantinopolis in Thracia 56 gr. Buda Hungaria 44 gr. 30 min. Cracovia Polonia 42 gr. 40 min. Moscovia (quo noie dicitur) e partim in Asia, partim in Europa. 75 grad. 50 min. Ierusalem in Syria 68 gr. Cambala Regia Tartaria gr. 55. Baguin China 55 gr. Meaco Japonia 204 grad. 15 min. Goa in India orientali 55 gr. Calcutt 52 gr. Iava maior 55 gr. Algeria in Africa 22 gr. Carthago 34 gr. Maroco 15 gr. Cayzo Egypti 63 gr. Lima in regno peruano America 30 5 gr. Mexico in regno eisdem nois 182 gr. Bahia in Brasilia 35 graduum. p. t.

Prop. 9. Antipodes, Antechij, periceij, Antheij etc. Cognita ia tota terra regimz zphica fere terra zstitutionem, vel zphic vt vocant sphaera. ja sphaera dr recta, qm vterq pols e in hori-zonte, et zequit aquator in vertice, altera obliqua, qndo vng pols eminent supra horizontem, alth n. deniq sphaera parallela dr, du pols e in ipso vertice. pperietes hanc sphaeraru paulo post attingam, nunc de his noibz, qbz vario rto eary stades appellant. qda n. duv antipodes, q aduersa sibi figunt uestigia, i. s. sibi diametralit opponunt, sctz in eodem meridiano, et insup ptergen in sphaera recta et parallela sctz sub oppositis parallelis, quoru vng e borealis, alter australis, vt Vg. sit globz terra A B C D, in quo meridianz A E C G, B D F, aquatoris diameter sit C D. sint E F et G H diametri duoru oppositoru paralleloru, quoru ille sit borealis, sic australis, pols arcticz sit A, alter B, qbz positu habitatores. Vt sibi antipodes, cu sint sub oppositis parallelis, sub eodem meridi: ano, et 2du diametri E H opponant. item sctz antipodes C D, licet n. pmanz sub parallelis distis. Antipodibz porto straria oia indidit in sphaeris obliqs, A syens et agtas, dies et nox, ortz et occasz etc. et n. eundem habeant horizon-tem, opposita tn. inhabitant hemisphaera, et auersas facies horizon-tem intuent,



In sphaera a. recta, quado nox e in C erit dies in D et tra sine magis dieu, vel desitate
 anni temperatum, America extremi versu meridiem Statues antigodes dnt festoiaubg selytia
 populs. Antboesij vel antiola st, q stant sub eodem semicirculo meridiani inq polos incepto,
 et sub parallelis sine inde aqth ab aequatore remotis, tales st in figura E, J, item F, H in eodem
 semimeridiano, et in parallelis oppositis. Anticola deso spre hnt aqthem, hyemem diem mxum et
 minimu, eodem tn spre hnt meridiem et mediam noctem; Egypty dnt antiola coru, q in extre-
 mitate Africa stant. Periacij, v: circucola dnt, q sub eodem climate et parallelo, et sub eode
 meridiano stinent, s: inq eos mediat polg mundi, quales st E, F inq quos mediat polg st; si eandē
 roem sproum hnt, aqthem, hyemem et quado tn. Syce e nox, illis e dies. Incola singularu cana-
 riary dnt giacchij chinaru. Nota ex dictis seg Statues aequatoris C D ee tn antigodes et
 simul giacchos, n a anticolos, qa nullg parallelg aequatori opponit, Statues v. in sphaera parallela,
 vt A B ee sint antigodes et anticolos, n a giacchos, qa n st sub isdem parallelis. f.

Ex umbray dia tria statum noia oriunt, Amphisij, Heterosij, piseij. Amphisij st, quoru umbra
 in boream et austru iaiunt, vt fit in zona torrida. Heterosij, quoru umbra usq alterutru tm
 polu iaiunt, vt fit in temperata, mign n. hi in Europa piumq umbra ad meridiem. Piseij st,
 qbu umbra circa horizontem circuegrat, in frigida, quado e, si duas eas umbras conuenire sphaera ob-
 lig, recta et parallela. f.

Prop. 30. locoru distias metri. oum faculting mg e, qd altitudinis vtriusq
 loco, qm ingrimq, applicare vt supra ppe 5, ac deinde videre, qd gradg inq vtriusq locu interijun-
 unt, hos gradg in 35 miliaria germanica, vel 60 italia ducimq, vt habeat distia vtriusq loci nua-
 rata in miliaribg, gradg n. vng 35 milliar. german. Et aut leuas quasi 20. Ido alig mg e sic:
 extensu circinu ab vno locuq in alteru, transfer deinde et applica aequatori, et nota qd gradg in-
 terijunq vt antea; si in globo posita eet scala aliqua peculiaris miliarioru (vt in mappa solet
 ee) tunc intercedo locoru accepta q circinu explorat, applicando circinu debite extensu scala
 miliaru. 30. Nota, hanc distiam sumi 2du lineas rectas, ac opterea in terrestri itinere n st p-
 sise dici locoru distia qth viary obliquatem. f.

Prop. 31. definire, usq qm partem vna regio ab alia vergat. f.
 30 solent regioes inq se comparata distingui in ordine ad plagas mundi, vel ventory sity. v.g. quado
 dnt, hispania st a plaga orientali Gallia et. 2. versu qm partem vna regio vergat, inueni-
 et hae praxi: locu in quo sumq, a cu quo aliu comparamq, sub meridiano anco collocamq, et 2du
 latitudine iggig, polu globi leuamq supra horizontem, tu qd altitudinis affigimq in Zenith
 more xucto, eamq extendimq supra altera regionem, cuiq situ a priori dnamq, et tandem extremi-
 tas qd altitudinis in horizonte inq ventos distendet, quorsu hae regio ab alia spectet. hae praxi
 inuenies caput bona spei in extrema Africa ee ad austru itu Europe, item Hispania dnt Belgi
 vergat ad ventu africa, mediu inq occasu et austrum. f. 30. ex hae ppe colligiq q patria sit alteri
 ad

ad sinistram v. dexteram; dextram n. iuxta geographos et artem de celo statuit in oriente et in occidente sinistram; strario mo loquuntur astronomi de oriente et occidente. praeter v. dextram et sinistram in polo statuit.

Prop. 12 locum, ortum et occasum solis inuenire.

1. supra dictum est prope signa zodiaci, dies et menses assignari in horizonte, quod illud signum et gradum, feriunt e regione dies, per qua ingris, is est locus solis eo die et mense. in anno a bissexto post 28 febr. additur unus dies ad locum solis inuentum, ut si per gram Sedre scilicet nominis Junij, regiam in globo horizontis gradu 14 geminorum, cuius gradus bissexto addo 1, erit ergo sol in 15 gradu. II. ortus solis qua hora oritur scilicet sic: 1. statuitur globus astronomicus ad poli elevationem regionis tuae, deinde locus solis seu gradus eclipticae, in quo est sol, adducit se infra meridianum, simul indice cyclo horarii applicat ad horam 12, postea voluit globum cum indice donec locus solis perveniat ad extremam superficiem horizontis ex parte orientis, et index in cyclo horario ostendat horam ortus solis. si si occasum vis, verte locum solis, dum attingat horizontem ex parte occidentis, et rursum index in cyclo horario ostendat horam occasus solis. Ex duobus his: 1. ortu et occasu solis colligitur calerrime et clare quantitas diei, nam tot horae sunt dies, quae sunt in ortu et occasu, ut iam 7 majus sit fore 15 horae per diem, quas si ex 24 subtraham, habeo quantitatem noctis. Sic initium et finem crepusculi aestivum ac aurora inueniunt, modo id advertatur tunc utrumque illud crepusculum fieri, quando sol occidit infra horizontem gradibus 18. 1.

Prop. 13 horam ex globo colligere. Globo ut supra collocato locus solis adducatur sub meridianum, eius stylus applicetur perpendiculariter, et simul in cyclo horario ponatur index ad horam 12 mediae noctis, tunc elevatur globus, donec nulla umbra faciat stylum, et hora indicabit index in cyclo horario. 2. Stylus applicetur stylo loco solis et vertatur donec nulla umbra faciat, tunc n. umbra axis mundi est geographicam alignantur gminet ostendit in cyclo horario. alij m. modis horae colliguntur et horologia facti, de quibus alij.


Prop. 14 proprietates variarum sphaerarum ingere. 1. Considerant geographi 7 scilicet sphaeras, in quibus est notabilis differentia. 1. sphaera recta. 2. sphaera obliqua cuius vertex est in alterutro tropicorum, et aequinoctium. 3. obliqua, cuius vertex est in alterutro tropicorum. 4. cuius vertex est in tropicis et polaribus. 5. cuius vertex est in alterutro polarium. 6. cuius vertex est in tropicis et polaribus mundi. 7. est sphaera parallela, cuius vertex est alteruter polus, in qua omnes paralleli aequatoris sunt paralleli horizontis, et aequator ipse cum horizonte coincidit. 2. in sphaera recta omnia caeli puncta et astra quotidie oriuntur et occidunt, deinde n. est ibi noctis et dierum magnitudo, spectum agnoscitur, praeterea sunt duas aestates, et duas hyemes, his in anno sol per eorum verticem transit, in utroque se agnoscitur, hinc recedit, scilicet versus utrumque tropicum, quo tempore sunt hae duas hyemes, et illa hyemes n. sunt ita frigidae. denique sunt quatuor dies, mane sunt umbram occidentalem, vespere orientalem, sole percurrente signa borealia. 1. ab v. usque ad $\frac{1}{2}$, in meridie sunt umbram versus austrum; at sole percurrente reliqua signa percipiunt umbram versus boream, adeoque sunt amphicycij, in hac sphaera sunt plerique Africae et Americani, item spatium alij curia extremam India orientalem. Non sic vacat omnium locorum proprietates, addu.

adnuere, eas facile inueniet, q̄ globū statuet astronomice iuxta cuius loci exigentiam. diligenter a. aduertat loci uerticem semper distare ab Horizonte gradibz 90, quos gradz uertet in meridiano, Vg. si q̄ uelit nocte p̄rietes 3a st̄ois. i. ubi uertex loci sit in tropico; eleuet q̄ et deprimat totū globum, donec tropic⁹ sit 90 gradibz supra Horizontē globi, tunc eorū p̄rietes aduertat, q̄ se. vna tñ habeant aptatem, et vna byemē, q̄ vng polz q̄ eleuet ad gradz 23 in medio, alij v. polz cū vicinis st̄elis p̄petuo lateat sub Horizonte, q̄ sol seel in anno supra eorū uerticē existat, quo t̄p̄e nullā bnt, ne ipsi q̄dem p̄ctis pfundissī umbra, alij t̄p̄oribz 3 bnt umbrarū diuas, se. ori- entale umbra, occidentale, et 3a ad polū suū xp̄iciuū, unde s̄t heterogij. 30. m̄to loco solset ceteris antedictis eadē praxi indagabis reliquarū regionū p̄rietes. itaq̄ hęc p̄p̄o ē tanqm̄ ag- phicū p̄cedentiū ad ipsas regiones terrestres inuendādas. †

Prop. 35 mapparū Ptolomai, Appiani, gemapdrygij artificiuū exponere.

Ptolomaz geographic⁹ princeps, q̄ floruit t̄p̄e antonij p̄i sub arā Xtī 540 varias orbis descriphōes do- cuit, nā lib. 3. cap. 24 d̄p̄h̄ia orbis descriphōem tradit, quarū prior pendet ex aspectu s̄bara mota, in qua meridiani s̄t tanqm̄ linea recta, paralleli v. tanqm̄ circuli, p̄sterior v. descriphō sit ex aspectu s̄bara q̄escentis, in qua meridiani p̄ vñ et paralleli s̄t circuli. Aduertī porro d̄t, ex mēte Ptolomai illū vñcū meridiani rectū se. A B diuidere aqualit̄ totā terra longitudinē, item paral- lelu q̄ byemem se. C D diuidere aqualit̄ totā terra latitudinē, cū itēam a puncto F. ad centrū duci rectam lineā, edū illa recta d̄t xp̄ctū n̄ aspectū, et tū ex optica suppono oriri figurā, qm̄ videtis tabula p̄tolomai. vide etē. apud eundem lib. 7. c. 6. modū descriphēdi armillarem s̄bara cū terra in plano. Ptolomaz insup̄ p̄t asseribi aliā p̄ictio globi

terreni in plano, qm̄ in suo astrolabio tradit hoc modo; circuliq̄ agnoscit̄is terra in 2 hemisphaeria diuidit, quorū vñū ē S. septentrionale, aliud meridionale, poli v. s̄t in centris circulo- rum, ut videre ē in infima parte figurarū. optica hanc delinētiōem obseruauit Appian. l. 3. cosmogr. c. 19, ultra tñ agnoscit̄ale eā ad tropicū q̄ extendit, eandē et p̄to- plering in astrolabio p̄tolomario obseruat, et ideo solēt hęc p̄ictio duci p̄stulerim. † iuxta hunc modū facta ē a p̄re Gigato mappa, q̄ p̄ctissū seruit ad horarū distem



toto orbē inuendāda, et q̄ is h̄ms vñuis gentiū a forte gerah, in q̄z m. mappis d̄mstrari p̄t q̄o duo si ex eadē urbe suūt soluant, et vng ad ortū, alij ad occasū egens totū mundū circuiret, postq̄m iā ad eandē urbem vterq̄ suūt rediret, n̄ uenirent neq̄ in dierū nūero, neq̄ in noiē ferie, s̄ vng diceret eē diem luna, alij diem mercurij etc. in mappa Gemapdrygij aquator p̄icitz in rectā, paralleli v. quo magis ad polos accedunt, eo magis incuruantz, item vng ē

meri-

meridiani recti, idē qm zōnāz aspectu, ceteri a. eo sūt curuiores, quo ab eo recedunt. In mappa
 Jois de zonas equator et oīs paralleli in rectas p̄ciunt, et meridiani in elipses, seu ouales. i.
 orteli v. mappa aliq̄ participat ex utraq̄, nā parallelos sūt rectos, uti Roias, et meridianos
 circulares, ut p̄brigus. i.

Propos. 56. Praxis vtendi mappa generalibz.

Si mappa geules describans figura circulari, ac in 2 hemispharijs iuxta modū Gemmastruzi v. aliorū n
 abstem, facile erit ijs uti ex dictis de globo, in ijs n. idē oīs circuli sūt, excepto horizonte, itaq̄
 lineas rubras zonas distinguere, eleuōem poli inuenire q̄q̄ p̄t, p̄sertim si hac in ipsa mappa exp̄ssē ponat,
 uti pagin sūt, si v. mappa sit in figura circulari iuxta p̄ctioem stolierini, ea vltē q̄q̄ hoc modo:
 se inueniet poli mundi in centro mappa, et ex illo videbit oīs meridianos ad circūferentiam mappa
 tractos, q̄ quos oīm regionū longitudines agnoscat descriptas in eadē circūferētia; circūferētia ipsa
 representat agnoscitāle, a qua si distātia loci nūeres, sūt ipsiq̄ loci latitudinē vel poli eleuōem. et.
 si mappa sit forangularis iuxta modū mercatoris vel stem, ita colligenti in ex circulis p̄sara
 agnoscitāli et sūt tractis q̄ lineas rectas; ex antedictis u. p̄ctioē applicando rectis, q̄ de curuis in
 globo diximus; sola forte erit difficultas in metiendis locorū distātijs, eo q̄ gradz in mappa mercatoris,
 fr̄q̄ et aliorū n. sūt inq̄ se agtes; verū q̄ hoc 2. praxēs in ipsa mappa notant, ut minimū sumat
 gradz medijs, et iuxta eos fiat mensuracō, v. g. si metiar distātia, q̄ ē inq̄ duo loca inq̄ se remota 44 gradibz,
 capio gradz aliq̄ v. g. 4. intermedios, et q̄ circūm ad eos extēnsū totā distātia metior; siq̄ q̄ eos gradz
 medios inagltas reliquorū vltiq̄ compensat, sūt n. ita exactē. i.

Prop. 57. praxis vtendi partibz tabulis. i. Tabulas partes voco, q̄ vtriusq̄ parte
 orbis, descriptioem v. g. Europa, Germania etc. quales p̄tholomaeus et alij sūt. 2. in his tabulis
 pars superior plerūq̄ ē septentrio, inferior merides, pars dextera imperientis tabula, orions,
 sinistra occidens, q̄ zōnā m. locū sūt in quolibz mappa, p̄terq̄ in stolierini et sūt. itaq̄ facile
 videbit, q̄s long sūt in oriente etc. 3. gradz in superiori et inferiori parte notati sūt gradz longitu-
 dinū, gradz a dextera et sinistra, latitudinū; hinc facile q̄s fiet loci alieniq̄ latitudinē hoc modo:
 regula, vel filū extendat ad vtrūq̄ latq̄ tabula, ita ut fiat linea parallela superiori parti tabula,
 et tunc in lateribz tabula sūt latitudo, ita apparet, longitudo Roma ē 36 grad. latitudo a iuxta
 hanc praxim gradū sere 42. sic extendendo regula a p̄te superiori ad inferiorē rectā q̄ locū aliq̄m,
 sūt eig longitudo notata in gradibz, ut vtrūq̄ Roma, de qua iam, p̄t solo oculo plerūq̄ res notari. i.

Prop. 58. praxis vtendi mappa nautica et arte nautica.

Antiq̄ in suis nauigibz stellas et micē vtrā adp̄ciebant, idē illas se in nauigōē dirigentes itaq̄
 quādo stella n. apparebant, u. ingenti nauigabant piculo. nunc v. inuenta acu magnetica q̄ ad tri-
 tionē uergit, seure nauigat m. nulla stella apparente. 2. huius securitatis vtrō ē, q̄ nauta in
 globo iuxta p̄os. ii, vel in suis mappa vident, verū q̄m plagam tendat locq̄, ad q̄m nauigant, uti
 illiq̄ loci, vnde solunt; tū sequuntz Romū aliq̄m vel lineam rectā, q̄ ex loco, in quo sūt, ad alterū
 p̄ducit

ducatur, et in hunc finem circa maria passim in globo vel mappa existant pixides nauticae, seu
 aq. cu. radijs, seu lineis 32 q. representant ventos, et ex centro pixidi q. tota mappa disjungunt. et
 itaq. q. nautici gubernat, cu. semper Rhombu. obseruat et curat, vt prora nauis cu. angulo cu. linea
 fractionali faciat, sicut ille Rhombus facit, idcirco di. gubernaculu. agitat, semper tu. Rhombu., tu. frac-
 tionem in pixide respicit. 30. ceteru. nauta pleriq. n. oio breuissimam uiam sequunt, s. paru. decli-
 nat, qd. fit, eo qd. polu. magnetis distet a polo mundi pluribz gradibz: in hoc globo polu. polu.
 magnetis vtu. insularu. capitis uiridis, distare a polo mundi 56 grad. et paulo amplius, vtu. insularu.
 corui 53 gradibz. aliunde m. pt. ea nauigis obligtas quere. f.

Prop. 19. Partis regionis descriptio seu Xooxygrafia. f.

1. Xooxygrafia n. spectat gradz longitudinis vel latitudinis, s. debitu. fite. partiu. aliuius terri-
 torij, vq. q. vnu. gradu. n. occupat, fitq. hoc modo. Conspice turrim, vnde oppida, uillas, castra etc.
 pns. circumspicere, atq. ibi in plano aliquo horizonti parallelo due linea meridiana, tu. ad eiq.
 latera erit oriens, et occidens. Plano hui. sic astronomice constituto, et obseruato dioptra sup-
 pone, q. circa punctu. A uerti. posit, et q. p. inspicere pns. ad loca circumspecta; itaq. p. ea p.
 aspice in C. et iuxta eam sic directam due linea AC, eodem modo directu. dioptra ad locu. E
 due paribz linea AE vsq. in F, p. loco B sufficit ipsa linea meridiana, idem facies cu. locis G. H. D.
 etc. qbz factis uade ad vnu. ex notatis locis vq. D. ibiq. turrim. pende. C. gerit. statio. rda. et
 plano eodem iteru. astronomice collocato in D. fige dioptra, et q. ea respice in C, et iuxta ea due
 lineam DC, eodem modo respice in cetera loca et due lineas DC. DE. DF. DB etc. na. in pun-
 ctis xursum C. E. F. etc. fit. pingenda castra, uilla etc. eritq. hae minor figura in plano designata
 sicut ipsi regioni, sicutem. xstat. ex sicut. oio. zangulis. Ex loco D. pnt. alia notari loca, q. postea
 ex 3a. statioe. resp. punctis xursum. distribuant, et sic deinceps, donec tota quincua. moscat.

qosi. nota fuerit vna. ex distantijs, reliq. oes. scient, vt. si. AC. sint. 5. milliaria, di-
 uide. eam. in. 5, et. postea. q. circinu. uide, quot. eiq. modi. partes. sint. in
 AB. scilicet. 15. atq. ita. facies. 15. milliaria, et. sic. in. alijs. f.
 plura. uide. in. geometria. practica. de. agris
 aut. syluis. mensurandis. p. 4.

Finis Geographia. f.

Modus transferendi mappa minorem in maiorem vel contra.

Fac tibi duos circulos sibi invicem oio aqles, et aqles in partes diuisos, ex qbus p^o A B C D. et E F G H
 reliqua carta exsindat; qbus ita factis applicabis regulas inaequaliu partiu, vna n. p^olinebit milliaria
 minoris mappa, altera maioris, in centro circuloꝝ, ita vt vltus line inde gant, et s^ois in p^ontm.

Praxis. porro si uelis mapam minorem in maiorem transferre, sic ages: pone circulu^m maiore
^{regula} sup mappa describenda, et minorem regula inoto suo circulo velue sup mappa,
 quam transferre uis, ad singulas ciuitates, oppida, pagos etc. et nota et nota
 qm numero tibi in circulo abindat, et qd numero in regula vrbe, oppidu etc.
 abingat, hoc facto regula maiorem ad eundem in suo circulo numero uolues,
 et ad numeru regula inscriptu vrbe, oppidu, vel pagu notabis.

Obserua a. circulos in medio ferme mapparu collocandos, ita vt principiu
 numeroru versu p^oentricem in vtroq circulo vergat. Vg. inuenit vrb ali
 qua in regula parua numero 15 collocata sup 65; colloca regula maiorem
 sup 65 sui circuli, et ad 15 in regula vrben describe; sic de ceteris. p.

Finis. Amen Amen Amen . p. n. p.

Figura Pro modo transferendi Mappam minorem in maiorem vel contra





Figura pro modo transferendi Mappam minoren in maiorem vel contra.

pro Appendice de *Zonis mundi pag. 95.*
Zona frigida Periacii



Propos. quibus
 tribus punctis quocumque
 intervallo in se dista-
 tibus circuli descri-
 bere, q. ea tria pun-
 cta in sua circumscrip-
 tione includat.
 Quomodo illa tria pun-
 cta in recta
 linea . . .

Tractatus 5 De Astronomia eiusq partibz.

Astronomia e sua, q corporu celestiu motz eidentibz demonstrat, dicit ab astrologia, sicut ea ab esse, astronomia n. leges et motz celestes explicat, Astrologia ex motu cali et influentijs dnoq stellaru aspectu futura punit. illa certa et euidens, hae pleriq falsa, nec intz mathematicas suas, s. physiologicas computat: Astronomia partes st jo doctrina de sphaera, seu jo mobili. 2o e dno mobili, seu de motibz et passioibz planetary. 3o Gnomonica seu de roe umbraru et gylh. 4o computo ecclesiasticz. 5o Geographia, nos duabz posterioribz ra tractatis, priora tria sic breuiter tractabimz.

Pars ja de sphaera. i. eiusq usu. i.


Dua st partes huius doctrinae, ja agit de motu jo, q referit ad cali extremum, qz in sphaeris porie explicat. secunda agit de motu 2o, hoc e, motu planetary, e a. motu jo ille, q fit ad ortu in occasu ui jo mobilis rapientis seu celeritate summa orbis inferiores, absolutiq sphae et horary, unde et diurnz di. motz 2d e raryz prioru, fit n. ab occasu in ortu, atq ad planetary orbis referit, nec eodem sporis sphae absolutiq, estq nil aliud, qm gta retardantia. di porro doctrina sphaerica, qz de circulis celestibz agit, ex abq sphaera maalis rphat, qz nullu intz oia artis imstrata ppig accedit ad cali faciem, nec ullu accomodatq e ad eig motu exprimendu, qm sphaera maalis. i.

Quar. j. qd sphaera, q principia et partes eig. R. iuxta dnoem Vedesij nihil aliud e, qm corpu jo: lida vna superficie sfericu, in cuius medio punctu e, a quo ois linea ad extrean superficiem ducta intz se st aequalis. sphaera armillaris seu maalis e globz celestis, rphans suis circulis et imaginibz celestibz.

R. 2o sphaera sic definita partes seu iugia st, puncta seu centra, linea, axis, diametri, superficies et circuli. Ad puncta qd attinet, illoz tria in sphaera inueniuntz, se. centru, poli, punctora inflectiones. centru e media sphaera punctu, a quo ad circuleriam ducta linea aequalis st, qd iteru rphat e, physicu et mathematicu, seu sensibile et insensibile. tale centru e terra ntu totiq vrsi, sensibile, quo ad inferiores sphaeras planetary, insensibile ntu vltimi cali. Poli axo vō πολειν, dicti. | a vertendo, st duo puncta extrean utriusq axem zminantia, quoru 3 iteru st in sphaera; poli mundi, seu aquatoris, poli zodiaci, et poli horizontis. poli mundi st duo puncta axem mundi vtriusq zminantia imobilia ad motu sphaera, quoru vng ventionalis, alth meridionalis, dir a poli aquatoris, qz vbiq aequalit semz distat a circulo aequinoctiali scil. 90 gradz, unde et agly circa illos mouet. +

Poli zodiaci vel eclipticae st duo puncta extrema in axe zodiaci, remota a gradibz 23 a poli mundi et 5; min: 2b, circa hos polos aequalit et vniuersit pfecto mouet zodiacz. Poli horizontis st puncta qz lineam recta ductam p Zenith, et medio cuiusq loci, et centru terra vtriusq zminant, e a. Zenith vna bria nihil aliud, qm punctu verticis, cuius oppositu e nathir. 2o st partes sphaerae lineae, quaru alia diametri et axes, alia ppendiculares et parallela. axis e linea qz ducit ab vna superficie sphaera p centru ad opposita, cuius puncta extrema dir poli. officiu huius lineae e, qd circa ipsa voluat sphaera. diametru e linea

nueroru applicent duo tropici 69 et 71 quoru guttioni sibi p eorundem diametros . 4 eodem
 pacto nuerabris totidem partes seu gradus ab utroq polo usqz aequatorem in iisdem coluris et zphi-
 tuentz circuli polares arcticus et antarcticus . 5 partibz circuli zodiaci ambitu eodem agtis 3 partibz mai-
 oribz , latior tu 75 , ita vt in latitudine stineat 12 gradus , in suis circuli medio describitur linea ec-
 cliptica , q diuidat in 360 gradus , 30 qbzq vnu signu assignando , qbz et menses anni singulis signis cor-
 respondentes addere poteris . sic patto circuli totu obiqz secat aequatore in 4 punctis , duobz circulis
 coluri se solstitioz et agnotioz , sic vt 29 gradus arcticis ponat in puncto interfectionis agnotialis
 et coluri eig , 29 v. gradus 69 in puncto interfectionis coluri solstitioz et tropici 69 . 29 v. gradus 71 in
 puncto interfectionis agnotialis et coluri eig , 29 gradus 71 in puncto interfectionis coluri solstitioz et tro-
 pici 71 . Et n. hae 4 puncta cardinalia distinguunt totu annu in 4 partes . 6 fiat meridianus diuisum
 4 quadrantes circuli , ea rae , vt si :
 Sui circulo vna cu axe tota
 ang et horizon apertu , vt
 tota sphaera libere
 lig tota rem



ms duoru quadrantu in polis zorientibz
 sphaera imponit , deniqz ita meridi-
 intra ipsos fixos et imobiles
 circumuoluat ; sed me-
 in hoc schemate cerues.

Cap. 2

Caput 2 De officijs et usu circuloꝝ . 1.

Quar. 1. q̄ sint officia agnoscibilia. Et jo Notandum e, s̄b̄arā zōlicū d̄derari ab astronomis, s̄c̄l̄a recta, obliqua et obliquissima. recta e in qua uterq̄ polꝝ horizonti incumbit, veluti orbꝝ ijs, q̄ stant sub linea agnoscibilia, q̄q̄ p̄ctuo polꝝ uterq̄ et oēs stellæ in firmis q̄ anni decursu apparent. obliqua e, quōd vna polꝝ attollit supra, alter infra horizontē demergit, et t̄l̄e s̄b̄arā h̄nt oēs illi, q̄ declinant ab æquatore, sic n̄ vna polꝝ nūq̄m apparet alij semp̄. obliquissimā h̄nt illi, q̄q̄ polꝝ mundi zēmits e, et horizon æquator, it̄q̄ oēs illi, q̄ sub polis stant. In p̄p̄tis, q̄m officiu agnoscibilia e, q̄ ostendat q̄m mobile sp̄s 24 horarū circūdū, q̄ppe cū singulis horis 15 gradꝝ agnoscibilia in jo mobili descendi ascendant supra horizontem uniformis 2^o mensurat ips, longitudinē et q̄ntitatē h̄i artificialis, et noctis in quacūq̄ orbis terrerū habitare, e n̄ in quavis regiōe et quovis anni sp̄e dies artificialis tantꝝ, q̄ntꝝ e arq̄ agnoscibilia circuli, q̄ sup̄ semisphariū ascendit, dū sup̄ idē sol̄ comorah. 3^o irregularitē motꝝ zodiaci ab ortu in occasu, q̄m h̄t ob obliquū eiḡ s̄c̄l̄e p̄velut regula certissā dirigit. 4^o distinguit agnoscibilia dividit n̄ zodiaci circuli obliquū in 2 punctis s̄c̄l̄e in p̄cipio x̄ et ad q̄ cū sol̄ p̄uenit s̄c̄l̄e agnoscibilia 5^o e zōnā, a quo initū sumunt declinōes cūm punctōrū eclipticæ et stellarū. 6^o indicat q̄ cali pars dicah̄ n̄t̄rionalis, q̄ australis, in calo q̄dem stellarū, in terra v. regiōnē. 7^o mirū in modū d̄sc̄r̄it cosmographis et geographis, nā sine circulo agnoscibilia nulla terra d̄sc̄r̄iptio absoluta eē p̄t, nullaq̄ civitas in globo terrerū aut mappa p̄p̄o loco rep̄m. 8^o ostendit longitūes civitatū, earūq̄ r̄dū latitudinē distas, quōd horā eē miliaria . 1. Colligit, sine jo æquatorē singulis horis 15 gradꝝ attollit supra horizontem r̄tū puncti ortū. 2^o due civitates r̄dū longitudinē æquatoris 15 gradꝝ distantes vna hora distant, ac p̄sequi vni horā citiq̄ sol̄ ortū, q̄m alteri, ut uides in seq̄nti tabellā. si p̄vnt gradꝝ in horis et minuta revolue d̄sc̄r̄as. Nota solē vni gradu æquatoris 4 minutis hora absolue, quare si addas 2 gradꝝ h̄is 4, absoluet duos gradꝝ 8 minutis hora, sic 3 gr. 12 minutis hora p̄ficiet; sic q̄ st̄nūā gr̄dā additōem h̄ernari p̄ficere h̄i poteris tabellā, quertendā horarū in gradꝝ, et gradū in horas, notādo diligēti exagū vtra 60 minuta, s̄o n̄ minuta faciūt vni gradu, quare si 60 referas tanq̄m vna hora reliquū dabis minutis horarū. 1. vide in subiecta tabellā 1

Tabellā conuertē horarū gradū in horis et minuta. 1		Grady	Minuta	Horarū
1	15	1	4	
2	30	2	8	
3	45	3	12	
4	60	4	16	
5	75	5	20	
6	90	6	24	
7	105	7	28	
8	120	8	32	
9	135	9	36	
10	150	10	40	
11	165	11	44	
12	180	12	48	
13	195	13	52	
14	210	14	56	
15	225	15	00	
16	240	16	04	
17	255	17	08	
18	270	18	12	
19	285	19	16	
20	300	20	20	
21	315	21	24	
22	330	22	28	
23	345	23	32	
24	360	24	36	

Quar. 2

Quor. 2. q̄ officia Zodiaci. 18. Zodiaci, q̄ et via solis et planetarū, circuli mundi ab astro-
 nomis dr̄, dividit̄ in 12 signa, quorū unūq̄q̄ 30 gradū debet h̄re, unūq̄q̄ a gradū minutis 60. igit̄,
 unūq̄q̄ minutū, 60, idē 60 et sic in infinitū. igit̄ autē sumit̄ signū, vel p̄ci, vel physica, eorū
 igit̄ 30 grad. physica 60. nota porro et characteres signorū s̄i s̄t. +

¶ sunt Aries, ♈, taurū, ♉, gemini, ♊, cancer, ♋, leo, ♌, virgo, ♍.

libra, ♎, scorpis, ♏, arctorens, ♐, caper, ♑, amp̄ora, ♒, pisces. +

officia v. eiḡ h̄c s̄t. 1^a regula et mensura motū celestis secūdi, q̄ ē ab occasu in ortū, sicut aqua-
 tor ē mensura s̄i motū 2^a in hoc circulo contingit oēs eclipses, s̄i luminaria in ecliptica opponant̄, luna
 q̄dem eclipsis in plenilunio, solis in nouilunio. 3^a cast̄ inaḡtem dierū et noctū, iuc̄cipit̄ d̄ne 4^{ta} horum
 anni, vnde et caa ḡnois ac corruptiois a philosophis dr̄, + dividit̄ totū calū in 2 semispharia, sten-
 trionale et australe; latitudines item stellarū et planetarū determinat, sicut astorū declinōes aqua-
 tor. 5^a ostendit̄ ecliptica stellarū atq̄ planetarū vera loca in Zodiaco, in eorū loco dr̄ c̄, q̄ d̄cunḡ astri
 q̄ s̄m̄ transit̄ circuli latitudinis astri, ut s̄i transeat p̄ 30 leonis, dr̄ c̄ in 30 gradu leonis. ex his s̄t q̄
 ḡrere, q̄o recipienda s̄it ecliptica in calo, cui s̄t s̄i: recta linea a centro terra recipiat̄ transire
 p̄ centrū corporis solaris, vsq̄ ad s̄m̄ motū, nā ex motū annuo solis ab occasu in ortū, describet̄ circuli
 cuius circūferētia in s̄o motū existens appellabit̄ linea ecliptica, q̄ s̄i addant̄ vtrūq̄ 6 gradū, totū cir-
 culū igit̄ h̄rēt. 2^a quare sol s̄m̄ diat̄ manere in ecliptica et vnde h̄c igit̄ s̄t q̄a mathematici pau-
 latim aduertunt̄, solē singulis annis eodem puncto ortū et occasū eorū et, occidere, s̄p̄t̄im in solstitiis
 et aequinoctiis, eandem s̄m̄ meridiana altitudinē iisdem dieb̄ recurrentib̄ retinere; s̄m̄ sumam eiḡ
 declinōem n̄ ē, nisi 23 gradū et 30 min: q̄ h̄c cas̄s x̄luserunt, solem igit̄ currere vā media
 neq̄ ad dextram, neq̄ ad sinistra declinare, in relijs v. planetis aduertunt̄ straria p̄ntū, nūm̄ n.
 eodem puncto horizonis oriunt̄, nec eandem obseruant̄ altitudinē sup̄ horizonem, nec declināem,
 s̄ errant̄ hinc inde, vnde et planeta dr̄. + 3^a q̄ s̄t latitudo stellarū et longitudo, item q̄ declināo.

¶ Latitudo stellarū sumit̄ ab ecliptica ad polos vsq̄ Zodiaci, ē n̄ nihil aliud latitudo stelle, q̄ arcū
 circuli max̄ transeuntis p̄ polos Zodiaci, et p̄ centrū stelle, interceptū inq̄ ecliptica et verū locū stelle,
 longitudo v. ē arcū ecliptica ab initio arietis, vsq̄ ad circuli latitudinis stelle idē signorū successi-
 onem computat̄. n̄c̄rant̄ q̄o om̄ stellarū longitūes a 30 gradu arietis, latitudo v. ab ecliptica vsq̄
 polos Zodiaci, sicut in terrestri globo longitūes ciuitatū et regionū, computant̄ a 30 insularū canari-
 arū meridiano idē gradū aequatoris ab occasu in ortū, latitudines v. earundē ex meridiano ad aqua-
 tore incipiendo, ac vsq̄ polos pedendo. 18th. distinguit̄ latitudinē et declinōem stellarū, latitudo n̄
 ut dictū, ab ecliptica sumit̄, ab aequatore v. declināo. ex q̄b̄ patet aliquas stellas sub̄idē nullā de-
 clinōem h̄re, autē latitudinē, ut oēs stella q̄ s̄t in ecliptica. 2^a quasdam h̄re latitudinē, nullā in
 declinōem, sicut stella in aequatore 3^a aliquas nec latitudinē, nec declinātionē, ut stella in punctis
 agnosciorum. Nota 2. eleuationē poli, et latitudinē alieniq̄ ciuitatis, c̄ te oīo idem. +.

Quor. 3


Quor. 2
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60

Quar. 3. g. officia colurorū. jo duo coluri offendunt puncta agnoscitabilia et solstitia, di-
 uidentur equatorem et zodiacu, totiqz annu in 4 partes. 2. coluri bis in die fungunt uice meri-
 diani. 3o colurū solstitiorū polos zodiaci zinet, q̄ in tm distant a polis mundi, gnta solis mca decli-
 nas ut dicitur ē. 4o colurū solstitiorū diuidit sphaera et zodiacu in duas partes agtes, quarū una
 zinet signa ascendētia scilicet ♄. ☊. X. ♀. ♁. II. altera descendētia scilicet ♁. ♁. ♁. ♁. III. &

Quar. 4. g. officia meridiani. R̄jo ē zmg mca altitudinis et eleuōis stellarū. 2. astra in
 meridiano intensiffimū hnt uigorem. 3. astronomi initū horū sumūt a meridiano. 4. meridiani
 hūcū longitudo et latitudo regionū dependit. 5. zminat semidiurnū sps, et seminocturnū di-
 ci noctiqz artificialis. 6. in eo collocat̄ Zenit̄. 7. inuenta altitudo solis meridiana facile inuenit̄
 altitudo poli, de q̄ in glematis. 1. f.

Quar. 5. g. officia horizontis. R̄jo diuidit totū calū in duo hemisphaeria, sup̄ et inferiqz.
 2. ē caa recta et obliqz sphaera. 3. ostendit quātem diē et noctū, si n̄ diuidat oēs parallelos
 solis agtes, ut in sphaera recta, aequat̄ quoz diē et noctū, si magis, in magtē diē et noctū indu-
 at, ut in sphaera obliqua. 4. ostendit motū diū stellarū supra et infra horizonē. 5. manifestat
 puncta ortū et occasū oīum siderū, ostendit amplitudines ortū et occasū stellarū, q̄ nil aliud s̄
 qm arcū intercepti int̄ uerū locū stellae in horizonē sita, et puncta ortū et occasū agnoscitabiles.
 6. dngstrat gradū eclipticū, cū quo stella oriatur et occidat, posita namqz stella in horizonē
 notet̄ gradū eclipticū q̄ h̄ horizonē zingit, nā cū eo stella ista oriatur d̄. idem de occasu dicendū.
 7. indicat, q̄ stella p̄petuo appareant, q̄ oriatur et occidat; in sphaera n̄ recta horizon parallelos solis oēs
 agtes et b̄saria diuidit, ac p̄inde p̄petuū ibi agnoscitū, in sphaera obliqua, nullū, nisi aequatorem bi-
 fariā diuidit, ac p̄inde zinnuā magtē diē et noctū facit; in sphaera v. obliqz, siue sub
 polis, nullū facit parallelū solis, sed oēs paralleli, horizonē (q̄ idem cū aequatore ē) s̄ paralleli,
 ac p̄inde z̄ media pars stellarū hemisphaerij arctici p̄petuo apparet, altera p̄petuo latet. 1.

Quar. 6. g. officia circulorū minorū. R̄jo duo tropici includit et determinat uiam
 solis, extra quam sol nūqm egredit̄, item mcam solis declinōem, et puncta solstitiorū. 2. duo po-
 lares determinat distātia polorū mundi a polis zodiaci, item includit uerqz polū regiones,
 q̄bz mca dies anni, et mca nox maior ē 24 horis. 3. duo tropici et duo polares tam in calū
 q̄bz mca dies anni, et mca nox maior ē 24 horis. 3. duo tropici et duo polares tam in calū
 circuli in sphaera considerandi, ut paralleli solis, q̄ nil aliud s̄, nisi
 arcū diurnū et nocturnū, quos sol d̄u signorū successiōem totiqz anni
 decursu zificat, quorū s̄ 362, nimirū s̄ dies artificiales in anno,
 vel noctes; item paralleli horizonē, q̄ et arabicū s̄mlicantara, s̄g
 nihil aliud, qm circuli altitudinis solis et stellarū horizonē mo
 paralleli ex zenit̄ descripti, q̄bz inuicem in sphaeris et apho-
 labijs altitudines p̄ctas, item circuli uerticales, q̄ s̄ in polo horizonē cocurrentes, et d̄.



95
rizontem ad angulos rectos feciant q̄q̄ unestigam distias s̄deru ab horzonte et meri-
diano, arabice dnr̄ azimuths. †.

Appendix de 5 Zonis mundi. †. Vide figuram ad hoc pagina 90.

Dudum totus orbis terrestris in 5 zonas & duas tropicas et duas solares, quarum dua
vocantur temperata, dua frigida, et una torrida. torrida vocat̄ illa pars mundi, q̄ clu-
dit̄ 200 tropicos, temperatary spatium est illud, qd̄ est in tropicis et polares circulos. †.
illa q̄ est in tropicu 69 et circulo arctico, dicitur zona temperata borealis, altera
australis; frigidarum v. spatium est illud extremum, qd̄ continet circulos polares, arctico et an-
tarchico. vide p̄ter pag. sub fine. †. quare a. s̄i vocant̄, q̄ dicitur t̄ridij, metam.
quing tenent calidam zonam, quarum q̄ media est n̄ est habitabilis aq̄ta. mix legit̄ alta
duas (sc̄e. frigidas) totidem in h̄stram locavit, temperam dedit iuxta cū frigore flamma.

Quæres 1. q̄o unestigam, que zona quis loci situat̄. R. q̄ung loci latitudine est mi-
norem 23 gradibus et 30 minutis, zona torrida est inclusis, vel mixta pars s̄frica
traphia, Peruvia, mexici, India orientalis. 20 q̄ung loci latitudine maiorem
23 gradibus et 30 min. minorem a. 66 gr. et 9 m. zona temperata est subiecta, veluti
tota Europa, et maxima pars s̄cie borealis, iton America et s̄p̄tra h̄c cū terra
Magellanica. 3. loci quis h̄is latitudine seu elevatione poli maiorem 66 gr. et 9
min: zona frigida est subiecta, ut in Marebia, Emdlandia, Finnia, Biarmia, Isla-

dia, Laggia, Boddia, Einlappia, Crumlandia etc. de q̄q̄ orbis vide in magis. †.
Quæres 2. q̄o latitudo zone explorat̄? R. cum eadem sit q̄ortio circulorum terrestrium
ad caelestes, cui 15 germanica miliaria vni gradui caelesti Deant, si tropicorum
ad arctici distiam, q̄ est graduum 43, in miliaria germanica resoluas, habebis eis lati-
tudinem miliarium 545, torrida zona bis est mixtam solis declinationem, nimirum
graduum 47 q̄ ducti in 15 q̄ ducti in 15 p̄ducunt miliaria germanica 705.

Extremarum seu frigidarum Zonarum latitudo mixta solis declinatio est aequalis, quare si utriusq̄
latitudinem in 15 duas, h̄is utriusq̄ latitudinem in miliaribus germanicis.

Quæres 3. q̄ sit q̄ortio eorum q̄ sub distis Zonis habitant. R. q̄ q̄ung stant sub zona torri-
da, h̄nt bis in anno solem in Zenith, h̄y æstatem et h̄y hyemem, vocant̄ amphisyij et
s̄cie, q̄si eo qd̄ sole q̄ vertice illij transiente nulla umbra p̄cipiat̄. Amphisyij, qd̄ sol
illij umbra p̄cipiat̄ in utramq̄ partem, sole dem̄ borealis signa transiente in austrum
mexi.

meridionalia v. transeunte in hibernione. qui v. hant zonā temperatā, scilicet in anno hnt
 astatem, scilicet hyemem, et nunquam solē hnt verticalē, vocantur heterogij, eo qd sol semp
 illis in unam partem piciat umbra. q. v. hant zonā frigidam, maximū diem anni mai-
 orem hnt et horis, hnt stinua fere hyemem vel autumnū, vocantur gijij, eo qd solijs in
 horizonte ij circularē umbra piciat. qd si libeat ferre, quā sit dies stinua et nox in
 p̄dita Zona dato loco sic opare. detrahe altitudinem poli dati loci ex adrente sua 90
 gradibz, et remanebit declinatio gijij arcz semp apparentis, vnde ex tabula declinatio-
 nū facile regies initū illig arcz, cuius medietas ē unū initū. illud et gijijum canoni, qua-
 re duplicatqz dabit integrū arcū semp gijijū, opposito p̄petuo occultato. It̄ p̄terea sic
 p̄videnda dīsa nīclarū p̄ditioes, ut p̄iorū, frigidū, et st̄torū, p̄i get ur̄uēcola
 dū, It̄ ij q̄ sub eodem parallelo in oppositij h̄i partibz hnt hnt unā eleuōem poli, in hoc
 dīp̄gant, qd q̄do nobis ē dies, illis sit nox. conueniunt, qd eandem habeant eleuōem poli,
 It̄ dīp̄orū soloz, dīp̄gant, qd dū nobis ē astat et dies, illis sit h̄iems vel nox. It̄ q̄
 hant sub eodem meridiano in dīp̄i h̄i mundi plagis, eandem queqz hnt latitudinē. It̄
 illi versqz poli antarcticū transagatore, nos versqz arcticū eij aguatore, dū nobis ē h̄iems
 illis ē astat, et vtra, iueniunt h̄i in die et hora. p̄. p̄. vide pag. 88.

* It̄ q̄ p̄di-
 q̄ h̄i oppo-
 nantur.

Caput 3. De Problematis Astronomicis. 1.

Probl. 7. Eleuōem poli seu latitudinē cuius loci inuenire. 1.

Nullis modis eleuō inueniri pot̄. 1. p̄ tabulas in hunc usū comparatas, ut s̄t clauis,
 p̄p̄riū. Regionontang etc. quorū vsqz ille ē. inuenta ciuitē in f̄bas p̄uinciarū, statim
 e regione inuenies longitudinē eij cū latitudinē in gradibz et minutis. 2. p̄ tabulas
 cognographicas hac methodo. bre locū ciuitatis, vel si n̄ inuenias, accipe locū ei vicinū,
 hunc diligētē nota p̄ regulā aut circinū explorando, qd gradz ei in meridiano canari-
 arū p̄deat, tot n. gradū h̄nt eleuōem poli. si h̄nopolim inuenies h̄nt 49 gradz,
 et 50 minuta, moguntia 50 et 12. 3. p̄ obseruōes meridianaē latitudinē solis.
 accipe adrentem p̄lectū, exponas solē die agnocali hora 12, qm et p̄ compagū diligētē
 obseruabis. puncto a. hora 12 moueto adrentem sursum et deorsū, vsqz dū sol radios
 suos p̄ vtrūqz dioptrorū foramen miserit; h̄ expeditis obserua, qd gradz in limbo ab-
 sentat, illi n. dabit eleuōem equatoris sup̄ horizontē, cuius eleuō equatoris in horizonte
 nil aliud sit, nisi complementū eleuōis poli, hac deducta a 90 gradibz relinquitur eleuō poli.

* Sunt q̄ pedibus sibi opponuntur.

q̄sta

gita, si v. sine velis quous die, observa altitudinē meridianā modo dicto, hac inventa
 subtrahere a 90 et reliquo addere declinōem solis eotypē ab aequatore si in signis v. n. t. r. i. o. n. a. l. i. b. g. sit, si v. in australib, eandem declinōem subtrahes, reliquū n. dabit elevem
 poli. 4^o potens dependere elevem poli ex stella polari p. d. r. a. n. t. e, q. si in inferi-
 ori parte meridiani appareat altitudo eig cū adunctis 4 gradib, si in superiori cū sub-
 tractis 4. altitudo eig dabit elevem poli. 1.

Probl. 2. Declinōem solis invenire.

Declinō solis nihil aliud ē, qm alongas aequatoris a sole v. tra solis ab aequatore in
 t. r. i. t. i. o. n. e. m. vel meridianā. Invenimur a. o. i. a. p. u. n. c. t. a. declinōis ecliptica multis modis.
 p. vel p. tabula v. p. s. a. r. a. m. a. l. e. m, a. d. e. n. i. q. p. c. o. m. p. u. t. o. e. m. tabulis declinōis solis sic v. t. e. r. i. s.
 gre signū, in quo sol tum morat, in superiori vel inferiori parte tabule, et gradu eig
 in laterib, angulū n. cōs dabit declinōem g. itam. v. g. cupio scire qm sol habeat decli-
 nōem initio Tauri, gre 8 signū, et a latere tibi sinistro initū gradū, et in area coi
 videbis ii gradū et 30 m. declinōem g. itā. 2^o p. globū astronomicū h. a. e. r. o. e. apphia
 gradu solis, cuius declinōem gre ad meridianū, et ille respiciat tibi gradu solis decli-
 nantem ab aequatore. 3^o p. sinū sic, omnia m. x. a. solis declinōe, q. ē 23 gr. et 30 m. v. e. n. i. e. n. s.
 doctrinam finū in notitia declinōum o. i. u. m. p. u. n. c. t. o. r. u. ecliptica. q. a. s. i. c. u. t. s. e.
 s. t. s. i. n. g. t. o. t. u. a. d. s. i. n. u. m. m. x. a. declinōis, sic s. e. s. t. s. i. n. g. a. r. c. u. a. d. s. i. n. u. m, quo distat datū eclipti-
 ca punctū ab alterutro aequatoriali puncto nempe viciniori, si iuxta regula triū pedas, q.
 ueniet sinū, cuius arcū inuentū in tabula sinū offeret illic declinōem puncti p. p. o. s. i. t. i. v. g.
 p. o. s. i. t. a. declinōe m. x. a. solis grad. 23 et 30 m. libet p. u. e. s. t. i. g. a. r. e. declinōem qui gradū Virginis,
 q. recedit ab aequatōe a. u. t. e. n. a. l. i. 22 grad: multiplicata q. s. i. n. u. m. m. x. a. declinōis p. o. s. i. t. a,
 nempe 394 in sinū dictā p. o. s. i. t. a. 22 se. grad. q. ē 374 (v. t. in tabula sinū recto-
 r. u. v. i. d. e. r. e. h. i. c. e. t. p. a. g. 57) p. d. u. c. t. u. s. p. s. i. n. u. m. t. o. t. u. d. i. v. i. d. a. t, quotiens n. s. i. n. g. in tabula rectū
 ostendet declinōem gradū g. itam. 1. Tabula declinōis solis vide sequenti pagina.

Probl. 3. p. longitudines et latitudines locorū et civitatū dignis regere.

Nota totam geographiam in tribz p. t. e. r. e, in 5. Zonarū, parallelorū et meridia-
 norū p. i. o. s. e. De prioribus dictū ē, de posterioribz iam agendū. Meridiani itaq.
 circuli s. t. m. x. i. in utroq. polo sese interfecantes p. s. u. p. e. r. i. e. m. t. e. r. r. e. d. e. s. c. r. i. p. t. i, dicti meri-
 diani, q. cū sol illū subierit, oibz sub eo stantibz eadem sit hora sive nocturna sive
 diurna

Tabula Declinationis solis.

Grad Aethiopi	♌	Dignia	M ⁷	Dignia	♋	Dignia	grad. Egner.
g.	g. M.	M.	g. M.	M.	g. M.	M.	
0	0	0	11	30	20	12	
1	0	24	11	51	21	12	30
2	0	28	12	12	21	25	29
3	1	12	12	33	21	37	28
4	1	36	12	53	21	49	27
5	2	0	13	18	21	0	26
6	2	23	13	39	21	11	25
7	2	47	13	59	21	22	24
8	2	11	14	19	21	32	23
9	3	35	14	39	21	42	22
10	3	58	14	59	21	51	21
11	4	22	15	10	22	0	20
12	4	45	15	28	22	9	19
13	5	9	15	47	22	17	18
14	5	32	16	5	22	25	17
15	5	55	16	23	22	32	16
16	6	19	16	40	22	39	15
17	6	42	16	57	22	46	14
18	7	5	17	14	22	52	13
19	7	28	17	31	22	57	12
20	7	50	17	47	23	0	11
21	8	13	18	3	23	3	10
22	8	35	18	19	23	7	9
23	8	58	18	34	23	12	8
24	9	20	18	49	23	15	7
25	9	42	18	64	23	19	6
26	10	4	19	18	23	22	5
27	10	26	19	32	23	24	4
28	10	47	19	46	23	26	3
29	11	9	19	59	23	28	2
30	11	30	20	12	23	29	1
signa	Virgo. ♍ Pisces. ♉		leo. ♌ Aquat. ♋		Cancer. ♋ Capric. ♐		inferiora

Diurna. opus a. coru officiu e, longitudines locoru in aquatore determinare. parallelis
 et circuli minores et superficies terra descripti aquatori et distantes ac ad angulos rectos
 meridianos intersecantes, quoru officiu e determinare latitudine locoru in jario me-
 ridiano canariar. Investigatur go 2 civitate dytias, et hos circulos sic opare:
 1. si habuerint eandem longitudine. 2. loca fue eis, fue trans aquatorem drant hui
 latitudine, subtrahere minorem a maiore, et habebit dria latitudo, si n. danc ad milli-
 aria reuocis, tribuendo cuiq gradui 15 milliaria germanica seu astronomica, 5 his dytiam
 2 civitate gita. V.g. Roma et salzburgu eandem hnt longitudinem, latitudine drcam,
 Roma latitudo e 42 graduu. salzburgi 47. subtrahere 42 a 47, remanebunt 5, et
 illa

illa in 15 ducta dabunt 65 distiam Rome et salisburgi. 2 si duo loca eadem Sate
 ant longitudine sed latitudo vna sit borealis, altera australis, iungenda erit vna
 cu alteris latitudine, vt habeant eoru distia. Vg. Constantinopolis, et promontoriu
 bona spei eadem sit longitudinis, s. in distis plagis. Constant: 57 latitudo: v. 18
 43. Promontoriu v. bona spei 35 australe latitudo, q 35 aggregati ad 43 efficiunt 78
 gradus, q ducta in 15 dant milliaria germanica. si v. 2 vites longitudine haberint
 180, differant v. latitudine, aggregatu haru latitudinu a semicirculo 180 gradus sub-
 tractis, relinqt gradus in milliaria germanica revertendos. Vg. e Granada Hiza-
 nis vrb, cuius latitudo 37 grad. 59 min: item Guingai latitudo 313 gr. 40 min:
 40 si v. 2 loca sub distis eodem meridiani circuli exhiberint vna in Borea, alter in
 Austru recedens, aufer distiam latitudinu a semicirculo, vt habeant gradus in milliaria
 revertendi. V. C. Canton portu finaru et fluvii America Argentei dictu Vulgo
 delrio plata, prioris latitudo v. borealis e 30 gr. posterioris v. australis 36 fere
 distia latitudinu e 17 q ablata ab 180 nimiru semicirculo dant gradus revertendos
 in milliaria. s.

Probl. 4. Quantitatem dieru ac nocturnum, ac per zygus
 ortu et occasu solis inuenire data quavis eleuatiōe poli.

Elevationes poli.		47	48	49	50	51	52
Dies		H.	M.	H.	M.	H.	M.
Aug 23	mon. Apr.	0 12	0 12	0 12	0 12	0 12	0 12
Aug 20	mi. Apr.	15 12	50 12	56 12	34 12	58 12	58 13
		30 13	40 13	46 13	44 13	16 13	46 14
Aug 8	mag. Apr.	15 17	18 14	37 17	38 14	42 14	55 14
23		30 15	6 75	16 14	20 14	28 15	28 15
Jul 8	jun. Apr.	15 15	16 15	40 15	45 15	15 38	16
23		30 15	42 15	46 16	0 16	30 16	20 16

Tabula pro quantitate dierum et Nocturnum. s.

		H.	M.	H.	M.	H.	M.	H.	M.	H.	M.
Jul 19	Sept. red.	0 12	0 12	0 12	0 12	0 12	0 12	0 12	0 12	0 12	0
Jul 30		15 11	6 11	9 11	3 11	2 11	1 11	30 10	58		
21		30 30	22 30	16 30	12 30	8 30	4 30	30 0			
Jul 12	Oct.	15 9	34 9	28 9	21 9	8 9	5 9	9 4			
5		30 8	57 8	54 8	40 8	32 8	24 8	8 16			
Jul 30	Nov.	15 8	24 8	26 8	30 8	2 7	52 7	43			
21		30 8	18 8	8 8	0 7	50 7	40 7	8			



Noty

Not. 1. quantitatem diei artificialis, nihil aliud e[st], qm mora solis sup horizontem, noctis v. in-
fra horizontem, q mora du[ra] in d[ist]i[ct]is locis p[er] varia poloru' elevac[i]o[n]e multiplicat[ur] inuicem q[ue]r[er]at.
1^o p[er] p[er]p[et]uam m[er]id[ia]lem h[ab]e[re] p[er]p[et]uam. p[er]p[et]uam ad mund[um] s[er]u[er]i et elevac[i]o[n]e poli rectifiata ingre[ss]u gra-
du solis Herbipoli v.g. 22 Junij, quo h[ab]e[re] cu[m] app[er]et ad meridianu[m], positos indice horario
p[er]p[et]uam sup hora 12 exacte; p[er]p[et]uam posthac p[er]p[et]uam, v[er]o du[m] gressu solis exacte tangat horizontem
et inspic[er]e q[uo]d index sibi ostendat in limbo horario, h[ab]e[re] n[on] erit hora ortu solis q[ue] t[em]p[or]e q[ue]r[er]at si
v. t[em]p[or]e occasu d[ie]s, admove locu[m] solis ad horizontis partem occidentem, et monstrabit hora occasu.

Not. 2. Zodiacum apud poetas p[er]iderant ortu, Cosmice seu matutinu[m], acronicum seu vesp[er]inu[m] et h[ab]e[re] h[ab]e[re]
ortu cosmice e[st] ascensio stella sup horizontem, q[ue] fit mane p[er] h[ab]e[re] oriente. Occasu cosmice e[st] descensio
stella infra horizontem (q[ue] fit mane p[er] h[ab]e[re] oriente) v[er]o. Acronice e[st] vesp[er]ina stella ascensio sup
horizontem mane p[er] h[ab]e[re] regione occidente, sic ortu aries vesp[er]i solis in hora q[ue]r[er]at. occasu a acronice
e[st] descensio stella infra horizontem, q[ue] fit solis vna occidente, sic occidit iam les. de g[ra]t[is] h[ab]e[re] v[er]o.

Cosmice descendit signum, quod acronice surgit
Acronice descendit signum, quod cosmice surgit

Ortu Hehaag e[st] ascensio stella sup horizontem, q[ue] fit mane paulo ante ortu solis. occasu v. q[ue]r[er]at vesp[er]i
paulo post occasu solis s[er]u[er]i positos si p[er]p[et]uam recte p[er]p[et]uata indice suo horario hora 4 ostendat, d[ic]it[ur]
solis ortu dato t[em]p[or]e hora 4, et vesp[er]i p[er] h[ab]e[re] hora 8 occidere, cu[m] arcu[m] meridiano ad ortu et occa-
su aequalis fit, has horas si colligas in vnu[m] inuenies diem e[ss]e 16 horaru[m], cuius noctem si velis subduc-
20^o 16 a 24, remanebit q[ue]r[er]at noctis. p[er] h[ab]e[re] q[ue]r[er]at d[ie]ru[m] et noctu[m] e[ss]e q[ue]r[er]at doctrina h[ab]e[re] ingri-
si q[ue]r[er]at mollior op[er]o e[st] inspic[er]e p[re]cedentes tabulas pag 90. quare v[er]o ille e[st], in vertice tabula q[ue]r[er]at
elevac[i]o[n]e poli sui, e latere v. signu[m] cu[m] gradu, et in angulo coi[un]ct[ur]e regies arcu[m] dies a sole descensum
vna cu[m] minutis, qm si subtrahas a 24, h[ab]e[re] q[ue]r[er]at noctis q[ue]r[er]at dato. v. h[ab]e[re] q[ue]r[er]at in cylindro
Horologio videre potes ex lineis illis obliq[ue] q[ue]r[er]at altitu[m] solis, q[ue]r[er]at accurat[ur]e asp[er]at q[ue]r[er]at
diei. p.



Prot. 5

Problema 5 crepusculi inuestigare

Notj. crepusculi duplex e, matutinum et vespertinum. matutinum e data lux ante ortu solis, vespertinum post occasum, matutinum incipit sole 18 grad. infra horizontem dimerso, vespertinum totidem; caa vtrigq. crepusculi haec e, qd pars terrae a vaporibz densatis a sole illustrata conspiciat a nobz qd, fit crepusculum, na cu plurius gradibz distat, illustrat qdem aeren subtiliorem qd, qd ad hunc spatium eleuat vapores ut a sole illustrati ad nos lucem reflectere possint, n dr crepusculum, qd tenebrae adhuc munim occupant horizontem. inuestigas a jo qd hora matutina, quous data eleuati, et quous hora hae praesi. hora recte qd hata, vna cu indice iuxta priorem qd em velue gradu solis infra horizontem 18 gr. et vide qd index qd emat, ea n. hora dabit initium crepusculi, si porro gradu vj ad horizontem retro trahas, ostendet index qd emat crepusculi in horis

Probl. 6. Ascensiones rectas et obliquas stellaz inuestigare.

Notj. ascensio astronomica e eleuati aequatoris cu aliqua parte zodiaci sicut descensio e depressio aequatoris, qd veluti regula qdam distensionum. Vjz duis pinguat in ingredia inagite dierum et noctiu. cuius est caa. j. hora obliqua seu obliqua ascensio partium zodiaci. Et parallelorq. solis inaequalis intersectio cu horizontem. ca. duplex ascensio, recta et obliqua. recte ascendere dicitur arcus ille, q longiore ad ascendendum eget hore, v. cu quo plures gradz aequatoris ascendunt obliqua ascendit arcus ille, q minori ad ascendendum indiget hore, v. cu quo pauciores gradz aequatoris ascendunt. Inueniunt a. hae methodo ascensioes ta recta qm obliqua qd hata. Posito gradu solis sup horizontem nota qd gradu aequatoris simul oriat, et illo signato circulo huc globo, donec gradu solis tangat occasum seu horizontem occidentiu; post hae nota gradu aequatoris ab horizontem ortiuo vjz ad gradu ante in horizontem signatu, ille n. determinabit tibi in gradibz aequatoris ascensioem recta vel obliquam. s. t. t.

Probl. 7. Tabula cosmographica et quacuis alias res ex maiori in minorem vel e contra portione certo mmento deducere. s. Vide tr. 4 de geogr. pag. 87.

In are vel alia ma solidata describe duos circulos AB, CD, et EF GH. in 36 partes aquales diuisos, ac duos diametros in 4 partes distinctos, dende dantes seruatiz diametris, et limbo graduu remanente excide, et paraueris ingru. Vjz eoz hic e: delineatur tabula geographica sigat circulo AB CD in centro magga exemplaris, cumq ita firmabis cera a. su ma vt locomari negat. hoc facto interice ciruino vnu milliare in scala miliaru vjz magga, et transfer in regula centro circuli affixa mobile tu. totus quoties poteris, q tanta e. dta, vt na loca tabula attingere poss. disposito jo circulo tu ita aptabis. Volo vjz. delineare tabula duplo maiorem tabula exemplari, parata magga solo maiori aupe circuli excisa EF GH inpositoy

impostis in centro mappa faciendae diligens firma co[m]p[er]ite ut prioris o[mn]ia. Ideat ydem
 numeri ydem quadrantu[m] laterib[us]; demu[m] accepta regula ex maiore q[ui]a ac in totide[m] partes par-
 tiones diuisa centro circuli sui affiges, et regula exemplaris mappa pone sup[er] iunctonem aligni,
 statim o[mn]ib[us] abscindi tibi tu in limbo circuli tu in regula gradus certos, quos si scriberis in
 limbo circuli alterius, numeri prioris regula numeri abscipis. Idem opt[im]e dicitur ponenda v[er]bis locum
 sic in o[mn]ib[us] alijs ciuitatib[us] oppid[is] plebesq[ue] fluminu[m] etc. operaberis. p. t. t. *Finis* fr. 5

Tractatus De Horologiographia siue

Gnomonica vel scholastica . 1 .

Astronomia subordinatū licet imperfecte gnomonica seu horologiographia, q̄ ut n̄ infimū est hanc mathematicarū ita mirū in modū impitū uulgū in admiratōem rapit, de ea q̄ agendū in sentētia.

Caput 1. De Horologijs in cōi.

1^o. Gnomonice ac horologiographiā, scilicet gnomonica ē, q̄ horologiorū scholasticorū artificiosa descriptionē docet, s̄ n̄ horologia inuenta plura diei accurate in horas vtriusq̄ beneficiis distinguunt, q̄ s̄ varia habeant nomina, sicut s̄ ad 2 capita reuocant, cū n̄ varia rōe p̄ gnomones horis in diebus planis constitutis efficit, vel ab horis quas indicant, denotari p̄nti vel a circulis, q̄q̄ ag distat . 1 .

2^o. In horologiorū diuisio ab horis desumpta ē, Hora partes diei s̄, dies a. cū interdū maior s̄, interdū minor (artificiale s̄) horas maiores vel minores efficit. Dignitas q̄ hora s̄, sicut et dies ē duplex naturalis et artificialis, agtes et inagtes. Hora equalis ē 24 pars diei naturalis, q̄ incipiunt apud dyas nationes diuisimode. Babylonij diem auguriant ab ortu solis, indeq̄ horas nūctare incipiunt, ut testat Plin. l. 2. Horologij a. his horis descriptū d̄r̄ babilonicū. Athenienses olim, ut et nunc Itali et Bohemi, et Nūrenbergenses diem ordiunt a solis occasu, atq̄ inde horarū p̄cipia sumunt. Astronomi tandem, et tota p̄e Germania diem p̄cipi p̄suerunt a meridie vel media nocte. Hinc p̄cipia emergunt horologia solarū equaliū, velut Babilonica, seu Atheniensia, seu Italica, seu tandem astronomica. Hora inagtes ē pars 12 diei v. noctis artificialis, diuisio horis vtebantur olim Iudei, Arabes, et oēs fere Antiq̄, vnde horologij diuisio horis indicans antiquū d̄r̄, siue planetariū; dies a. inagtes, q̄ quotidie accrescant, vel extra in p̄stera obliqua nec vnt̄ se conueniunt cū agtes, nisi his in anno, sole p̄stato in punctis agnoctiorū.

3^o. Altera horologiorū diuisio a circulis petita ē, ita vt aliud sit horizontale, aliud verticale, idq̄ vel boreale, vel australe, aliud meridiana, q̄ m. duplex ē, orientale et occidentale, aliud polare, aliud agnoctiale superius et inferius. Horizontale ē, q̄ horizonti parallelū ē, atq̄ unicum s̄ dari p̄t. Verticale ē, q̄ vertici siue zenith ag distat, qualia s̄ oia muralia, q̄si respiciat austrū, vocat̄ australe, si boream, boreale, si orientem, orientale, si occidentem, occidentale. si ab his punctis deuet, d̄r̄ declinans. Polare ē, q̄ circulis polaribz, et agnoctiale q̄ equatori ag distat, vtrūq̄ vel ē superius, v. inferius. 1 .

Cap. 2.

Caput 2 De fundamentis Horologiorum .p.p.p.

Prop. 1. fundam. 1. in quouis horologio vertex styli idem cenferi debet punctu cu centro mundi. Ratio e qd tota terra cu spara solis comparata instar puncti sebt, unde distia uertius styli a centro terra n e notabilis .p.

Prop. 2. fundam. 2. linea meridionale inuenire. quonia oia horologia mobilia, postqum ystru-
cta st, ad meridionale linea collocari debnt, ut recte horas indicent, illa sic regies:

1o Describat in aliquo plano ad horizontu parallelo aliquot circuli concentrici. 2o in eoy centro coi figat styli cuiuscuq magnitudinis ad planu perpendicularis. 3o accedat scilicet ante meridiem, expectetq, usq, du umbra a stylo pecta extremitas exacte incidat in aliquo circulo, idq punctu notet. 4o accedat rursum aq, tunc inuallo post meridiem et expectet, donec in eundem circulu uertex umbre styli inuiderit exacte et notet illud punctu. 5o utiq, int, hae duo puncta intereoty bifaria diuidat, et p puncta diuisionis ac centru circuloꝝ recta linea ducta meridiana erit, s, cu hie mod, oporiet sit, faciliq, p compassu sic inuenies, na si compassu ita colloc, ut aq, nau-
tica inuadat in linea meridiana infra depictam, duos a latere compagi strati linea in plano, q, parallela erit linea meridiana, et p sequis meridianu representabit. .p.p.p.p.p.



Caput 3. De inueniendis semi-
diametris horologioꝝ vbius terray
delincandorum .p.

Ducant strans in 90 grady diuisy ABC. ducant ex A centro linea p singulos grady, nos hie p 10 grady duximq. his factis ex loco vbi linea ex centro ducta in uniuersaria se interfecant, deorsu ducant linea perpendicularanes ad basi strantis; representabit qd zangula hae q, puenit ex ductu hary lineary diametros medias horizontales et verticales vbius locoꝝ; sic zangula AVO representabit. 3gonu eleuis poli 80gr: A N P 70 etc verticales dem erunt oes ea q, basi perpendicularary inq, stant. horizontales, q, verticalibz substant ut vides in sequenti pag. 105. Nota, qd oia loca, q, estly remotu a medio strantis vel 45 gra-
duq, habeant horologia eadem, et eade diametros, ppario tu modo, na is q, ultra mediu stran-
tis versus aequatorem, eleuam poli hnt horizontu horologiu et diameter eade st cu horologio ver-
ticali et diametro. q, q, cu mediu strantis versus borea tm hnt eleuam poli, qnta illi strans
mediu

Modus construendi Horologia tum verticalia, sive Horizontalia

Per tabulas arcuum verticalium et Horizontalium . f.


Horologia itaq; constructura ad elevationem 49 gr. adminiculo huius tabula sic pedes: in ducto integro circulo in Quadrantes suos prius diligenter lineis in centro se ad rectos interfecantibus diuisio patefient 3 hora iam inuenta, sc. hora 12 p̄ diametru AC representata, et dua 6ta matutina sc. et vespertina, p̄ semidiametru NO representata. reliquaru horaru proportionalia interualla subsidio tabulae sic regies: ingre in superiori tabula parte in spatio Horizontalium arcuum latitudinis regionis seu elevationem poli, iuxta qm̄ horologiu horizontale placet delineare, hac inuenta vide in eodem lineae descendenti interuentio, quoniam hora ii est j ab 12 iam ante inuenta 2du arcu horizontale distent, et inuenta vq. ii gr. et 30 minuta. Diligenter interim attendendo areae sine angula coem elevationis poli data, et horary in initio tabulae positay: gradus horae inuentos ab hora 12 nuera in Quadrante circuli in 90 gradus diuiso, et ad sine horu graduum applica lineale centro diuncto, ac iuxta situ eig trabe linea in plano ad circumferentiam vq; circuli, q; representabit interuallu hora p̄a; qd interuallu si circino inceptu transferas in ante meridiana Quadrantem, dabit tibi tracta linea ex centro ad peripheriam circuli hora ii. sic et in alijs interuallis quendis pedes. styli eig eriges eo quo dictu e modo prob. primo sic . f. sic et in verticalibus Horologijs ages. f. f. f.

Hora	45	49	47	48	49	50	51	52	53	54	55
hora post Meridiana	G. M.	G. M.	G. M.	G. M.	G. M.	G. M.	G. M.	G. M.	G. M.	G. M.	G. M.
12	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ii j	10 50	11 0	11 8	11 20	11 30	11 40	11 50	11 58	12 6	12 13	12 22
io 2	22 10	22 30	22 50	23 15	23 15	23 15	24 11	24 27	24 45	25 0	25 18
9 3	35 0	35 30	36 0	36 32	37 0	37 25	37 50	38 15	38 40	38 55	39 20
8 4	50 40	51 10	51 40	51 10	52 35	53 0	53 30	53 48	54 10	54 25	54 50
7 5	69 10	69 30	70 0	70 15	70 30	70 50	71 10	71 20	71 30	71 45	71 55
6 6	90 0	90 0	90 0	90 0	90 0	90 0	90 0	90 0	90 0	90 0	90 0

Tabula Pro Horologijs Horizontalibus. f. f. f. f.

Tabula pro verticalibus seu muralibus Horologiis .f. n. n.

hora	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
12	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
11	10 43 10 32 10 22 10 10 9 57 9 45 9 35 9 25 9 10 8 58 8 45										
10	22 12 21 51 21 39 21 26 20 45 20 25 19 53 19 35 19 10 18 50 18 25										
9	35 7 34 50 34 20 33 45 33 20 32 45 32 12 31 40 31 5 30 30 29 50										
8	45 46 50 16 49 45 49 15 48 40 48 5 47 30 46 50 46 12 45 35 44 55										
7	5 69 10 63 54 68 35 68 10 67 50 67 20 66 63 66 30 66 0 63 30 64 58										
6	90 0 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0										



Horologia verticalia et horizontalia p tabulas sinu tangentiu describere. Constructio p sing tangentibus horologii v.g. horizontalis, id expeditissima facies dato stylo sinu toto 10 partiu. Duamq; itaq; in plano horologii 2 linea ad rectos se intersecantes AB et CD. sup hae linea transferes ex V qdem qd e locu styli versq; p q referet altitudine styli; ex V vero versq; p tangentem elevat. poli in punctu G. qd referet centru horologii tangentem agnoscitatis elevati ab V versq; B in S. ad S linea ducta vtrinq; ppendicula; dabit agnoscitatis linea; ad G vero p centru horologii ad meridianam ducta ppendicula; dabit linea hora 6a. Tangentes a. hae horis ex sequenti tabula. quonia v. v. p tan- gentibus abeundis segmentu quolibet graduu, opp e, varias rectas in denas particulas par- tiri. fiet a. hae divisio facile si scorsim pstructu sit zangulu aequalaru AB C. cuius basi BC diuisa sit accurata in 10 partes aeqles, ad quas ex vertice f recta linea sint di- missa, fiet n. hae divisioes nunc minutiores, nunc ampliores, pot magis ad centru f auergerint, v. remota fuerint; sed vide de hoc in geometria pbb 7. pps. j. pag. 50.

Nota p hae pag. ptrans uniu. ex quo partes horologii horizontalis a verticalis du tabulas accipit, dnt ee aequalis uniu. horario, in quo horas inferibit.

fit go

fit go V C horologium horizontale construendum ad elevationem poli 49 gr. posito finu toto stylo 10 partium, qm et transferes ex V in E grae in tabula tangente elevationis poli, ac eiq tangentem ii partium et 50 min: accipe in regula iuxta divisionem zanguli diuisa, hunc tangentem ex V transferes versus A V C in F centrum horologij: iteru accipe ex eade tabula tangente agnoscialis elevationis, q semp complementu e elevationis poli, tangens a. agnoscialis 41 partium erit 8 et 69 min: hunc transfer ex puncto V versus B in punctu S. p hoc punctu perpendicularis secans ducta dabit agnosciale T M. posito go hoc fundito totiq horologij ceteras horas sic inferibes. accipe distiam S E, illamq tradue sup regula v: lineale totus quatuor poteris, qam partem diuides V C. E S ut ante in 10 aqles partes subsidio zanguli aqilateri, instruo diuisorio, hoc facto vide q tangens hora ja et ii in tabula elevationis tua fit, hunc tangentem una cu minutis interceptu ex posito lineali in partibq E S ex puncto agnoscialis se horologij transfer utring, et hris hora j. et ii. iteru q hora 2 et 10 accipe ex tabula tangentem 5 et 77 min. hunc ex regula interceptu transfer ex S utring sup linea agnosciale, et hris puncta hora 2 et 10, et sic de reliq donec oia designaueris, na p illa puncta ex centro F ducta linea dabunt horas a meridie et media nocte; styly porro sup zanguli elevationis data hypotenusa euenit, ut supra. f.

Horae Tabula elevationis poli grad: 49 Tangentes horaru meridie et media nocte.

Astronomica	12	ii	10	9	8	7	6
grady distantes a meridie	0	15	30	45	60	70	90
Tangentes	0	2. 68	5. 77	10. 10	17. 32	31. 32	32. 0

pro horologij diuisio- nis. f.

Tabula tangentiu elevationis poli et agnoscialis Dato stylo 10 partium. f.


elevatio poli	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
partes. min	P. M.	P. M.	P. M.	P. M.	P. M.	P. M.	P. M.	P. M.	P. M.	
jo.	0	30. 36	30. 72	ii. 11	ii. 50	ii. 92	12. 35	12. 80	13. 27	13. 76

Nota, qd pars distinguat extra gradu, 90 grady diuidit in 60 minuta; pars vero in 100 minuta.

45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
Partes. M.	P. M.	P. M.	P. M.	P. M.	P. M.	P. M.	P. M.	P. M.	P. M.	
jo.	0	9. 66	9. 33	9. 0	8. 59	8. 39	8. 27	7. 81	7. 57	7. 27

Elevationis aequatoris, seu complementu elevationis Poli. f. f. f. f.

Horol:



Nota
 stylus debet
 esse 12 partibus ex
 Regula & superari, ex
 qua horologium est compositum
 aut illius distans 5 est in 6 et 3
 orientalis a. in 6 et 9 orien-
 talis, cui spatium sunt 12 partes sunt.

Probl. 2

Nota. ut horolo: occi-
 dentale non inferat,
 sed magis occidentale regere.

Basia 7 anguli leuoris equatorialis 40. grad: et poli 50.

A


B

Com...
 An...
 elev...
 velle...
 per...
 lica...
 regula...
 de...
 et in...
 qu...
 12 part...
 Prob...
 Sing...
 per...
 al...
 ipso...
 p...
 de...
 24...
 d...
 v...
 v...
 g...
 de...
 d...
 v...
 v...
 v...

Prob. 5. Instrum. describere q horologii.

1^o ppara semicirculu ABC qm in duos Arantes accurate diuides, vt hic in figura apparet,
2^o ppara zangulu quqz solidu ad eleuonem poli regionis data extractu cuiqz pedunculo I ita
infigeh semicirculo ABC in centro D. vt in confine ulla laxitate circuectus possit, cen-
tralis, et limbu semicirculi ABC lenih radere: in M habeat inferiq trochlea, vt excusa aliqua
parte circuli, Vg. V I in ea cauitate moueri possit, q arbitrio vltentis, et h'is instrum.

Obtato itaq muro in quo horologiu delineandi e, applice partem semicirculi ABC ad muru,
positaq compasso ad latq zanguli qd moueri vna cu compasso stiquo det, eo vtz, donec videas com-
passu vna cu zangulo linea meridiana tenere, hoc n. situ zangulu in limbo semicirculi gradq
declinantiq muri monstrabit: firmiq qz zangulo eo situ fixente, trochlea ad semicirculu
constricta, ne tantilla qdem a situ suo moueas, eo a. sic firmato, accipe stylu ferreu pparatu, et
applice supuicem zanguli polari, ita vt exacte illa supuicem radat, quo facto muro aut
implumbabiq, aut clauo firmiter affiges, pot fieri poterit, et h'is fundam horologii inseribendi.
horas v. sic inseribes, ppara aliu semicirculu ligneu, qm n. seq. ac supiorem in suos Arantes
diuidere h'is, et vt sage dictu e, h'is 3 horas iam inuentas, duas sextas se. et 12, hic n. semi-
circulu zineabit 12 horas, qm ad angulos rectos affiges basi zanguli eleuon. poli pparati, ita
vt linea hora 12 exacte respondeat linea media basi, hoc ita pparatu instrum alligabiq stylo
firmiq, ductaq priq ex centro styli ppendiculu aliqd linea recta, q representabit linea hora
12 in muro. ad hora 12 ia in pariete signata dirige filu stylo alligatu, vt q modu ratiou, sup
orbe horariu motu radiu solis representet, posito itaq stylo et filo sup hora 12 in muro des-
cripta, q moue filu orbem horariu stylo alligatu, donec filo extenso respondeat, situato sic
orbe et bene firmato pone filu sup hora ja in orbe descripta, eoz vltariq extenso ad muru
diligent. obserua, qd punctu filu attingat in ipso muro, si n. q hoc ex centro styli linea duas
h'is linea hora ja, deinde dirige filu sup hora 2. in orbe et sic vt priq ages, donec ois horas muro
inserigeris; filu a. si alicubi extensu muru n. attingat signu e illa hora poni in muro n. pot
eo qd impossibile sit, radiu solarem accedere.



Not si in opere fiat circulus ABC p ab altera parte semicirculi horariq
delineari.


Caput 2. de signis iz zodiaci ac reliq. sphaera horologii inscribendis.

Probl. 3. Radios zodiaci in instante describere.

Descripto in aliquo opere semicirculo ABC in suis arcibus diuiso, atq. ex B nuera mxam solis declinonem in arcu BC v.g. 23 gr. et 30 min. et in fine sui punctu V. Sic spatium BV transferes ex B in arcum AB in punctu C q. duo puncta CV coniungas recta linea. Hoc facto ex centro I describe circulu ad intervalla CI et BV qm diuide in iz aequales partes, vel si media signa dyes in 24. his factis coniunge duas quas libet horos anguliter ab V uel C remotas recta et occulta linea ad angulos rectos CV lineam interfecantes. p punctu vero interfectionis linea CV si ex centro semicirculi ABC lineas duxeris, his descriptos radios solares, sicut in figura apparet. Aliter sic facies p tabulas declinon. solis

*
ad aquator
in 90 grady diuiso
minori ex
tabula
ca in
drante
B A . item ex tabula
declinon. solis
accipe II et D
declinon. ab equatore
hos nuera ex
B verq. C et ex B verq. A
et p puncta terminois
ex centro I pducta
linea dabunt tibi
lines II et D in
drante BC et lineam
m et Z in drante
BA. Non fac p
des de alijs signorū
declinon. ex tabula
erundis, donec oēs
radios inscripseris.
Notar. Si media
lineam IB ptracta
semp representare
agnotialem . p . r .

Descripto p̄dicto circulo ABC diuiso in suis arcibus BC et BA nuera in arcu BC in 90 grady diuiso AB verq. C mxam solis declinonem. Sic declinonem 69 vel 70 in arcu BA . item ex tabula declinon. solis, accipe II et D declinon. ab equatore, hos nuera ex B verq. C et ex B verq. A, et p puncta terminois ex centro I pducta linea dabunt tibi lines II et D in arcu BC et lineam m et Z in arcu BA. Non fac pdes de alijs signorū declinon. ex tabula erundis, donec oēs radios inscripseris. Notar. Si media lineam IB ptracta semp representare agnotialem . p . r .




Notandu, Non ce hic adeo accurate lineas descriptas, nec opq ce sic n inscribi hoc instante signa possunt nos n hic sicut et penultimū intendent, qd se facit adu sit.

Probl. 3

Fundamentum
omnium Florolegiorum.


117.



Horol. Horizontale.
Horol. Horizontale.

D R VE

Vide pag. 117



Modus describendi circulos signorum in horologio aequinoctiali.


1^o fac circuli externi seu extremi in tropicis signis exacto q̄ duas diametros AB et CD in suis extremitatibus. ex q̄bus BB forante in 90 grady dividitur.

2^o vide in tabula declinationis solis pag. 98 maximam declinationem q̄ e 23 grad. et 30 min. hoc grad. ex D versus B intercepte circulo in E. et ducta recta AE usq̄ ad grady 23 in circulo interceptos. his factis vide ubi linea meridiana transeverit: in eo enim puncto ex centro I describatur circulus aequinoctialis vocatus.

3^o ut scias declinationem minimam q̄ e 11 gr. 30 min. media 20 grad. 30 min. fac eoque puncto circulum I. et ex B versus I intercepte 20 grad. et 30 min. in R. et ex I ducta linea IR. et iterum intercepte 20 grad. et 30 min. et ducta alia linea IV. hoc n. facto solis grady 20 et 23 cum suis minutis in aequinoctiali circulo

in minori sit proportio. 4. trabe linea ex O circulo aequinoctiali in P ubi se linea IE intersectat aquare et iterum ex O in S. et ex O in N. donec vide ubi haec linea intersectent linea meridiana DC. est h. n. punctis intersectionis q̄ describentur circuli, sicut ex O P linea tropica canceri, ex O S circuli II. et declinante ab aequatore 20 gr. 30 min. ex O N. circuli 8 et III declinante ab aequinoctiali 11 gr. et 30 min. his factis sicut circulos signorum Tropicorum, et australium habeas, capite distans eandem circuli geminorum et 8 et transfer versus tropicum capricorni pedem circuli ponendo super circulum aequinoctiale, et sicut intendit stylum porro sit semidiameter circuli aequinoctialis.

Horologii Equinoctiale in cruce describere.



Stylus sit semidiameter circuli et in centro perpendiculariter erigatur. circuli autem etiam si occulty, ne minus tam facile appareat.

Probl. 3. Arcus signorum æquinoctiali inscribere.

1^o Describte in charta aliqua circulu in 24 partes æqtes diuisu, et delige styli q magnitudine horo-
logij, cuius quilibet transfer ex centro horologij seu circuli sup lineam hora 6. vel 12.

2^o ex vertice styli apud circulo fac arcu extra circulu initio factu ab hora 12. vel facta.

3^o In arcu descripto a politis horis incipies nuotare declinões signorum, et q fines nuotacum q apiz-
con styli lineas trahere diligens obseruando vbi secent vel tangant linea hora 6, q hæc n in-
tersectionis puncta, si ex centro circulos duxeris, his circulos signorum in æquinoctiali horologio
descriptos. 6 qdem ðentrionaliu in superiori circuli superficie. 6 v. australiu in inferiori parte.
cuius rão hæc e, qz cu æquator, mediũ colli occupet diuidens ðentrionale ab australi hemi-
spherio, fiet, vt sole transeunte 6 signa ðentrionalia ab ariete vsq ad ♎ in superiori parte
horas monstrant: australia v. transeunte a libra vsq ad ♊ in inferiori parte horas mon-
strat. styli perpendicularit in centro insigat iuxta magnitudinẽ datã. f.

Horologium æquinoctiale cū circulis signorũ Zodiaci.



Nota si circuli q
facti 2du modũ pag. 119
seruati. f.

Vide aduante horariũ pag. 125
Metriam poteris inuenire circulos
signorũ in æquinoctiali horologio
duisũ in 24 partes, et ab æquinoctiali
ducendo lineas ad duos circuli puncta, ita
vt linea ista fiat parallela æquinoctiali. vid. pag. 107.

Probl. 4.

Probl. 4. Horologium Italicum seu Babylonicum delineare, vel qd idem
 ē, horas ab ortu et occasu in Horizonte describere.

Jo. Constat horologium astronomicum, vel Solarium a meridie cum tropicis et aequatore iuxta
 pbl. 3 et pbl. 7. cap. 2. horologio nō hōras integras, sed et medias addere lineis occultis de-
 scriptas. his factis curio inferibere hora ja Italica ab ortu q̄ ē 23, vide in priori tabula, cui
 hora astronomica p̄dicta 23 Italica sit parallela, iterū ex altera tabula vide q̄ hora astrono-
 mica intersectat ab Italia hora 23, et inuenies in ja tabula, horam datā se. 23 ē parallelam
 ad $ii\frac{1}{2}$. in altera v. tabula inuenies ap̄dicta hora intersectari hora 5 astronomica, quare posito
 vno pede circini ad hora ii et media, eo in loco, ubi ea hora fecit agnoctiale lineā, et alterū
 pedem sup̄ agnoctiale extendē usq̄ ad intersectionem hora 5 astronomica, hanc intersec-
 tionē transfer ad lineā hora 6a, lineā n. recta tracta q̄ hae 2 puncta a tropico ad tropicū
 dabit hora 23. 22 sic dices. vide ex priori tabula, cui hora astronomica sit parallela, et ex
 altera tabula, qm̄ hora astronomica intersectat; in priori inuenies ii aq̄ distare, et ex altera
 tabula inuenies intersectari hora 4 astronomica, pones igit̄ ad ii hora astronomica in aequa-
 tore circini pede, et alterū ad punctū in eadem lineā, ubi hora 4 intersectat, q̄ hoc pun-
 ctū intersectionis si lineā duxeris aq̄ distantem hora ii, hōis 22 hora. eadem rōe ut habeas
 21, dices q̄ 3 astronomica aq̄ distantem 30 et media. sic 20 hora, 2da astronomica in puncto
 agnoctialis lineā aq̄ distantē pones 10 astronomica, ut habeas p̄dicta 20. Sed hae oīa clarig
 patebunt in exemplo et dīmōstratōe tabularū. Vide.

Babylonicū vero horolog. siue ab occasu nō differat ab Italia, si si tñ vna inuertentis, hōis alterutrum.


Probl. 5. Horologium agnoctiale in formā crucis delineare.

fac cruce polita de ligno 3 a. 4 digitorū latā, in hac cruce describitur horologium sic ages.

Ex BAD. ECV punctis, ang. siue aduantes ad intervallū B.N. A.T. 49. VC. CN de-
 scribe, quos aduantes si diuiseris in 6 aq̄tes partes, et ad planas brachiorū sufficiens duxeris
 lineas; ostendent tibi puncta incidentia lineas horarias, ad brachia perpendicularē et parallelas,
 melig a. facies, si p̄ng horas delineaueris in cruce aliqua in charta ad magnitudinē crucis
 parata descripta, q̄a sic melig poteris oīa spatia horaria ex cruce paginata ad lineā cruce
 transferre, aut etiā agglutinare; hora porro in lineis suis ita inferibent, ut sic delineatu
 uides. Erit n. A.F. et B.R. lineā meridiana, P. C. uero et E.V. lineā hora 6a. Sane
 cruce si parata, vngabit. hac rōe. luente solē sup̄ zangulū eleuōis agnoctialis rethificatum

pones

pones cruce' ita ut AB, sine hora 12. Ideo sufficiat agnoscere, et mox extremitates
 crucis, qd' est loco angularu' in planis sufficere brachioru', horas monstrabit; a latere
 qdem NC p' extremitate B hora hora antemeridiana; a latere DT p' extremitatem A
 hora pomeridiana. a latere EI p' extremitatem E et a latere FT p' extremitatem
 hora p' antemeridiana. a latere OR et BN p' extremitates VC hora pomeridiana.



NB. collocabitur sup' linea
 agnoscere lineam in angulo
 elevat' agnoscere.

Prob. 6

Probl. 6. Horologiu cylindro inseri bere.


jo Cura Cylindri a Tornatore ita parari, ut eius longitudo ad crassitiam habeat rationem
 3pla. 2^a circa centra fac excavat. figis, ut ei capitellu adglari possit, ita struatur, ut
 clauu in medio teneat in foramen imittendu, hinc n. clauo styli inserendu erit. 3^o accipe
 3pla diametri ipsius cylindri, ex eoz strue adratu $\triangle BCR$ 4^o huius figure lati su-
 perioris et inferioris diuide in 7 aequales partes distinguendas a se invicem perpendicularibus demissis $EF, GH,$
 $IK, LM, NO, PQ,$ ut fiant 7 parallelograma aequa, linea $v. Pk$ gradus ascribendi, sicut et
 linea g, B cu signis Zodiaci, ita ut ru ab A versus C , capricornu, adu \equiv et $E. 3^o$ X et
 mt 4^o (et sic de ceteris) duent. 5^o singula diuide spatia linea AP in 6 singula paralle-
 logramma interiecta diuide in 6 partes aequales, ut g singulis signis 5 gradus habeas. 6^o g de
 variaru linearu inscriptione sic agas. fac adratem STR eius arcu. ST diuide in 90 grad.
 initio facto a T versus $S. T.$ in linea RT elige quodcumq. punctu, $v. V$ ex eoz due linea
 perpendicularem ad RT q sit VX . 8^o ex tabula altitudinis solis pro altitudine solis super horizonte
 g singulis signis ipsius inuentis applica regula ad centru adratem, et ad gradu cuius eleuatis, cuius
 loci et signi, et ubi haec regula linea perpendiculari VX secuerit, ibi fac punctu, idq. postmodu
 transfer in lineas signoru parallelas figura $ABC R$. 9^o puncta oia sic inuenta punctis cur-
 uis inerte. 10^o arcibus horarijs sic inuentis horas ascribe una cu altitudinibz in spatio PC .
 $g, D.$ ii figura hanc hanc ratione in charta plana delineata trunco sive cylindro ita circumpo-
 nita et agglutina, ut linea g, B extrema cylindri linea superiori, ubi capitellu cylindro
 applicat, iungatur. 12^o capitello infige styli horariu, g cu eius clauo cylindri foramen circa
 centru ingredi et clauo curuaduci, ac ad rectos cu ipso cylindro angulos rectos possit, vnaq. cu
 capitello libere ad quoslibet signoru gradus moueri; porro styli huius extra cylindru pmo-
 nentis tanta esse debet magnitudo, quanta e diameter cylindri seu distia in $Rect T. p.$
 Nota, fauhs puncta ex adrate STR intercipies si sibi aliqd in centru R insequeris, et
 sic sibi g puncta horaru in adrate monstrata adu tabula altitudinis solis (qua vide pag. 116) vsq. ad
 linea VX proceperis. s. 1

Probl. 7. Annulu schifericu describere.

accipe lamina arcu, aut ex st. aliqua maã solida cuius magnitudinis, g sit $v. g.$ hie $ABC D$.
 Sane lamina diuide g mediu linea EF , ita ut fiat duo parallelograma, $ABEF$ et $EFCD$.

Soru

Horologium p̄ elevationē poli 50 graduum.



transfer puncta
ex linea VX in li-
nea G. et
postea eadem rati-
one p̄ hanc inferi-
bendis in lineas ab
omnī signorū.

Sorum unū latq̄ ut EC scorsim posita diuides in 90 partes aegles seu gradq̄ sitq̄ linea GH.
Huius factis parallelas signorū sic inseribes: ex punctis D et B describes ad interualla CD,
et BA arcū A I et SC, seu p̄fectos 4 brantes, quorū quemq̄ diuides in 3 aequalis partes, sitq̄
diuisiones A. M. N. J. et C. O. P. S. puncta uero diuisionū M. O. N. P. A. C. S. si rectis lineis
coniuergant, habebis descriptos parallelas signorū. P̄bit in linea I S signis arietis et ♈,
N. P. 4 signis ♄ in spatio f. E. V. K. in spatio uero X. I. E. F. signis X et m. l. linea uero
M. O. statim stinet 4 signa, prior q̄dem d̄ et ♄, posterius uero ♃ et ♅. ultima
demū X. V. P̄bit duobz signis solstitialibz ♄ et ♀. Designationē igit̄ horarū in lamella
si p̄parata auige ex linea GH scorsim posita motam solis in G. ex latitudinē
meridianā ex tabulis alt. solis pag 116. hanc transferes ex E puncto uersq̄ V et X
utrimq̄, atq̄ ex his punctis ducēs parallelas ad C. D. et A. B. in K et I respectatibz pun-
ctū hora 12 sole statuto in G. reliquas horas sic inseribes. Ita hora 12 punctū 11 a
et 12 si inuenies. auige altitudinem solis ex tabula p̄tem hora 12 et 11 a, sole G. p̄uen-
rente, hanc intercaptam in linea GH seruncta transferes ex V puncto uersq̄ E.

Dabitq̄

Horologium in fronte circuli & elevat. poli 50gr. A

Modus faciendi horologium in fronte.

1^o Fac Arantem BAC cuius BC latq. divide in 90 gradus


2^o fac circulu occultu in linea AC qm magnu vis, eog diuiso in 12 partes duc lineas occultas ad rectos linea AC interfecantes, ad duo puncta circuli occulti. r

3^o in punctis intersectionu linea AC si ex centro A circulos duceres, sibi circulos signoru Zodiaci, quoru mediq, vbi centru circuli occulti e, equator erit.

4 accipe ex tabula altitudinu solis, altitudinem solis p singulas dies horas sole transeunte 69. y et equatore, et filo ex centro A, suspensa in inferiori limbo BC gradus nota, et vbi filo intersecuerit circulu 69 et y, ac equatorem, fac puncta, si n. p illa tria puncta circuloru arcus feceris, monstrabunt tibi singulas horas. r. Porro ut videas quota hora sit, lucente sole i impone filo ex A. centro frontis suspensa gemmula parua aut granu mobile p filu et applica in scala signoru AC signo Zodiaci, in quo tunc sol erit, et erige frontem uer. solum, ita ut p strung dioptroru foramen solradium vnu efficiat. quo facto videbis, in qm circulu verticale horaru gemma sine nodq filu cadat. et ita sibi horam qritam. r. r.

Finis tractatus Horologiorum.

Laus Deo Virginisq. Matri Mariae. r.



Appendix tractatq horologioru.

Problema ja Modq construendi lineale q horis facile in muro aut charta in quouis fere horologio inferibendis: t.

1^o Fac Arcum ABC exacte in 90 partes divisu, et ad 5 quosq gradq. duc a p^oberia CB versq. centra Arcantis A diametrales lineas, ut hic factu vides, ita et a linea fundtli CA n^ocrari incipis vsq ad 90. in linea BA. hoc facto duces ex basi CA linea DE q Arcantem in infinitu n^o p^o centra A. si horas minores d^ones, vel remote ab A. si maiores cupias horaru distas. t.

2^o ubiung linea DE interfecerit lineas diametrales graduu, duces (ponendo pedem circini in A centro) et alteru ad quouis interfectionem extendendo) arcq circuloaru vsq ad linea AB. et notabis gradibz in 2^o hui loco, jo ad ipsa linea DE incipiendo n^ocrare ab D. versq E. * 2^o in fine arcuu incipiendo ab AB versq A. C linea fundtlem Arcantis.

* et itra ab E. versq D. descendendo iterum.

3^o duc lineas RS. TQ. OP. MN parallelas linea AB et in linea RS ubi arcq circuloaru desinunt itera fribe n^ocras graduu incipiendo ab S versq R. s^o h^o et in linea TQ, incipiendo n^ocrare a Q versq T linea n. SR ga. ab A centro Arcantis incipit n^ocrare, erit q horologij vertic^o q^oz, altera vero TQ, ga sup^o incipit erit q hori zontaliq. q^osi linea diametrales ex A centro ducta non contingant linea DE intra Arcantem ABC. duces illas ultra Arcantem donec ea p^ongant, ut hic vides in linea diametrali gradq 80, et si nobis arcq ducere ab interfectionibz vsq ad linea AB. appha lineale aliquod ad gradu 80 extra Arcantem in linea DE notata, ac ex opposito in lineis TQ. OP duc lineolas, q sic vides factu q gradu 80 et 10. 75 et 15. in linea AB et TQ. t


4^o Horas lineali sic inferibes. jo in fundtli linea CA ponis hora 12. et ex opposito gradq 15 in linea DE. notati hora ja et 11. 3^o ex opposito gradq 30 in linea DE interfecti hora 2 et 10. et sic demceps semp 15 gradq ulteriq sumendo et tot n. faciunt vna hora. porro Arcantes horaru sic inferibes. pro jo Arcante post 12 accipe ex p^oberia CB Arcantis ABC tres gradq et 45 minuta; ab illo grada 3 et 45 minuto duc linea diametrale q^o occultu versq A centra Arcantis vsq ad linea DE. ubi fit interfectio, intercipe spatuu illud a linea fundtli distans, et transfer circino in linea horariam OP. et h^oz ja Arcantem. q 2^o Arcante accipis duplo plures gradq et minuta, q^oq jo Arcante. s. 6 gradq et 30 minuta, sed ga (ut alias dictu e) 60 min. faciunt vnu graduu, deo talles 60 de 30 et addes adhuc vnu graduu 6 gradibz, ut fiant T cu 30 min. q ex 30 remanserant. itera jo ex h^oz Arcantis ABC T gradu et 30 minuto duc linea diametralem occultu vsq ad linea intersecante DE. ex opposito n. istiq interfectionis si in linea horaria


* et contra ab E. versus D. descendendo iterum.

ria

ad pag. 126.

In θ centro puncti θ hinc θ hinc, unius magnitudinis hinc usq. scribere potes, ut
distinguas ut, modo in illis hinc, ut des quosvis figuras facere licet.





na 07
ty inf
ho fr
75 ex
ppl ge
3 22 -

via 09 lineata duxeris, h'is 2du' quadrantem post 12. n' seq in ceteris quadrantib' hora-
 r'is inferibendis ages, semp ad prioris quadrantis grad' addendo tres cu' 45' minutis. sic p' ter-
 tio quadrante accipies ii grad' et 15' minuta. C' t'ria n' ad 1' faciunt 30, et 45' ad 30' faciunt
 15' ex q'ib' si 60' auferendo gradib' addas, fient ii et restabunt 15' minuta. p' 4o quadrante
 post ja' si 3 gr' cu' 45' m' addas 15' gradib' (q' hora' una' substituit.) h'is 18 grad' cu' 45' min:
 p' 2o quadrante post prima' hora' 22 grad' et 30 m: p' tertio 26 grad' et 15' min: etc.

Problema 2du' praxis huius linealis. p.

.128.

.129.

.130.

.131.

Naturalis

♭ C D E F G A B C D re. la

♯ C D E F G A B C D re. la

♭ C D E F G A B C D re. la

Discantus.

Vaalis

♯ C D E F G A B C D re. la

♭ C D E F G A B C D re. la

transpositus

♯ C D E F G A B C D re. la

♭ C D E F G A B C D re. la

transpositus

♯ C D E F G A B C D re. la

♭ C D E F G A B C D re. la

gad. in b. molli naali et transposito. Dea in duro naali et transposito. 7a litera notat in ascendendo ea mutandu. secunda in descendendo, 3a strög modo. 4.

Caput 1. De Definitione et Divisione musicae

Musica ut initio dictū ē duplex ē, theoria et practica, theoria circa verū musicarū, huiusmodi versatū, q̄ a Boetio definit facultas, dūas acutorū et grauium sonorū sensu, et vocē p̄cedens, ea ite-
rū zplex ē; mundana q̄ de harmonia totius et partū mundi p̄cedat; humana q̄ de proportioibz
corporis et aia, atq̄ harū int̄ se partū tractat, 3^a, q̄ in ḡda dī p̄stere instrumentis. practica
in exercitiō cantū p̄stet. Partū cantū zplex ē, alij simplex et vniformis, et de hoc tractat mu-
sica plana, qm̄ Gregorianā vocant; alter varig ac multiformis, de quo musica, qm̄ alij figuratē, alij men-
suratē vocant, atq̄ de huius musica compositō, q̄ et canonica dī, seu computistica; sic breuiter agemq̄.

Caput 2. De intervalis musicis.

15 s̄ intervalia, ut nra aetate musici docent. vnisonus, tonus, semitonium min et maig, ditonus, semitonus, tritonus, diatessaron, diatessaron, semidiapente, tonus cū diapente, semitonium cū diapente, ditonus cū diapente, semiditonus cū diapente, diapason, semidiapason, quarū alia s̄ p̄fecta, alia imp̄fecta, nos re-
lictis imp̄fectis, p̄fecta definiemq̄. Vnisonus ē in musica id, q̄ in arithmetica ē monas, punctus in geometria. Semitonium min ē idā imp̄fecta seu minor p̄cedens ex mi in fa. Tonus ē idā p̄fecta de qua
p̄ctā notula in exam saliens, veluti ex ut in re, ex re in mi et. Ditonus dicitur ex mi in fa simul incens,
sua n. voces n̄ faciūt tonū, sed min, qm̄ tonū dimidiū. Semitonium tertium imp̄fecta ac mollior, ex tono et semitonio
dūa s̄ p̄fecta, ex ut in mi, et ex fa in la. Semitonium tertium p̄fecta ac mollior, ex tono et semitonio
minore; eiq̄ dūa s̄ p̄fecta, ex re in fa et ex mi in sol. Diatessaron ē quarta, q̄ oibz modulandi
genitibz apta ē, p̄stans semitonio minore et duobz tonis, ut ex re in sol, et ex mi in la. Diapente
5^a p̄fecta ex tribz tonis, ac semitonio minore, eiq̄ 4 s̄ p̄fecta, idē 4 hemitoniarū lola, re la, mi, mi, et
Semitonium cū diapente ē 6^a imp̄fecta ex tribz tonis, et duobz semitonis minoribz, ut mi fa, ex e ad c
Tonus cū diapente ē 6^a p̄fecta ex 4 tonis, ac semitonio minore, admittit hae unō d̄mitionē, v.g. ex ut in la, et
re fa p̄cedendo. Diapason cum spontiarū regina, ē 8^a p̄fecta et integra, ac 5 tonis et hemitonis mi-
noribz, p̄stans diapente et diatessaron; his ita rite illis ad computistica p̄cediamur. +

Unisonus. x	Semitonium min.	Tonus. x	Ditonus. x	Semiditonus.
Diatessaron. x	Diapente. x	Semitonium cū diapente	Tonus cū diapente	Diapason. x

cadentiaq, potissimū v. in fine tenorem toni ad servandū, reliq̄s intermedijs spatijs & arbitrio componētis miserari poterūt. Deorum tenorum cadentia, q̄t musiq̄ geniq̄ cuiq̄ suggeret. +.


§. 3. De Regulis compositiōis ac cadentijs.

1. Cadentia in basso n̄ nimis vicina sint, q̄ p̄fectum dictū sit de cadējs in fine cantq, v: quodōrū eiq, s: q̄ 5. 4. a. quā ordinariē cadant, p̄fectū si plurimū vocū, ut 8, cantio sit componenda, idq̄ in fine alternorū chororū; in spatijs v. intermedijs quodōrū, q̄ libitū poteris vel e. idā, 3. 4. 5. ascendere, vel descendere, q̄t affectū cantiois dicitabit; modo semq̄ in fine quodō, ut dictū, p̄p̄riā cadentiā servet. +
2. quo maiores cadentias Basso sūt, eo viciniōres reliquarū vocū nota p̄ponēda sūt.
3. si Basso cedat q̄ semibreves exē guta, ascendendo, vel descendendo, vel q̄ 3 a. m. quā, reliquarū vocū notulas n̄ p̄dere dōne singulis in basso collocatis semibreuibz, s: tm̄ vna q̄ 3^a p̄cedere p̄e, reliquas vero in guta comorari. +

§. 4. Regule de semitonijs. +

1. semitonū in certis tonis ac xonijs tm̄ adhiberi solet, a quorūbz musicijs. +
2. semitonū nunqm̄ apponit, nisi 3^a in ḡnē diatonico, seu singuli cantu, in ḡnē tr̄ chromatis, ac enharmonico nullū certū servat locū. +
3. semitonium n̄ ponit in ḡnē diatonico in descensu notarū, s: in ascensu. +
4. in tonis. 1^o. 2^o. 3^o. 4^o. 7^o locū h̄t, in alijs tenorū cadentijs n̄ ita crebro ponit diatonice. + in singuli cantu; in jo n. tono, tertia, se. C, requit semitonū, si segis imēdi- atē


128. *ate ascenderit, vel si descendit, pausa immediate sequitur semitonium, etiam valebit. ¶ In 2do tono, tertia D nimirum, F regit semitonium; sicut in 3o tono tertia E, nimirum G, iterum semitonium. In 4o tono tertia D, nempe C, idem regit, si, ut dixi, sequitur immediate ascendit, aut si descendens pausa cobibeatur, alias non, sed haec omnia vide in exemplo. ¶*




Nota. Et si dua voces inuigant ab eadem clavi Vg. G. si ea vitul, si in ascensu v. desc. immediate variant.

§. 5 Regula de B molli ponendo in cantu duro et b. molli. ¶

1. Nunquam ponit b. molle, nisi in 1o tono cantu duro in genere diatonico, in Bassi quodam locis, quos nota tangit linea B. fa. # mi, reliquis v. vocibus, quos Bassi peruenit G. toties reliquerit vocum, valebit in b. fa # mi, b. molle, ut vides hic:




2. In cantu vero molli in basso extra B. fa # mi, ordinariè ponit b. molle, in 2o tono in E, in reliquis vero vocibus, basso spiritato in C. b. molle semper ponit in E, ut vides in exemplo. ¶



§. 6 De Vniuersalibus Regulis. ¶

1o in cantu quocumque nunquam dua, tres, aut plures spectra sonantia, ut §. 4. 8. 5a. se immediate sequunt, imposita autem tertia, in infinito posita immediate se sequuntur.

2. in eadem linea, seu spatio, plures, siue spectra, siue imposita se immediate sequuntur, sine ulla vitio cantus, in. in unisono spectantes. ut in exemplo vides.



- 3. fa nungm ponendum e' tra mi, q' cadentia valde vitanda e' in musica. †
- 4. Clavi in aliqua, du' Basso spicit certo fore, Vg. in G. dicantq. aut alia vox p' 5^a ascendere, aut descendere poterit, aut una ascendere, altera descendere; tertia cum Basso quiescere. †

- 5. Dicantq. singulis notatq. nungm ultra f' supmū ascendere, et nungm infra C infimū descendere debet. 2^o altq nungm supra B ultra, nungm infra f' inferiq. 3^o tenor nungm ultra G. nungm infra B. 4^o Basso nungm ultra C, inferiq nulla certam legem habet. †

- 6. Caden tia sextary, septimary, nonary, stesq. n' gmitantq. nec sonat, nisi certo cu' artificio adhibeantq.

Caput 3. De Compositioe Practica Probi. j.

Dato quouis textu et basso seu fundto, reliquas voces quousq. construere.

1^o factore cantioem quous textu dato, ante oia fiat, et iuxta regulas traditas excogitab Basso in notis, iuxta tonū, q' textus idū affy mīe agruit: sit Vg. sexta in aue maris stella. finges qo Basso iuxta cadentias suri toni gorias, Vg. ido, ita ut syllaba texty rēdeant accuratē notis, et habebis fundtm, sup qd' reliq' voces struenda. †

Horn

De viris elementorū, aëris, ag et ignis oporibz, usu ac emulacione.

Axiomata pneumatica.


1. graue illud dr, qd descendit ad centrū, tanto grauius dicitur, qnto celerius descendit, lege ista qd a centro ascendit sursum, tanto celerius, qnto leuius. 2. uacuum in rerū nāa nullū dat, imo in tm ea id absorbet, vt prius totius mundi machinā dissoluē stringat, qm admitti, atq ex huius uacui repugnā oīum fere mundi mirabilū caā puenit, leuia descendunt, grauiā ascendunt, nriūm adeo ē, nūm nūdo cēsi- ne corpore. 3. duo corpora in eodem loco nāa hē ee negat, s. vno posito alterū excludi nriūm ē.
 4. aqua calefacta ob raritē suā maiorem locū qm frige facta recipit. 5. aqua nullā compressiōem et coarctatiōem patit, scilicet aër. 6. humidi nāa ē, vt sit mundo concentrica, vniūq; vero humidū parte pōnente humorem ad ppendiculū. 7. aqua n̄ leuabitur sursum, si descendit, n̄ pportionalit̄ fuerit ascensui, hoc ē, si ultra lineam aëlibrū n̄ ceciderit, qnto v. p̄ntūq; ultra lineā aëlibrū descenderit, tanto altius eleuabitur.
- Notandū. Agm 5 modis ista nāam suā eleuari pot. 1. uirtē attractiua, qd uulgo dr metu uacui, 2. uē impulsiuā aëris. 3. auxilio calorū, a. ignis agm vel aërem rarefacientis. 4. motū nāali, et seipsa, vt in colica hydratica p silices ductū. 5. p dīgas machinas dīgas agentibz imitatas. v.

Prop: 1. Probl: 1. Agm ad gnis altitē uirtē attractiua attrahere.

Instruatur agm ad gnis similitudinem iōs Vg. pedū, tria uasa magnitudie aëria, signata litteris A B C quorū unūq; supig, vel inferig epistomū habeat, tū ad infundendā agm, tū ad emittendā, si epig sit. Vas gdem B duo habeat, infra unū emittendā ag grāa factū, supra v. habeat unū, qd semp maneat apertū signatū G. Vas A infra epistomū habeat locoff. Vas C loco J. his positis ponat̄ vas A eo loco in qm agm ex plano uis eleuari 100 pedes altū, uasa v. B C ponant̄ infra. his positis para 3 sypbones, quorū unūq; 100 pedalis, quorū unū s. supiori fundo uasis C inferioris firmū implumbatū transibit ad fundū ppe, ita tū vt fundū n̄ oīo stringat, supiori v. orificio suo seu extreo supiori fundo uasis A implumbet̄ iuxta N. idē tubū T supioribz fundis A et B firmū quoz implumbatū iuxta X. y. tubū V. ultimū inferiori fundo uasis B firmū quoz implumbatū deorsū ad ppendiculū uergat, et sit instructū epistomū F tū ad colubendā, tū ad emittendā agm aptatū, et paraueris instrūtm pneumaticū. subleuaturū igit̄ agm in uas supig A impleb̄ uasa B C aqua, qoz repletis uasa A cita obturabis, vt aër neq; agm ingredi possit, scilicet n̄ si fueret, agm cribro haurires. obstructis v. uasis p dictis apertis epistomū F tubū V. dico agm ista nāam suā ex uase C in uas A ascensurā, qd sic dīgistro, apertis epistomū F aqua uasis B effluet, vel n̄, si n̄, qd aqua ista nāam suā sine uirtē manebit uiolēt̄ suspensa, qd dicit n̄ p̄t, cū ag descendit iuxta 7 axiōa pportionalit̄ sit ascensui in uas A, imo nriū cadet infra aëlibrū lineā in tm, in qntū aqua sustollenda, qd nriū effluet, qd erat pbandū, si qd effluet aqua uasis B. ob uasis exinanitionem, aëris qm in suū locū substituat, indiga-
quā

qua uia id potest, sumope laborat, ne qd int, sollicitam hanc naa deliberarem, interea, irrepat uacuu, aut nimia aeris attenuatio, tanto uegg ex vase A aeren extorqit; ueru noua lueta, aeren. uafis A succurrente ag laboranti uafis B. magis se pualij uacui inuadendi exponit. quasi sollicitu et indigz nouo p se succursu, ad hystem iam ia iminentem coercendu, cu nil sit, qd in subsidiu uenire potit, nisi aqua uafis C, qm poterit fumo dato illa ex eo extrahet, q et no- tans extream neitem ad uacuu eliminandu, et ad mutua uafis xerse xeruandu iuxta axion 2. Ita naam sursu eleuabit in uas A, ut noug aer habeat p foramen I uafis C, ponat n. agm uafis C n ascendere in uas A, qd dabit uacuu in syphonibz S. T. et uase A. qd e tra axioa 2. si ascendat, hmg, qd uolumg, et qd erat faciendu. †

Coroll. colligis hinc qd qd fons, seu aqua aliqua ex vna ualle in alia p uertice montis sit de- ducenda. 2. quare in mensis Principu, inuadissa spectacula, ut leones bibentes, auicula ca- nentes, satyra figula ludentes, Parnassij cu musis, corui crocitantis, Bubones ululantes, fera saltantes et. exhiberi gant. 3o qd ex eodem figno dresi gntis liquores ita in vno utro xtimeant, ut n misceant. † † †



...eore + elabo
 ...phata, ut
 ...pary 3
 ...sug 15
 ...n 8 d fudo
 ...m eors ing
 ...uorem fudo
 ...lyphon per
 ...inueren
 ...lygon f f
 ...ingulis uaf
 ...aeren uaf
 ...canali C
 ...inguis d
 ...trung d
 ...t e fuga
 ...is xly
 ...uab. mox
 ...relachent
 ...fuga f
 ...Syston p
 ...B aqua p
 ...sua infon
 ...Collig
 ...pessu
 ...2. qd
 ...

Prop 2. Probl. 2. agm ad gnuis altitudinē uirtē aëris impulsiva attra-
 here. i. elatung agm in altū uirtē impulsiva, sic age, fiant duo vasa A B optime ferruminata, et ita
 solidata, ut nihil aëris penetrare possit, pone unū directe sup alterū ea dista, qua agm uis eleuari,
 parat 3 siphones F E. C D. G H uasi A et B implumbandos, siphon C transeat p utruq fundū uasis
 A, cui os ita sit coagmentatū fundo superioris receptaculi M, ut infusa agm statim absorbeat, inferiq v.
 os D, ad fundū fere uasis B inferioris extendat, superiori v. uasi fundo sic sit inglutinatq, ut neq
 uis aëris ingredi possit. E F siphonem sic duces, implumbetq os F superiori fundo uasis B, ducatq p infe-
 riorem fundū uasis A eo usq, ut os E superiorem fundū uasis A ppe, n̄ oīo tangat, et bene ducetis.
 siphonem porro G H sic statuas; transeat p fundos utriusq uasis A et M receptaculi, eo usq, ut fundū
 inferiorem uasis A osculo suo H ppe n̄ oīo contingat, altitudo v. huius tanta erit, quāta E F. in uase porro
 superiori A sit epistomiu S infundenda aq grāa factū, et paraueris instantim. His ita rite dispositis
 implebis uas A p suū epistomiu liquore, arctiq iterū obturato fundatq aqua in receptaculo M, dico
 aërem uasi B extētu, agm uasi A inclusa p fistulā G H uolentē expulsurū, aqua n. delapsa p
 canalē C D aërem aërem in uase B spatientem inueniens fortissime mole sua comprimet, aërem
 impuiso obestq et coarctatq nullū effugiendi locū inueniet, retro n. urget moles labentiu aquarū
 utriusq obstant murorū impenetrabilū crassities, qō in extremas quasi angustias redactq p fistulā
 F E fuga sibi exulere tentabit, verū cū supiq oīm exitū interclusū regiat. C. ē n. uas A agm plenu et
 oīs xlij inops, urget n. inferior aqua continuo aucta superior utpote mole inferiori aequalis cadere re-
 casat; mox oris pliu, aër n. ne penitq in nihilū abeat dēno effia sua pseruanda uolentissē magm
 reluctantem infungit, aqua tantis uiribz urgentis aëris resistere negens, uicta demū p fistulā H G
 fuga sibi consulat, quo facto lagga in receptaculo M ueluti facti panitens, uindictā de nouo moliens
 siphonem p fistulā iterū adoritq, atq hac mutua infecio luctatq aëris et aq tam diu durabit, usq dū uas
 B aqua plenu, aër uictor et iam liber ab hoste, regione sua potiatq, aqua v. seu subiegata in regioē
 sua inferiori remanente iuxta axiōa j. qō aëris impulsu leuabitq aqua, v. cent duo corpora in eodē
 loco. f.

Corollaria. f.



Colligis hinc facile, credo, qua ratione fontes salientes artificiosissime per com-
 pressionem aëris conseruari possint; qō organa quondam hydraulica coninuarint. f.
 2. quo artificio et industria manuale tormentum adaptari ea ratione possit, ut
 sine ullo extrinseco impulsore et motore, sola configati
 aëris uirtute explodatur; et stia plura. f.

Prop 3

Figura ad Probl. 2.



Corollarium.




Prop. 3. Probl. 3. remanente eode lapsu aq ppendiculo 100 pedu agm in summitate
 200 pedu partim attractiva, partim impulsiva ui attollere.

Ppendiculi dependentis aq equali ee dote vel longiq ppendiculo aq ascendenti, e certe, adeoq mirum,
 ut n' possit aequalitate horu ppendiculoru aqua nunq effluat, neq sit ascensura, atq hoc e inevitabi-
 lis naa neitas, ut nullis vngm conatibz aut exgia valuerim naam aq dependentis fallere. Na n'
 nec falli nec fallere uult, qd pmitit, s'ong obseruat, qd dat m'ngm retrahit, qnta n' e ppendiculu, tm aqua
 attollet, nec plq, nec m'ng; Sone vngm inevitabile naa neiton, cu' onoffemq, libuit id alia uia exquiri,
 atq adeo nullis laboribz pepimq, ut inueniremq modu' aliqm, quo breuioze ppendiculo agm in mai-
 orem summitatem attollere poemq, qd tandem longis laboribz ipsa magyora exgia docti inuenimq
 eo modo fieri poe, quo seqt: Parec vas qddam A instructu' deorsu' uergente ppendiculo 100
 pedu cu' epistomis e S. Superiori fundo vasis A sit coagmentatq sypson 200 pedu, extendatq ad fastigiu'
 uasis I L superiori eidem fundo implumbandq, ex altera parte eidem uasis alig sypson priori aqua-
 lis ducat in uas G. fundo eidem superiori implutinandq. ex uase G ducat alig tubq V J in s'p'm uas E d
 100 pedu, alig iteru' tubq ex uase E d ducat in uas H, eruntq uasa epistomis instructa: obturatqz uasis
 G A aqua epistomiu' sypsonis S, S; duo agm ex uase G ascensura' qdem sed n' nisi in R, si n' alig ascen-
 denset, eet ax 7, tm n' dit ex ppendiculu' labentis aq qnta ascendenti, ac pnde ubi aqua uenerit ad R
 sumor sypsonis S, S ita nam fluere desinet, si si ostendo, si n' aqua flueret alig supra R aqua n'
 ascendente, uacua dari in sypsonibz reliqz et uase I L nec e, qd ad hoc uitand'u' utraqz aqua suffensa
 ma-


manebit; si qd porro faciendū, ut aqua in destinatu locū JL eleuet; apud epistomū Z factū uas H, et aqua descendet p canalē sicutū in uas ED, aer compressus p canalē T sumo impetu aq in suspensio laboranti succurret, expellendo ea sursum in JL, aer n̄ inclusus ED retrogredi n̄ ualens impediēte mole labentis aq p syphonem Z, nec m. in aqua in eodem loco existens iuxta axia 3, agn uolentē suspensam p canalē T impulsū leuabit. factis qo faciendis eodem manente ppendiculo, tu uirtē attractiua, tu impulsua aqua duplo altij eleuabit, qo erat faciendū. p. v. t.

Figura ad Probl. 3



Prop. 4 Probl. 4. dato quouis ppendiculo agm 2plo, 3plo, decuplo, etc. altij eo ppendiculo eleuare. v. Ductus agm in altū 1/2 300 pedū apta 7 uasa, quorū 4 in aquali plano iuxta semicircū ponant, signata litteris A. I. K. L. reliqua tria supra se inuicem ponant, quorū vnūqz ab altero sit 100 pedes distat, signata litteris A. B. C. D. his ita positis ducant syphones ex vnūqz uasis A. B. C. D. fundo inferiori, ad pxi uasis superiorem fundū, ita n̄. ut fundū n̄ oīo tangant, sintqz syphones signati litteris O. P. Q. deinde ponant alij syphones: pxi qdem H. H. ex uase B in uas I, 2dy G. G. ex uase C in uas K, 3dy E. E. ex uase D in uas L, 3o ducant alij syphones N. N. N. 300 pedū suis epistomjs m. m. m. instructi, ex inferiori fundo uasorū I. K. L. deorsū uergentes, atqz si oēs syphones uasis suis sint optē inglutinati, singula quoz

Singula quae uasa A. J. K. L. sua habent opacula & R. R. R. infundenda aq. graua facta.
 Duo hanc machina ita parata agm uasis A in D 300 pedibz distita leuatura, manente eodem ppon-
 duulo 300 pedu N. N. N. hoc ita empirice dntro. Repleant uasa A. J. K. L. aqua, firmiterq. obturent,
 deinde apach epistomium M uasis J, et iuxta globula in aqua uasis A ascendet & syphonem o in B.
 2o apach epistomiu M uasis K et aqua effluens trahet agm uasis B & syphonem P in uas C, quafub-
 lata apach epistomiu uasis L trahetq. aqua ex C & syphonem Q in D 300 ped. a uasa A distita, qd erat
 ostendendu. Non seig opabere, si duplo, deuplo eleuare agm uelis. s. B, tot regri uasa tam supra,
 qm infra, qd seig centens pedibz agm us eleuare p. Coll. 7 qoo aqua m. ad vnu miliaru et vii altu
 eleuari pot. 2o qoo us gnis ludera imagines extrui possit, vt ex yz bibentes toto uultu liquore yz
 stento asserant, qoo in celauu aer gnrari pot ad refrigerandos uiuas, qoo aer his machinis incluzg uias
 folia subeat. p. v. v.



Handwritten notes in a cursive script on the right margin of the page, partially cut off. The text is difficult to read due to the cursive and the angle of the page.


Prop: 5 Prob: 5 Machina pneumatica conuincere, qua uirtu caloris aqua sursum eleuatur,
cuius motus perpetuus non inuenitur nisi per se.

scilicet 4 anea aut plumbea uasa ita ferrumina nata, ut nulli aeri quia, uno uicibus pede lata,
octo aut 9 longa A B C D extendat supra siphon E, cuius brachia in singula uasa ducantur implenda
bando ad fundos prope uasorum, in S fiat uentile, quod ea arte parabitur, ut aqua ascendente agatur, et
aqua lausita mox claudatur, in inferiori parte siphonis quos siphon pariter P in 4 uasa ducta et impleta
bitur, in loco M parabitur uentile, de quo paulo ante dictum, cui affixus sit canalis seu fistula plumbea,
cuius os in fossam fossa V: aqua ingrediat, ut uides, et paraueris instantem. Repleant uasa A B C D aqua
ad 3/4 fore partem per epistomium N, quod facile per siphonem P ex uno uase in aliud ducit, apertis tamen prius opercu-
lis 2. 3. 4. ut aer inclusus et ab aqua introeunte pulsus, libere egredi possit, quo facto uasa demum ostia
obturent suis operculis, ne aer ingredi queat. His partibus expomat machina aethyris solis, a alteri loco calido,
dico aqua uasis A B C D sursum per canale E et uentile S in receptaculum V. leuatum iri, nam iuxta
axiam G aqua calefacta maiorem locum regrens, cum in uasis, ut pote firmissime obturatis non inueniat
locum, cum sibi per brachia siphonis E regret, ascendet ergo in siphonem E, cum ergo locus acceptus sit adhuc nimis
angustus per aqua ex 4 uasis sursum ascendenti, aqua aqua uigens aperit paulatim uentile S, et se se in recepta-
culum V exonerabit per caniculos eodem receptaculo conuolutos in fossam fossa fonticuli instar uicundis
murmure delatib. si uero aqua a uasa deseruerint, mixta oris lacta, uasa non exinarta fere, alia aqua,
quam in exhausta locum sustinent, indiga, ubi inueniant, aene laborant, supra quod non possunt, quia effluunt,
nec aerem substituere possunt, est prope uentile S iam clausum, nil ergo restat ad uacuum uasis impediendum,
nisi succurrit aqua in fossa fossa sterta, cuius operum ut in extrema nece sustituta implorant, aqua inferior
locis sua quadam nece instincte conuulsa succurrens per fistulam attracta, aperit uentile M, usque dum se in lo-
cum deficientis aqua substituuerit, aqua laborante in libertate uindicant. Aqua pristina sua libertate quae-
rens, rarefacta, uidentior facta, demum per canales A ascendet, ubi prius, certo iam sciens, nunquam se in his
locis sustitutam ab aqua inferiori derelictum iri; atque hic agens et desponsus durabit, quod diu loco
calido fuerit exposita; ponamus autem aquam non ascendere, ergo falsum est axiam, aqua se rarefacta naturaliter reg-
rere maiorem locum; si uero dicamus, aquam ascendere sed non suppleri potest aqua deficientem per inferiorem
aquam, neque hoc rationabiliter dici potest, si uero aqua euacuatis iam uasis non ascenderit, ergo daretur uacuum in ua-
sibus A B C D quod est naturaliter impossibile, ergo ad mutuum naturam sensum seruandum aquam inferiorem ascen-
dere nec est, ergo factis faciendis aqua uis caloris rarefacta sursum eleuabitur, quod erat ostendendum.

Coll: multorum ingenia fatigauit sitis magis exstinguendi lacerna a ligno, a. candela perpetuo ardente, quod mo-
di antiquos Romanos coluisse certum est, cum ea non solum regna sint in antiquis seculis ad 100 et ultra annos ex-
arsissa, ut Cardanus et Hippocritus, de quo fere Rom: Sybaria testatur. An non per uiam haec iurgia pneumatica fieri pu-
tandum est? si uero magis eius exstinguendi methodus artificiosissimum artificem regnat, ea iam omnibanda putamus.


2o quod candela sub aqua ardere possit, item quod statua quaedam existat, articulatam ferri edens, ut libertas M. et salomo.

Item



Prop. 6. Probl. 6. Horologium pneumaticum, pneumatica roe. construere. p̄.
 Fiat domuncula, cuius parietes sint alti tres pedes a se inuicem dispositi scilicet pedes, signati litteris A
 B. C. D. E. F. huius domuncula iuxta L. S. T. V. includatur cysta aquatica D. opte ferruminata, ex
 quolibet solida ma. oia latera quasi radens. inferius ponatur aliud uas capax et sic ad hunc ag. exi-
 pienda designatur. superius v. ad apertum tympanum Vini medij parietis punctis T. et H. velut arboribus uoluerunt
 extremis quoque axis insigatur index mobilis, monstrandis horis formosus in circulo agiles in partes 12. di-
 uiso deputatus. deinde fiat arca Z. ex ligno solido quadrata, q̄ impoſita cysta D. ei adquate ubiq̄ fideat.
 Sit a. Sac. cysta caua intus ita obturata, ut nihil transpirare possit ita leuis, ut signaturare, habeat quoque
 Sac. arca in medio superioris fundi anſa, cui alligabitur fune una cu. ppendiculo tympano V. circuliq̄.
 His ita paratis apta syphonē curuā adinstar tubae, ab una t̄. parte qm̄ alia longiorem, cuius tubi cuius breuior
 X. duces p̄. utriusq̄ fundi arca Z. ita cogmentatur, ut nec aër, multo minus aqua in arca penetra-
 re possit, opuscula quoque cuius cruris extremi p̄. fundos deducta, ita ut inferius emineat, et aqua semper ma-
 neat immersa, longiq̄ a. cr. extra cysta D. ore suo M. deorsu uergat, et sic parauerit ingrentim. p̄.
 Vsq̄. Repleat cysta D. aqua lymphidissa, imittat supra eam arca Z. una cu. tubo recuruo, uergente ore
 M. longioris cruris tubi X. comodo quo fieri solet, du. uinu. attractis p̄. syphonē uisarios, et statim scilicet
 aqua fluens in s̄. vas L. et tam diu fluet, qm̄ diu cysta D. aqua habuerit, et arca Z. paulatim
 subsidendo funem tympano V. circuliq̄. seu trabendo uertet axem. A. et p̄. x̄. gis ei apertu. indice adu.
 aquabile aqua fluxu. agili quoque in orbem duct. ut a. muenias p̄. portionē t̄. fluxu. ad indigetia horaria. sic
 ages. opuscula syphonē externu. in conu. acuminem relicto minimo forate, deinde posito indice horario sup̄. bo-
 ra. ita fluet aqua, ipso a. momento fluxu. uerte. accuratissimam clepsidra, et nota. cu. hora effluxerit, qd̄
 index horarij monstruet, si ultra q̄. minori forate. op̄. erit, si ante, maiori, et hoc toties expiere,
 donec p̄. portionē fluxu. ad t̄. regias. p̄. erat faciendū. p̄. p̄. p̄.

Figura ad Probl. 6.



anté est d
 l'anté d

libere et
 nata, ce
 de ag exai
 ty suberit
 oris re hi
 de vbi dicit
 ces par
 allegandi
 cog omni
 na pende
 ca pome ma
 vntia +
 ergente ora
 phim l'p
 paulati
 i indit' d
 maria, se
 vna p' d
 vnti d
 las exire

152.

Tabula a
hincro. g

Plenitudo
Pobli

42	gr
43	gr
44	gr
45	gr
46	gr
47	gr
48	gr
49	gr
50	gr
51	gr
52	gr
53	gr

42 Gr
43 Gr
44 Gr
45 Gr
46 Gr
47 Gr
48 Gr
49 Gr
50 Gr
51 Gr
52 Gr
53 Gr

42 Gr
43 Gr
44 Gr
45 Gr
46 Gr
47 Gr
48 Gr
49 Gr
50 Gr
51 Gr
52 Gr
53 Gr

42 Gr
43 Gr
44 Gr
45 Gr
46 Gr
47 Gr

eleuāo poli. iz. ¹¹ ¹⁰ ⁹ ⁸ ⁷ ⁶

48. Gr.	42.	0	40.	16.	35.	25.	28.	18.	19.	33.	9.	58.	0.	0.
49. Gr.	43.	0.	39.	19.	34.	37.	27.	38.	19.	9.	9.	47.	0.	0.
50. Gr.	40.	0.	38.	23.	33.	49.	27.	2.	38.	45.	9.	35.	0.	0.
51. Gr.	39.	0.	37.	26.	33.	2.	26.	25.	38.	20.	9.	22.	0.	0.
52. Gr.	38.	0.	36.	27.	32.	13.	25.	48.	17.	56.	9.	30.	0.	0.
53. Gr.	37.	0.	35.	33.	31.	25.	25.	35.	37.	33.	8.	58.	0.	0.
	G	M	G	M	G	M	G	M	G	M	G	M	G	M
42. Gr.	36.	30.	34.	45.	29.	49.	22.	26.	33.	20.	3.	9.	0.	0.
43. Gr.	35.	30.	33.	48.	29.	0.	21.	46.	12.	57.	2.	50.	0.	0.
44. Gr.	34.	30.	32.	51.	28.	10.	23.	6.	32.	25.	2.	37.	0.	0.
45. Gr.	33.	30.	31.	54.	27.	20.	20.	26.	11.	55.	2.	32.	0.	0.
46. Gr.	32.	30.	30.	56.	26.	30.	19.	45.	11.	22.	1.	53.	0.	0.
47. Gr.	31.	30.	29.	59.	25.	39.	19.	4.	10.	53.	1.	33.	0.	0.
48. Gr.	30.	30.	29.	2.	24.	49.	18.	23.	10.	21.	1.	14.	0.	0.
49. Gr.	29.	30.	28.	4.	23.	58.	17.	42.	9.	54.	0.	54.	0.	0.
50. Gr.	28.	30.	27.	7.	23.	8.	17.	1.	9.	20.	0.	35.	0.	0.
51. Gr.	27.	30.	26.	9.	22.	11.	16.	20.	8.	49.	0.	16.	0.	0.
52. Gr.	26.	30.	25.	11.	21.	26.	15.	38.	8.	19.	0.	3.	0.	0.
53. Gr.	25.	30.	24.	14.	20.	35.	14.	56.	7.	48.	0.	23.	0.	0.
42. Gr.	27.	48.	26.	24.	23.	52.	15.	30.	6.	44.	2.	54.	0.	0.
43. Gr.	26.	48.	25.	19.	21.	2.	14.	28.	6.	11.	3.	19.	0.	0.
44. Gr.	25.	48.	24.	21.	20.	10.	13.	44.	5.	36.	3.	44.	0.	0.
45. Gr.	24.	48.	23.	23.	19.	18.	13.	0.	5.	2.	4.	9.	0.	0.
46. Gr.	23.	48.	22.	25.	18.	26.	12.	16.	4.	27.	0.	0.	0.	0.
47. Gr.	22.	48.	21.	27.	17.	34.	11.	32.	3.	52.	0.	0.	0.	0.
48. Gr.	21.	48.	20.	29.	16.	42.	10.	48.	3.	17.	0.	0.	0.	0.
49. Gr.	20.	48.	19.	31.	15.	49.	10.	4.	2.	43.	0.	0.		
50. Gr.	19.	48.	18.	33.	14.	57.	9.	20.	2.	8.				
51. Gr.	18.	48.	17.	35.	14.	4.	8.	35.	1.	33.				
52. Gr.	17.	48.	16.	37.	13.	12.	7.	53.	0.	58.				
53. Gr.	16.	48.	15.	39.	12.	19.	7.	6.	0.	23.				
42. Gr.	24.	30.	23.	3.	18.	52.	12.	25.	4.	14.	0.	0.		
43. Gr.	23.	30.	22.	5.	18.	0.	11.	40.	3.	38.	0.	0.		
44. Gr.	22.	30.	21.	7.	17.	7.	10.	55.	3.	2.	0.	0.		
45. Gr.	21.	30.	20.	9.	16.	14.	10.	30.	2.	25.	0.	0.		
46. Gr.	20.	30.	19.	11.	15.	22.	9.	25.	1.	49.	0.	0.		
47. Gr.	19.	30.	18.	13.	14.	29.	8.	40.	1.	13.				
48. Gr.	18.	30.	17.	14.	13.	36.	7.	54.	0.	36.				
49. Gr.	17.	30.	16.	16.	12.	43.	7.	9.	0.	0.				
50. Gr.	16.	30.	15.	18.	11.	50.	6.	24.	0.	0.				
51. Gr.	14.	30.	14.	20.	10.	57.	5.	38.						
52. Gr.	15.	30.	13.	22.	10.	4.	4.	53.						
53. Gr.	13.	30.	12.	24.	9.	11.	4.	1.						

Pro Signo X et M.

Pro Signo et

Pro Signo V.D.

Si pro pluribus grad. vis. vide P. Bristoborū Claviū.
 En Alcalá de henares al año 1634. a los nuábe de março

Las letras del Alfabeto por la Guitarra Española.

+	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P.
z	z	z			z	z	z			z	z	z	z	z	z
z		z		z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z
			z	z	z	z	z	z	z		z	z	z	z	z
	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z
	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z

g. z. p. l. e. x. h. z. R. m. z. S. n. z. J. p. z. V. k. z. X. g. z. y. b. z. z. m. z. R.

Balli, spagnolette, sarauande, follie, Galiarde, Passacaglie, et altre sonete intauolate per la chitarra alla spagnola.

Passacaglie per tutto Alfabeto.

A	B	C	A
B	G	A	B
C	A	D	C
_____	_____	_____	_____
D	E	F	D
E	O	G	E
F	G	R	F
G	H	B	G
H	M	G	H

J |
 K |
 L |
 M |
 N |
 O |
 P |
 Q |
 R |
 S |
 T |
 V |
 Z |
 Y |
 I |
 E |

C |
 H |
 P |
 X |
 F |
 L |
 K |
 H |
 T |
 T |
 E |
 X |
 T |
 Z |
 Y |

T |
 G |
 O |
 H |
 M |
 C |
 P |
 H |
 G |
 R |
 S |
 F |
 E |
 C |
 A |

I |
 K |
 L |
 M |
 N |
 O |
 P |
 Q |
 R |
 S |
 T |
 V |
 X |
 Y |
 Z |

.157.

9
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X
Y
Z

158.

modo
totam
tibi di
si duo
in 5.
quatu
pocant
tu tot
quatu
tamen
in al
et, rem
in 5.
2i cr
edit
rehin
Coni
tan ra
p. of f
isaru
medie
numera

Questiones ex Arithmetica . 159.
Coniecturari quantum pecunia habeat.

modo non habeat ultra 105 vel minus 1.

Totam summam iube eum diuidere in 3. quoties potest, reliquum tibi dicat, si unum remaneat, tu in animo numera 70. si duo, 140. Secundo iube eum rursus diuidere suam pecuniam in 5. quoties potest, quod superest, tibi significet, et tu pro quatuor unitate relicta in animo sume 28. tertio diuidat pecuniam in 7. quoties potest, et quot unitates remanent, tu toties numera 15. Tandem adde illa 15, 28 et 70, et subduc ex tota summa 105 quoties potest, quod superest abieceris tamen null. vel cyphris, si que sint. Reliquum erit summa concepta in alterius mente. E. g. habeat alter 14. diuidat in 3. quoties potest, remanebunt duo, que apud te faciunt 140. deinde diuidat in 5. remanebunt quatuor unitates, quilibet unitas facit apud te 28 erunt ergo 84. tertio diuidat in 7. remanebit nihil. additi hi numeri inter se faciunt 224. subtracta 105 reliquunt 119, a quo si iterum subduantur 105. remanebunt 14.


Alia coniectura.


Cincipiat quis summam quam voluerit, et illam duplicet, ad duplicem tam rursus addere summam equalem quam tuo latere. V. g. 2. 4. 6. uel 8. et sic tota summam diuidat in duas partes, et una parte diuisarum tibi dicat, a qua parte diuisa, si subtraxeris in mente medietatem tui numeri equalis, quam iussisti addi, quod remanet, e numerus ab altero conceptus animo. ¶

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

. 161.



102.





Pro Dag: iis horologia scitibonali
 Langenb. b.

Sic et Langens Elevatio 49 gradibus 30 minutis 30 secundis occupatis et ex oppositi: hinc versus Roma 64 minutis



106.

der Herr unser Gott, der Herr aller Herr

der Herr aller Herr

Der Herr unser Gott, der Herr aller Herr

168

169

170

171

172

173

174

175

175

176

110
777

?

*

178

179

180

181

1192

8

183

7


184


185

1

186

8









x + 1865. 19/15 nm

60

restauriert Nov. 1980, Hr.



St



restauriert