

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Exkursionsberichte - Pilzfunde - Neue Pilzliteratur - Vereinsnachrichten

[urn:nbn:de:bsz:31-221419](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-221419)

☒	Exkursionsberichte	☐	Pilzfunde	☒
---	---------------------------	---	------------------	---

Pilzfunde aus Deutschböhmen.

Mitgeteilt von Prof. Dr. G. Beck-Mannagetta (Prag).

1. Riesengebirge.

Juli bis anfangs August 1922 bei regenreicher, kalter Zeit. Fundorte: 1. um Spindelmühle und Friedrichstal, 700—900 m; 2. auf dem Schüsselberg, 800—1200 m; 3. Krausebuden, 800—1000 m; 4. auf dem Planur, 800—1100 m; 5. St. Peter, 780—900 m; 6. auf dem Ziegenrücken, 800—1200 m; 7. Elbe- und Pantschwiese, 1300—1400 m; 8. Koppenplan und Aupafall, 1400 bis 1450 m; 9. Rennerbaude, 1400—1450 m; 10. Weißwassergrund, 800—900 m.

(Alle aufgezählten Pilze wurden gemalt und mikroskopisch untersucht.)

- Russula adusta* Pers. 6; *R. furcata* Pers. 1—2; *R. cyanoxantha* (Schaeff.) 3; *R. alutacea* Pers. 4; *R. integra* (L.) 4; *R. nauseosa* Pers. 1.
- Lactaria deliciosa* (L.) 3; *L. glycosma* Fr. 8 (—1450 m); *L. rufa* Scop. 1—8 (—1450 m).
- Hygrophorus* (*Hygrocybe*) *obrussea* Fr. 5; *H.* (*Hygrocybe*) *spadicea* (Scop.) 5.
- Coprinus micaceus* (Bull.) 1.
- Agaricus* (*Clitocybe*) *aurantiacus* Wulf. 3; *A.* (*Omphalia*) *scyphiformis* Fr. 9 (bis 1420 m); *A.* (*O.*) *fibula* Bull. 1; *A.* (*O.*) *campanella* Batsch 4; *A.* (*Tricholoma*) *rutilans* Schaeff. v. *citrinus* 3; *A.* (*Collybia*) *distortus* Fr. 1; *A.* (*C.*) *prolixus* Horn. 10; *A.* (*C.*) *acervatus* Fr. 2; *A.* (*C.*) *dryophilus* Bull. 2; *A.* (*Mycena*) *speireus* Fr. 3; *A.* (*M.*) *purus* Pers. 1; *A.* (*M.*) *alcalinus* Fr. 2; *A.* (*Marasmius*) *ingratus* Schum. 1; *A.* (*M.*) *oreades* Bolt. 5; *A.* (*M.*) *alliaceus* Jacqu. 2; *A.* (*M.*) *androsaceus* (L.) 4; *A.* (*M.*) *perforans* Hoffm. 6; *A.* (*Laccaria*) *laccatus* Scop. 5.
- Hyporrhodius* (*Nolanea*) *pascuus* (Pers.) 10.
- Derminus* (*Galera*) *antipus* Lasch 4; *D.* (*Simocybe*) *inquilinus* (Fr.) 1; *D.* (*S.*) *scorpioides* (Fr.) 7; *D.* (*S.*) *reducta* (Fr.) 7.
- Paxillus involutus* (Batsch) 3.
- Pratella ericacea* (Pers.) 5.
- Coprinarius* (*Panaeolus*) *subalteatus* (B. K.) 1.
- Naucoria tabacina* (D.C.) 6; *N.* (*Galerula*) *mycenopsis* Fr. 4.
- Cortinaria* (*Myxaciium*) *stillatitium* Fr. 3; *C.* (*Dermocybe*) *anthracina* Fr. 4; *C.* (*D.*) *cinnamomea* (L.) 5.
- Hypholoma capnoides* (Fr.) 4.
- Chalymotta phalaenarum* (Fr.) 9.
- Pholiota aurivella* (Batsch) 2—4.
- Psalliota* (*Stropharia*) *melasperma* (Bull.) 5.
- Amanitopsis vaginata* (Bull.) 1—6.
- Mucidula laqueata* (Fr.) 2.
- Amanita muscaria* (L.) 5, v. *umbrina* Fr. 5; *A. excelsa* (Fr.) 2; *A. pustulata* (Schaeff.) 1—6.
- Boletus piperatus* Bull. 4; *B. variegatus* (Swartz) 8 (—1450 m); *B. chrysenteron* Bull. 1, 3; *B. subtomentosus* L. 3, 8 (—1450 m); *B. rufus* Schaeff. 1; *B. bulbosus* Schaeff. 1—6; *B. pachypus* Fr. 2, 4; *B. badius* Fr. 2; *B. fragrans* Vitt. 3; *B. erythropus* Pers. 2, 4, 6.
- Boletopsis elegans* (Schum.) 1—6.
- Clavaria spinulosa* Pers. 1, 3; *C. rugosa* Bull. 1, 2.
- Calocera viscosa* (Pers.) 2.

2. Bodenbach an der Elbe.

September 1921 nach trockener Zeit. Fundorte: 1. auf dem Pfaffenberge, 150—347 m; 2. Hutberge, 300—498 m; 3. Hopfenberge, 200 bis 500 m; 4. der Kolmerscheibe, 140—440 m; 5. der Schäferwand, 150—270 m; 6. dem Rotberge, 150—250 m; 7. um Kalmswiese, 250 bis 350 m; 8. Maxdorf, 350—480 m; 9. Niedergrund, 130—450 m; 10. auf dem Hohen Schneeberg, 400—720 m; 11. um Biela, 200—450 m. (Alle aufgezählten Pilze wurden gemalt und mikroskopisch untersucht.)

- Cantharellus infundibuliformis* (Scop.) 11.
- Russula lactea* Pers. 1; *R. mustelina* Fr. 9, 11; *R. furcata* Pers. 1; *R. olivacea* (Schaeff.) 2; *R. Linnaei* Fr. 9; *R. rubra* D.C. 8, 9.
- Lactaria umbrina* Pers. 6; *L. glycosma* Fr. 2, 11; *L. helva* Fr. 11; *L. rufa* (Scop.) 9, 11.
- Hygrophorus* (*Camarophyllus*) *coesus* (Sow.) 4; *H.* (*Limacium*) *olivaceo-albus* Fr. 11; *H.* (*L.*) *pustulatus* (Pers.) 9.
- Gomphidius viscidus* (L.) 1, 9; *G. glutinosus* Fr. 8, 9; *G. stillatus* Strauß 9.
- Agaricus* (*Pleurotus*) *salignus* Pers. 3; *A.* (*Clitocybe*) *candida* Bres. 1; *A.* (*C.*) *aurantiaca* Wulf. 9; *A.* (*Omphalia*) *demissa* Fr. 8, 9; *A.* (*Tricholoma*) *virgatus* Fr. 9; *A.* (*T.*) *impolitus* Lasch 9; *A.* (*Collybia*) *radicatus* Relh. 8; *A.* (*Mycena*) *speireus* Fr. 9, 11; *A.* (*M.*) *rugosus* Fr. 1, 11; *A.* (*M.*) *excisus* Lasch 9; *A.* (*Marasmius*) *oreades* Bolt. 11; *A.* (*M.*) *perforans* Hoffm. 9; *A.* (*Laccaria*) *laccatus* Scop. 9.
- Hyporrhodius* (*Nolanea*) *pascuus* Pers. 11.
- Paxillus atrotomentosus* (Batsch) 7—9; *P. involutus* (Batsch) 7—9, 11.
- Pratella spadicea* (Schaeff.) 9.
- Inocybe sindonia* (Fr.) 11; *I. lucifuga* (Fr.) 9; *I. fastigiata* (Schaeff.) 8.
- Clypeus carptus* (Scop.) 9.
- Naucoria suavis* Bres. 9.
- Cortinaria* (*Myxaciium*) *elatior* Fr. 9; *C.* (*Phlegmacium*) *claricolor* Fr. 2; *C.* (*Dermocybe*) *sanguinea* (Wulf.) 9, 11; *C.* (*D.*) *cinnamomea* (L.) 9, 11; *C.* (*Hydrocybe*) *privigna* Fr. 2; *C.* (*H.*) *armeniaca* (Schaeff.) 8.

Hypholoma sublateritium (Fr.) 8—10;
H. capnoides (Fr.) 9; *H. epixanthum* (Fr.) 9, 11.
Chalymotta phalaenarum (Fr.) 9.
Armillaria mellea (L.) 9.
Pholiota squarrosa (Fl. dan.) 1, 4; *Ph. flammea* (Fr.) 9; *Ph. mutabilis* (Schaeff.) 9.
Amanitopsis vaginata (Bull.) 9.
Amanita mappa (Batsch) 5; *A. phalloides* (Fr.) 9; *A. pantherina* (D.C.) 9; *A. muscaria* (L.) 1—11, v. *formosa* (Gonn. Rab.) 1; *A. excelsa* (Fr.) 1; *A. pustulata* (Schaeff.) 1, 3, 8, 9.
Tylophilus felleus (Bull.) 9.
Boletus piperatus (Bull.) 2; *B. variegatus* Sw. 9; *B. bovinus* L. 9; *B. aereus* Bull. 9; *B. badius* Fr. 8, 9, 11; *B. bulbosus* Schaeff. 9.
Boletopsis elegans (Schum.) 8.
Polyporus giganteus Pers. 11.
Clavaria flava Schaeff. 8; *C. cristata* Holmsk. 11; *C. rugosa* Bull. 11.
Calocera viscosa (Pers.) 8.
Phallus impudicus L. 10, 11.

Pflanzengeographische Beobachtungen an obb. und obpf. Hymenomyceten.

2. Reihe.

Unter den Exsikkaten des † Herrn Ob.-Stud.-Rats Lederer befinden sich manche seltenen Pilze. Da sich dieselben jetzt in meinem Besitz befinden, so stelle ich sie als Fortsetzung zu meinen Standortlisten (B. I. H. 3/4) hier zusammen, und zwar nunmehr in der von Dr. Zeuner vorgeschlagenen Rickenschen Systematik. Die Funde sind sämtlich vom Sammler bestimmt; nur die Bemerkungen stammen von mir.

„*Amanita pantherina* D. C.“ Wälder bei Amberg. — Es handelt sich hier um eine weißstielige, mit Volva versehene *Amanita spissa* Fr., wie sie Dr. Klee in Heft 2 erwähnt hat. Übrigens kommt auch die echte *A. pantherina* D. C. in Laubwäldern bei Amberg vor.

Lepiota hispida Lasch. Amberg, Garten.

Tricholoma aurantium [sens. Ricken]. Kelheim, Laubwald. — Bitter.

Tricholoma carneum Bull. Lengenlohe (Oberpf.), Wiese.

Tricholoma cerinum Pers. Lengenlohe (Oberpf.), Nadelwald.

Tricholoma ionides Bull. f. *persicolor* (Fr.). Amberg, Hochofen.

Clitocybe ditopus Fr. Mariahilfberg b. Amberg, Föhrenwald, Dogger.

Clitocybe fragrans Sow. Gailohe bei Amberg, Waldwiese.

Omphalia Giovanelli Bres. Feld bei Hiltersdorf, östlich von Amberg. — Eine blasse Form, die gegen scyphoides neigt. Sp. 6—7/4—5 μ .

Omphalia campanella Batsch. Röhnberg b. Schliersee. — Diese *Omph.* kennt anscheinend Ricken nicht. *Saccardos* Sp.-Maß stimmt nicht recht. An den von mir bei Glashütte und auf dem Breitenstein (beide bei Schliersee) gesammelten Pilzen maß ich die Sp. 6,5—7,5/5 μ .

Die Art wächst von März oder April bis in den Herbst und ist montan.

Paxillus helomorphus Fr. Gailohe b. Amberg; Föhrenwald.

Inocybe praetervisa Quéf. Mariahilfberg b. Amberg; Wegböschung. — Die Sporen sind kleiner als bei Ricken: 8—9/5—6 μ ; Cyst. 40/20 μ .

Inocybe lanuginosa Bull. Amberg, Pumperhölzchen. — Mit bloß faserigem Stiel am Erdboden.

Inocybe obscura Pers. Mariahilfberg b. Amberg.

Dermocybe camura Bull. Lengenlohe b. Amberg, Nadelwald.

Telamonia torva Fr. Mariahilfberg b. Amberg, Laubwald.

Pholiota destruens Brond. Amberg, Schwarzpappelallee.

„*Pholiota filamentosa* (Schff.)“. Amberg, Eglseer Str. — Es scheint sich um *Flammula conissans* Fr. zu handeln.

Naucoria tenax Fr. Köfering (Oberpf.), Föhrenwald.

Volvaria Loveiana Bk. Mariahilfberg b. Amberg; auf *Clit. nebularis*.

Stropharialuteonitens Fl. D. Amberg, Garten. Ende Juni.

Stropharia inuncta Fr. Vilsufer bei Amberg, Damm.

Psilocybe uda Pers. var. *elongata* Fr. Freihöls (Oberpf.), Weiherand. — Vgl. hierzu: „Eine fragliche *Psilocybe*“, Heft 2 d. Z. f. P.

Panaeolus leucophanes Bk. Bei der Hockermühle b. Amberg.

Marasmius varicosus Fr. Mariahilfberg b. Amberg. — Diese Art ist von *M. fuscopurpureus* Pers. verschieden: Hut bis 2,5 cm breit. Sp. 8/3 μ .

Marasmius schoenopus Kalchbr. Großhesselohe b. München.

Hygrophorus virgineus (Wulf.). Mariahilfberg b. Amberg, Wiese.

Limacium ligatum Fr. Bernricht und Gailohe b. Amberg, Föhrenwälder.

Cantharellus tubaeformis Bull. Wagrain b. Amberg. Sp. 9—10/6—7 μ .

Cantharellus umbonatus Wulf. Ammersricht b. Amberg. Zwischen Heidekraut.

Boletus olivaceus Schff. Mimbach, Föhrenwälder (Oberpf.).

Boletus viscidus L. Bei Kelheim, Föhrenwald.

Lenzites variegata Fr. Mariahilfberg b. Amberg, Eichenstümpfe.

Stereum chalybaeum Pers. Bei Amberg, Baumstrunk.

R. Singer.

Pilzfunde im Nürnberger Reichswald.

Am Ostersonntag fand ich im Sebalder Forst, etwa 1 km hinter Schafhof, links der Landstraße, mehrere schildförmige Scheibenpilze, *Discina ancillis* Pers. Der Pilz ähnelt dem Aderbecherling. *Disc. venosa* Pers. ist aber flacher, Stiel meist obsolet, selten deutlich erkennbar, Sporen mit einem Öltropfen. Standort Nadelwald mit ein-

zelen Birken, auf Diluvialsand, an nach Norden abhängigen Stellen. Ferner am gleichen Tage im Klingerwäldchen, gleich hinter Schafhof (reiner Nadelwald), an Stöcken einige Gruppen Hyph. capnoides Fr., Rauchblättriger Schwefelkopf. Ebenfalls im Klingerwäldchen fand ich im November 1922 *Canth cinereus* Pers. und *Canth infundibuliformis* Scop. den ganzgrauen Leistling und den Trompeten-Pfifferling, beide wiederholt in großen Mengen. An den grasigen Rändern dieses Waldes stand, oft in malerischen Gruppen, der rotbraune Gallertrichterling *Gyrocephalus rufus* Jaqu. Wir haben hier unmittelbar vor den Toren Nürnbergs einen artenreichen Pilzplatz, der fast das ganze Jahr Ausbeute bietet.

Rud. Chan, Nürnberg.

Pilzliteratur.

- Barlot, J. Sur la détermination d'Amanites vénéneuses à l'aide de réactions colorées. (Compt. Rend. Acad. Sci. Paris CLXX [1920], p. 679—681.)
- Sur un nouveau réactif des Lactaires et des Russules à saveur acre. (Compt. Rend. Acad. Sci. Paris CLXXII [1920], p. 87—89.)
- Bataille, F., Flore analytique et descriptive des Tubéroïdées de l'Europe et de l'Afrique du Nord. (Bull. Soc. mycol. France XXXVII [1921], p. 155—207.)
- Découverte des réactions colorées permettant de distinguer les Amanites vénéneuses, d'après les expériences de M. Barlot. (Ann. Soc. Linn. Lyon LXVII [1920], p. 61.)
- Un nouveau Cortinaire (Ibidem p. 63.)
- Bernard, G. Champignons observés à la Rochelle et dans les environs. (Ann. Soc. Sci. Nat. Char. Infre, Juillet 1919, p. 3—13.)
- Boyer, G. Le Mycelium et les rhizomorphes d'*Armillaria mellea* Vahl obtenus en culture pures; sont-ils phosphorescents? (Assoc. franc. pour l'Avancem. Sci. 45^e Sess. Rouen 1921 [Paris 1922], p. 602—606.)
- Brébinaud, P. Bolets à pores rouges et Russules rouges. (Bull. Soc. mycol. France XXXVII [1921], p. 149—155.)
- Burlingham, G. S. Some new species of *Russula*. (Mycologia XIII [1921], p. 129—134, Pl. VII. Fig. 1—6.)
- Claude, Martin. Les champignons séchés sur le marché de Paris. (Bull. Soc. mycol. France XXXVII [1921], p. 148—149.)
- Dalmier, E. et Oliveau. Trois cas simultanés d'empoisonnement grave par *Amanita pantherina*. (Bull. Soc. mycol. France XXXVIII [1922], p. 100—105.)
- Fischer, Ed. Zur Systematik der Tubereaceen aus der Verwandtschaft des *Tuber excavatum*. (Ber. Schweiz. Bot. Ges. XXX/XXXI [1922], 1 p.)
- Fries, Thore C. E. Sveriges Gasteromyceter. Archiv for Botanik 1922, XVII, No. 9. 63 Seiten, 43 Textfiguren.
- Gautier, A. Contribution à l'étude de la toxicité des Champignons. Le cas du *Volvaria speciosa* (Volvaire gluante). Thèse de Doctorat Alger 1920. 60 pp. 1 Pl. noir.

Fortsetzung folgt.

Vereinsnachrichten.

Hauptversammlung der Deutschen Gesellschaft für Pilzkunde Würzburg 29., 30., 31. Juli und 1. Aug. 1923.

Die Veröffentlichung der Vorträge und anderen Veranstaltungen, sowie der gestellten Anträge findet in Heft 6 der Zeitschrift statt.

Aus Sparsamkeitsrücksichten muß auf Veranstaltungen irgend welcher Art, die mit Unkosten verknüpft sind, leider verzichtet werden. Auch wird keine Teilnehmergebühr erhoben.

Sämtliche Teilnehmer können in Privatquartieren untergebracht werden, deren Preise sich im Durchschnitt auf etwa $\frac{1}{3}$ der Gasthofpreise stellen.

Rechtzeitige Anmeldungen an Dr. H. Zeuner, Würzburg, Riemenschneiderstraße 9, sind unbedingt erforderlich.

Deutsche Gesellschaft für Pilzkunde Mitgliederverzeichnis (Fortsetzung).

a) Einzelmitglieder:

Böhm, T., Finanz-Obersekretär, Aschaffenburg	Mk. 1000.—
Gäbler, Reg.-Landmesser, Hildburg- burghausen	„ 100.—
Gierloff, Kurt, Dresden	„ 200.—
Hackner, Frz., Pfarrer, Niklasdorf	„ 200.—
Hornberg, Friedr., Wien	„ 50.—
Hoyer, W., Breslau, irrtüml. als Will, H. geführt	„
Huber, Hch., Oberpostkontrolleur, Wiener-Neust.	„ 500.—
Kanamüller, Adolf, Wien	„ 50.—
Meschede, Franz, Apotheker, Münster	„ 30.—
Dr. Mühlreiter, Hall	„ 100.—
Dr. Noak, Konrad Ludw., Privat- dozent der Botanik Würzburg	„ 1000.—
Romell, Stockholm	„ 14800.—
Schattburg, Gust. A. F., Bremen	„ 100.—
Schmidt, G., Lehrer, B. Wilmersdorf	„ 12.—
Schulz, Roman, Berlin	„ 100.—
Seidl, Anton, München, Lindwurm- straße 129	„ 200.—

b) Vereine:

Oberamtspflege Oberndorf a. N.	„ 50.—
Verein f. Kryptogamenkunde Dresden	„ 50.—
Verein für Pilzkunde Nordhausen (10 Mitgl.)	„ 100.—
Gesellschaft für Pilzkunde Tilsit (10 Mitgl.)	„ 200.—

Briefkasten des Verlags.

Dr. Hoyer in B. Mk. 1000.— dankend erhalten. Für April Mk. 275.—, Guthaben Mk. 725.—. Zeitschrift kam stets zum Versand. Falls Sie dieselbe nicht erhalten, bitten wir bei der dortigen Post zu reklamieren.

Lehrer Mittelstädt in Sch. Nüesch Mk. 1000.—, Bezugspreis Juni/Dez. 22 Mk. 51.—; Jan./März 23 Mk. 300.—, April Mk. 275.— = Mk. 1626.—. Ihre Zahlungen 2./8. Mk. 15.—, 16./9. Mk. 100.—, 16./5. Mk. 3000.— = 3115.—. Ihr Guthaben Mk. 1489.—.

Arno Lange, Dr. Bezugspreis beträgt Juli/Dez. 22 Mk. 51.—, Jan./März 23 Mk. 300.—, April Mk. 275.— = Mk. 626.—. Ihre Zahlungen vom 1./8. Mk. 15.—, 20./2. Mk. 250.—, 6./6. Mk. 275.— = Mk. 540.—. Somit bleibt offen Mk. 86.—.