

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Beschreibung des Bodensee's und seiner Umgebung

Pecht, Johann Andreas

Constanz, [ca. 1833]

Fische des Bodensee's

[urn:nbn:de:bsz:31-83922](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-83922)

wird derselbe vorzüglich gebildet durch den Rhein-
strom, dessen mächtiges Wasser unterhalb Rheineck
sich mit dem See vereinigt, dann durch die Dorn-
birner- und die Bregenzer-Nach, welche gleich-
sam das Vordertreffen des Bodensee's bilden, so wie
durch die Argen und die Schussen, zwischen Lin-
dau und Friedrichshafen. —

Die Höhe des Bodensee's über dem Meere, so wie
dessen Länge, Breite, Tiefe und Flächeninhalt sind auf
dem dieser kurzen Beschreibung beigefügten Kärtchen nach
den neuesten Messungen bezeichnet; wir wollen diese
Angaben also hier nicht wiederholen.

Fische des Bodensee's.

Sowohl der Ober- als Untersee sind reich an guten
Fischen, als da sind:

- 1) der gemeine Aal, *Muraena Anguilla*,
- 2) die Trishe, (Quappe) *Gadus Lota*,
- 3) der Kaulkopf oder Groppe, *Cottus Gobio*,
- 4) der gemeine Barsch, auch Kreßer oder Eglin, *Perca
Fluviatilis*,

- 5) die gemeine Schmerle, *Cobitis Barbatula*,
- 6) der gemeine Wels oder Weller, *Silurus Glanis*,
wird bis 100 Pfund schwer.
- 7) der Lachs oder Rheinlanke, *Salmo Salar*, der eigent-
liche Lachs kommt nicht über den Rheinfluss herauf.
- 8) die Lachsforelle, *S. Trutta*, erst kürzlich wurde
eine von 30 Pfund ohnweit Constanz gefangen.
- 9) die Rothforelle, *S. Salvelinus*.
- 10) der Schnäpel, *S. Lavaretus*.
- 11) die gemeine Aesche, *S. Thymallus*.
- 12) die große Muräne oder Sandfelsen, *S. Muraena*.
- 13) die kleine Muräne oder Gangfisch, *S. Muraenula*,
wird oft zu 1000 auf einmal gefangen.
- 14) der Blaufelchen, *S. Wartmanni*, der Hauptfisch
im Bodensee.
- 15) der gemeine Hecht, *Esox Lucius*.
- 16) der Barbe, *Cyprinus Barbus*.
- 17) der gemeine Karpfe, *C. Carpio*.
- 18) der Gründling, *C. Gobio*.
- 19) die Schleie, *C. Tinca*.
- 20) die Elste oder Alet, *C. Cephalus*.
- 21) die Ellritze, *C. Phoxinus*.

- 22) der Lauben, C. Leuciscus.
23) der Häßling, C. Dobula.
24) der Rothflosser, C. Rutilus.
25) der Ufeley, C. Alburnus.
26) der Bley oder Brachsmen, C. Brama, ist sehr häufig.
-

Die Sumpfs- und Schwimmvögel

des

Bodensee's und seiner Ufer.

(Benennet nach Maier's und Wolf's Taschenbuch der
deutschen Vogelkunde. II. Theil.)

Anmerkung. Die mit * bezeichneten besuchen diese Gegend nur höchst selten.

- Schwarzflügeliger Strandreuter, *Himantopus atropterus*.
Lerchengrauer Regenpfeifer, *Charadrius Oedicnemus*.
Goldregenpfeifer, *Charadrius auratus*.
Morinell-Pfeifer, *Charadrius morinellus*.
Halsband-Pfeifer, *Charadrius hiaticula*.
Kleiner Pfeifer, *Charadrius minor*.
Grauer Sonderling, *Arenaria Calidris*.