

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

**Der Bodensee nebst dem Rheinthal von St. Luziensteig
bis Rheinegg**

ein Handbuch für Reisende und Freunde der Natur, Geschichte und Poesie

Das Topographische, nebst den Gedichten enthaltend

Schwab, Gustav

Stuttgart, 1840

5. Die Flora

[urn:nbn:de:bsz:31-140732](#)

5. Die Flora

der Umgebungen des Bodensees.

Die Flora der Umgebungen des Bodensees* hat zwar im Allgemeinen viel Ähnlichkeit mit der Flora der übrigen in gleicher Höhe über dem Meere liegenden Gegenden des südwestlichen Deutschlands, das Klima nähert sich dem der mittleren Neckargegenden, die tiefenrnen Gegenden besitzen vielen Weinbau, der sich an den gegen Süden mehr geneigten Bergen bis 1650 — und hier und da selbst bis 1700 r. Schuh über das Meer erstreckt. Der Wasserreichtum mehrerer der tiefenrnen Gegenden, die Sumpf- und Torfmoore und die Nähe der Schweizergebirge veranlaßt jedoch ein Vorkommen verschiedener Pflanzen, welche in andern Gegenden des südwestlichen Deutschlands theils sehr selten sind, theils auch ganz fehlen.

Verzeichniß aller am Bodensee und um Hohentwiel vorkommenden Hauptpflanzen.

Boden see.

Galanthus nivalis L. März, April.

Leucojum vernum L. März, April (um Salmansweiler).

Tamus communis L. März, April.

Primula farinosa L. April, Mai.

Anemone hepatica L. April, Mai.

Eriphorum alpinum L. April bis Juni (Mündung der Schussen).

Carex alba Scop. April, Mai.

— *agastachys Erh.* April, Mai, Juni.

— *paradoxa Wld.* April bis Juni (bei Moos unweit Eristkirch).

Carex vesicaria. L. April bis Juni.

— *teretiuscula Schkr.* April bis Juli (Moos).

* Diese Notizen beruhen auf Beobachtungen vom seligen Prof. Dr. Schübler, Herrn Forstcandidate Rogg, den im Correspondenz-Blatt des landwirtschaftlichen Vereins zu Stuttgart mitgetheilten Nachrichten (Jahrgang 1825 und 1825) und Gmelins Flora Badensis. Das vollständige Verzeichniß verdanke ich der Güte des Herrn Professor Dr. Märtlin in Tübingen (1839).

- Linaria Cymbalaria D. April bis Oktober.
 Lathraea squamaria L. April, Mai.
 Erica herbacea L. April, Mai.
 Aronia rotundifolia Pers. April, Mai.
 Ribes alpinum L. April, Mai.
 Scirpus uniglumis L. Mai, Juni.
 Schoenus nigricans L. Mai bis Juli.
 Ophrys myodes L. Mai, Juni.
 Neottia nidus avis Rich. Mai, Juni.
 — ovata Rich. Mai, Juni.
 Cephalanthera pallens Rich. Mai, Juni.
 Cypripedium calceolus L. Mai, Juni.
 Hottotia palustris L. Mai, Juni.
 Pinguicula vulgaris L. Mai, Juni.
 Melittis Melissophyllum L. Mai bis Juli (Salmansweiler,
 Tuffingen).
 Menyanthes trifoliata L. Mai, Juni.
 Vaccinium uliginosum L. Mai, Juni.
 — Vitis idaea L. Mai, Juni.
 Globularia vulgaris L. Mai, Juni.
 Centaurea montana L. Mai, Juni.
 Scandix Pecten L. Mai, Juni.
 Ilex aquifolium L. Mai, Juni (Konstanz, Meersburg, Mainau).
 Staphilea pinnata L. Mai, Juni.
 Tetragonalobus siliquosa Roth. Mai, Juni.
 Rosa cinnamomea L. Mai, Juni.
 Saxifraga oppositifolia L. Mai, Juni (Hörnle zu Konstanz).
 Cochlearia coronopus L. Mai, Juni (Kirchberg).
 Anemone sylvestris L. Mai, Juni.
 Hippuris vulgaris L. Juni bis August (Konstanz).
 Acorus Calamus L. Juni, Juli.
 Scirpus maritimus L. Juni, Juli, August.
 Schoenus albus L. Juni bis August.
 Sagittaria Sagittaefolia L. Juni, Juli.
 Tofieldia calyculata Wld. Juni, Juli.
 Gymnadenia odoratissima Brown. Juni, Juli.
 Ophrys arachnites L. Juni, Juli.
 Cephalanthera rubra Rich. Juni, Juli.
 Epipactis latifolia Sch. Juni bis August.
 Utricularia intermedia Hagn. Juni, Juli (Sumpf bei Moos).

- Utricularia minor Hagn.* Juni, Juli (Sumpf bei Moos).
Circaeal alpina L. Juni, Juli (ebendaselbst).
Digitalis ochroleuca Jacq. Juni, Juli (Heiligenberg).
Veronica scutellata L. Juni, August.
Ajuga chamaepithys Schreb. Juni bis August.
Gentiana utriculosa L. Juni, Juli.
Polemonium caeruleum L. Juni, Juli (Friedrichshafen).
Andromeda polifolia L. Juni, Juli.
Pyrola uniflora L. Juni, Juli.
 — *secunda L.* Juni, Juli.
 — *minor L.* Juni, Juli.
Vaccinium oxycoccus L. Juni, Juli.
Oenanthe fistulosa L. Juni, Juli.
Trifolium rubens L. Juni, Juli.
Vicia dumetorum L. Juni, Juli.
Cytisus nigricans L. Juni, Juli.
Comarum palustre L. Juni, Juli.
Tamarix germanica L. Juni, Juli (Friedrichshafen).
Sedum dasypodium L. Juni, Juli (Perückenstöcklein).
Dianthus deltoides L. Juni bis August (Goldbach).
Cochlearia armoracia L. Juni, Juli (Salmansweiler).
Nymphaea alba L. Juni, Juli.
 — *lutea L.* Juni, Juli.
Aconitum neomontanum Rchb. Juni bis August.
Potamogeton lucens L. Juli, August (Friedrichshafen).
Cyperus fuscus L. Juli, August.
 — *flavescens L.* Juli, August.
Glyceria spectabilis Mert. und Koch. Jul, August.
Allium angulosum L. Juli, August.
 — *sibiricum L.* Juli, August.
 — *schoenoprasum L.* Juli, August (Maynau, Kirchberg).
Hydrocharis Morsus ranae L. Juli, August (bei Moos).
Iris sibirica L. Juli, August.
Goodyera repens Brown. Juli, August.
Epipactis palustris Sev. Juli, August.
Malaxis paludosa Sev. Juli, August (Erlkirch).
Liparis Loeschii Rchb. Juli, August (Friedrichshafen, Langenargen).
Utricularia vulgaris L. Juli, August (Kislegg).
Gratiola officinalis L. Juli, August (Bregenz).

- Salvia glutinosa L.* Juli bis September.
Teucrium Scordium L. Juli, August.
Galeopsis versicolor Cu. Juli bis September.
Dipsacus pilosus L. Juli, August.
Gnaphalium gallicum L. Juli, August.
Artemisia absinthium L. Juli, August.
 — *campestris L.* Juli, August.
Senecio paludosus L. Juli, August (zwischen Friedrichshafen und Langenargen).
Inula pulicaria L. Juli, August.
Caucalis grandiflora L. Juli, August.
Oenanthe Phellandrium Lam. Juli, August.
Cicuta virosa L. Juli, August.
Sedum villosum L. Juli, August (Villaflingen).
Herniaria glabra L. Juli bis September.
Saponaria vaccaria L. Juli, August.
Dianthus prolifer L. Juli, August (Goldbach).
 — *armaeria L.* Juli, August (Salmansweiler).
Althaea officinalis L. Juli, August.
Drosera rotundifolia L. Juli, August } (bei Konstanz gegen
 — *longifolia L.* Juli, August } den Untersee).
Ranunculus Lingua. Juli, August (Killiweyher).
Thalictrum Flavum. Juli, August (Friedrichshafen).
Andropogon Isochaeum L. August, September.
Spiranthes autumnalis Rich. August, September.
Stellera Passerina L. August, September.
Linaria Elatine Desf. August, September.
Orontium arvense Persoon. August, September.

Hohenwiel.

- Alyssum montanum L.* April bis Juni.
Draba aizoides Wld. April, Mai.
Aronia rotundifolia Pers. April, Mai.
Mespilus Cotoneaster L. April, Mai.
Saxifraga tridactylites L. April, Mai.
Veronica Buxbaumii Tex. April, Mai.
Höracium auricula.
 — *β uniflora Hay.* Mai bis Juli.
Oxytropis pilosa DC. Mai bis Juli.
Dianthus caesius Sm. Mai, Juni.

- Erysimum crepidifolium* Rchb. Mai, Juni.
Potentilla argentea L. Mai bis August.
Daphne Cneorum L. Mai, Juni.
Valeriana tripteris L. Mai, Juni.
Lactuca perennis L. Juni, Juli.
Tragopogon major L. Juni, Juli.
Caucalis latifolia L. Juni, Juli.
Lepidium latifolium L. Juni, Juli.
Linum tenuifolium L. Juni, Juli.
Saxifraga aizoon L. Juni, Juli.
Sedum dasypodium. Juni, Juli.
Artemisia absinthium L. Juli, August.
Lactuca scariola L. Juli, August.
Dianthus prolifer L. Juli bis September.
Hyssopus officinalis L. Juli, August.
Panicum crus Galli L. Juli, August.
Sedum reflexum L. Juli, August.
Veronica spicata L. Juli, August.
Chondrilla juncea L. August, September.
Chrysocoma Linosyris L. August, September.
Andropogon Ischoemum L. August, September.
Stellera passerina L. August, September.

Die Ufer des Bodensees sind an vielen Stellen mit Schutt, Sand und Geröllern der verschiedensten Gebirgsarten der Schweiz oft in großen Blöcken bedeckt, nur an Stellen, welche gegen das Anschlagen der Wellen mehr geschützt sind, konnte die Vegetation festen Fuß gewinnen, nicht selten sind die Ufer auch völlig angebaut. Auf dem See selbst schwimmt hier und da in Menge, namentlich zwischen Langenargen und Friedrichshafen das *Potamogeton perfoliatum* selbst an Stellen, welche 6 bis 8 Schuh tief sind.

Die Schweizerufer des Bodensees sind größtentheils angebaut und scheinen daher dem Botaniker weniger Ausbeute zu gewähren.