

**Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Pavli Aeginatae Praecepta Salvbria**

**Paulus <Aegineta>**

**Argentorati, 1511**

Pauli eginetae praecepta salubria Guilielmo copo basileensi interprete

[urn:nbn:de:bsz:31-271693](#)

Pau. Eginæ.

Pauli Eginetæ præcepta salubria Guilielmo  
Copo Basileensi interprete,

Quibus affectibus mulieres grauidæ infestent.  
& qua victus rōne educandæ sint. Cap.I.



VONIAM MULIERES  
grauidæ, his fere molestan-  
tur casibus, crebra vomitio-  
ne, sputo, cordis dolore, fa-  
stido, haud ab re fuerit, p-  
sidia, quibus eis succurrat,  
præscribere. Itaq; deambu-  
lationes, cibi non admodū  
dulces, vīna rufa, odora, p-  
cipue qnquēnia, & modica  
potatio, eis cōueniūt. Hec  
em̄ oīa vomitionem arcere consueuerunt. Medicamen-  
torum vero vīm obtinent, polygonum ex aqua coctū  
& epotum, anetum, pontica radix, quę ab incolis Rha-  
vocatur. Hec & ante, & post cibum adhibenda sunt;  
Mane vero præcordijs cataplasma imponere oportet  
ex cenāthe, balaustio, cytiso, myrrha, gummi, fœnicu-  
li semine. Nec refert vt cunq; miscere volueris, aut cū  
vīno veteri & palmulis, aut solidum, siccumq; præcor-  
dijs adhibere. Atq; id magnifice iuuat eas, quæ terrā  
edere cupiunt, ut in ea affectione quam KITTAV id est  
picam vocant, quæ circa tertium gestationis mensem  
præcipue infestat, quod non possit tum fœtus, utpote  
imbecillus, quicquid ad vterum alimenti ratione fer-  
tur, absumere. quapropter variae in stomacho redundan-  
tiae accumulantur, vnde & varia, & absurdæ appes-

B

Præcept.

tunt, ut carbones extintos, cretam cimoliam, & alia p  
multa, eam ob causam ita affectum hunc nominaue  
runt, aut ab animalis varietate, aut quod s̄epe numero  
hoc malo pica laborat. Cibi appetentiā inducūt, la  
bor, & longior peregrinatio. Si vero mulier grauida de  
licatus fuerit educata, inutiliter subibit repētinas mo  
tiones, fastidientē quoq; licet acres potiōes, & p̄cipue  
sinapi degustare. Pedum tumores magnifice discu  
tit anthyllis in aceto macerata, & brassicæ latoris folia  
atq; cimolia creta ex aceto illita, item alumē ex aceto,  
medica quoq; mala, quæ & citrea dicunt, in aqua co  
cta, utiliter pedibus adhibetur.

De Nutrice. Cap.II.

Ligenda est nutrix, quæ nullo penitus morbo  
e laboret, & neq; grādis admodū natu, neq; val  
de iuuenis, ita vt iunior qdem quinq; & virgin  
ti annis minor non sit, grandior vero qnq; & triginta  
nō excedat. Sit p̄cero pectore, mammis, papillæ neq;  
nimia longitudine, p̄mineant, neq; curuitate auertant,  
reliquo vero corpore neq; obesa n̄imis, neq; macie ad  
modū extenuata. Id vero magnope conduceat infanti,  
si nō ita pridē nutrita peperit, atq; maxime si masculū,  
abstineat ab arefaciētibus supra modū, a salsa, acutis,  
a stringētibus, acidis, amaris, valde calorificis, suaue  
admodū olentibus, excellēter odoratis, bellarijs, cōdīs  
mētis, alijsq; acrībus, ac venerē haud quaq; admittat.  
Exerceat manus & humeros, texendo, & in vlnis cir  
cunferendo, ferēdus aut in vlnis infans est trimestris  
& quadrimestris.

De lacte nutritis. Cap.III.

Pau. Egine.

Primum lac esse cognosces, si mediocre fuerit  
in crassitudine, multitudine, colore, odore, gustu.  
Vtile vero illud est, quod in vngue pollicis  
instillatur, ad splendorē, inclinato vngue, videt neccepit  
leriter, neque tardē defluere. Atque sic quoque pbandū est.  
Lac emulctū in iūce in vas vitreū modicū, deinde dige  
tis agitatū, sine donec cōcrescat, si enim plus videris seri  
que casei, inutile, si vero cōtra, coctu difficile erit. Optimū  
vero fuerit, quod modice vtruncque habet.

Quo modo lactis malicia corrigaſ. Cap. IIII.

Actis vicia ſic corrigenda ſunt, ſi crassius fue  
rit, vomitu pituita ejiciēda eſt. id qd' cū oximel  
le optime pſificit, eaq; laboribus p̄cipue aī cibū  
extenuāda eſt. ad quā rem cōmodiflma fuerint, oris  
ganū, hysopū, faturefa, scandix, thymus, paulū radicu  
læ, ſalfamentū vetus iūcū oxymelle. Si vero nimis acre, te  
nueq; appareat, tū a multis laboribus abſtinere, & ali  
nutricem ex ſorbitōibus, & carnibus ſuillis oportet,  
ſapam bibere & vinū dulce, peccitus & mammaſ frica  
re. nō nullis cucurbitula adhibita, auxilio fuit. Medica  
mēta aut̄ quae lac generant, & ſi ſcio nō nihil confeſſe,  
allidue tñ eis vti nō iubeo. nam nimis violēter eliquāt.  
ſunt aut̄ ea, ſemen & radix ſoeniculi, q̄ aqua calida ma  
cerata exhibenda ſunt.

Educatiō pueri. Cap. V.

Rimus cibus iamiam genito puello exhiben  
dus, eſt mel. deinde lac dādū eſt, bis in die, aut  
ter ad ſummū. Quū vero promptus ad accipien  
dū videbit, nec defit concoquēdi ſpes, tum cibos non  
replētes dare cōuenit, qñ quidē imprudēter repletus,  
ſomnolētior, humidiorq; atque ventre quoque tumido, in

B ij

Præcept.

flatoꝝ euradit, & vrina aquosa reddit. quibus ego tum  
nihil dandū censeo. At satis fuerit duobus annis lacte  
nutriri, deinde solidiores cibos accipere.

Ad exanthemata puer exorta. Cap. VI.

Væ circa pueri cutem florent, in primis qdem  
q æ quo animo tolerare oportet, quū vero deflo-  
ruerūt tum balneis curare, adiūcio myrti aut  
lentisci folia, aut rosas, rosaceo qꝝ aut lentiscino oleo  
vtendū. mox caratū cum cerusa adhībendū, atq; lenis-  
ter ex nitris abstergere oportet. Nam fortiora præsidia  
non feret. Ratio victus sic cōmodissime instituitur, ut  
neq; nimiū impleat, neq; multa inedia vexetur. Porro  
si pueri alius astricta fuerit, mel cibo adiectum dabis.  
quod si ne sic quidem deīcīt, resinam terebinthinam,  
q ciceris quantitatē æquet, adiūcies. Ad solutam vero  
aluum, miliū qꝝ maxime confert.

De tussi & de stillatōe pueri. Cap. VII.

I vel tussi vel de stillatiōe puer vexat. mellitis  
f mos (ita em nominant eligmata ex melle) sus-  
 mere debet. abluendū caput est multa calida  
aqua. mox multo melle linere, deinde lingua dīgito le-  
niter comprimere oportet, ita em magnam pituitā co-  
piam euomet.

De pruritu. Cap. VIII.

Ruritus si puerum infestat, fomentis curabit  
p atq; multa vnciōe ex oleo crudo, cum exigua  
cera eliquato.

De dentium ortu. Cap. IX.

Eptimo fere mense dentiunt, tum gingivarū,  
f maxillarum, & tendinū inflammatioes eis acce-

Pau. Egine;

Cunt, nonnunq; neruorum quoq; distentōes, quō tē  
pore nihil puerο dandum quod mādere oporteat. Gi-  
giuras a balneo assidue dīgito contrectare, & ex galli-  
naceo ad īpē, & leporis cerebello molliores reddere cō-  
uenit. Prodeuntibus vero iam dentib; teneras, mun-  
dasq; lanas, ceruīci, capiti, & maxillis adhibere, atque  
oleo calido, dulciq; fouere, id quod auribus quoq; ins-  
tillādum est. Porro puellum tum vberius alere opos-  
tet, & aqua calida lauare. Quod si alui quoq; fluor  
molestauerit, tentandum eam epithematis, quæ ma-  
xime ventrem supprimunt, sistere, inspergentes lanq;  
aut cuminū, aut anetum, aut apium, quibus rosarū  
quoq; semen recte adīcitur, & in totum calefacere &  
exiccare expedit. Sivero nihil deīscit alius, melle  
ad glandis formā redacto leniter irritetur, prodest eti-  
am calamintha trīta, atq; cum melle illita. Neruorū  
distentione laborantē puerum, magnifice iurabis, si  
heliotropium ex aqua coquens, īpm laueris, eoq; mas-  
gis, si irino oleo, aut cyprino, aut sycionio vxeris, atq;  
in totū calefeceris. Exortis iam dentibus, si dīgitos  
mordet, vulneratq; operā precium fuerit radicem īris-  
dis elixam, ac modice aridam tenere. Hæc enim ulceri-  
bus quoq; auxiliatur, quemadmodū & butyrum cum  
melle illitum. Gingiuarum pruritū, veteris salsa  
menti caro sedat.

De Aphtha. Cap. X.

Lcus quoq; puerο accidit, quod Aphtha vo-  
catur, modo subalbidum, modo subruberum,  
nonnunq; veluti crusta nigrum. vt vero om̄is-  
um pessimum, ita maxime letale, nigrū est. Huic opē

B ij

Præcep.

affert iris, vel cum melle, vel sicca etiam adhibita. Item  
rosarum folia contusa, flos rosarū, crocus, paulū mir-  
rhæ, galla, thus, cortex thuris, vel simul, vel singula-  
tim melle excepta. Præterea mulsum, & mali punici  
dulcis succus.

Ad femorum intertrigines. Cap.XI.

D femorum intertrigines, myrtum aridam, cy-  
a pirum, rosas, insperge.

Ad humectatōes aurium. Cap.XII.

Vrium humectationes siccabimus, si lanam  
a ex alumine adhibuerimus, aut vinum mul-  
sum, aut vinum vetus, aut crocum ex vino tri-  
tum instillauerimus.

De Sirias. Cap.XIII.

Sirias est partium circa cerebrum & eius mē-  
branas, inflammatio. Hanc sequitur & syncis-  
pitis, & oculorum cauitas, cum pallore & aris-  
ditate corporis. Eius remedium est, oui rubrum cum  
rosaceo, caluariae quidem pigmenti specie impositū,  
sed creberrime mutatum. Aliud ad Siriasim. Helio-  
tropij (quod Scorpions vocant) folia, cucurbitæ rasu-  
ram, cucumeris atq; peponum adiacentem carnī pelli-  
culam, solanij hortensis cū rosaceo, succū, caluarie ad-  
hibere oportet.

Ratio victus infantium, atq; reliqua  
rum deinceps ætatum, ad vigoris  
vscq; inclinatōem Ca.XLIII.

q Vum ablactati fuerint infantes, suo desiderio  
& hilaritati dimittendi sunt, ac modice eis cō-

Pau.Egine;

cedantur & exercitationes & leuisa alimenta. Quum sextum septimumve annum attigerint,tum & pueros & puellas literatoribus tradere oportet,benignis quidem,humanisq; qui cū gratia & animi securitate doceant,quandoquidem animi relaxatio,ad vegetā corporis educatōnem plurimum confert. Duodecimo iam exacto anno,ad grammaticosq; ,rhetoresq; mittendi,atq; ad corporis exercitationes cogendi sunt. A decimo quarto ad primum & vigesimū annum,mathematicae,sapientiae studio,incubant,& ad fortiores exercitationes pro corporis robore ducantur,ut & corpore & animo laborantes,a libidinīs impetu cohíbeantur. Quum ad ætatis suæ vigorem peruererint perfecta educatio,tum animi,tum corporis,eis conuenit,qua de re nullum exercitationis genus abhorreat,præsertim quo quisq; uti solitus est.Cibosq; pleniore,& qui bonum præbeat alimentū vtantur. Inclinante iam vigore,educatio moderatior,tum animi,tum corporis iuuat.Exercitationes vero qualescumq; fuerint,pro inclinatōis rōne,remittendæ sunt.Necq; plenior tū cibus exhibendus est,vtpote habitu eorum frigescere iam incipiente.

De fricatione præparatiua. Cap.XV.

Nte exercitationem corpus modice calfacies a mus,linteo fricantes.deinde nudis manibus ex oleo perfricabimus,donec calescat satis,ac transmutetur corpus,atq; florido rubore suborto,ad habitum decentem pducatur.

De Exercitatione. Cap.XVI.

B iiiij

**Præcep.**

Xercitatio est motus vehemens. Vehemens  
tiae terminus est anhelitus in spissitudinem p,  
mutatio. Exercitationes, instrumentales par-  
tes præparant, ut & affectōnibus potenter resistant, &  
ad actiones reddantur fortiores. Præterea vt alimenta  
validius attrahant, promptius consiciāt, & vberius de-  
inde reficiātur, propter inductum a forti motu pulmo-  
nis calorē. Itaq; quum alimentū melius digeratur per  
corpus, si neq; plenitudo, neq; cruditas, tum excremē-  
torum, tum humorum, contineatur vel in ventriculo,  
vel intestinis (periculum enim est, ne prius q; probe cō-  
coquantur, ad vniuersas corporis partes trahantur) cō-  
stat ante alimentorum susceptōem aggrediendas esse  
**exercitationes.** Temporis autem oportunitas, ex vri-  
narum colore deprehendit. si quidem aquosa cruda  
est, significatq; iam redditum ex ventriculo humorē.  
Rufa & biliosa, iam dūdum perfectam concoctiōem  
notat. Quæ mediocriter pallet, coctionis quæ adhuc  
fit, principium significat. Hoc igit tempore aggrediē-  
di eę sunt exercitationes, si prius vesicæ, ventrisq; one-  
ra deſcendantur.

**De exercitationū generib; Cap. XVII.**

Mnibus exercitationib; cōmune est, quod  
o animantia ex seipsis calorem auctiōrem effici-  
unt. Proprium vero est quod per singula gene-  
ra discernitur. Vehemens enim, id est violenta ex-  
ercitatio neruos, lacertosq; robustiores reddit, huius-  
modi sunt, fodere, magna onera attollere, siue in eodē  
loco quis maneat, siue paulum progrediatur. item si  
quis, quantū maxime potest, deambulet. Huius quo-

Pau.Egine

q̄ generis sunt, apprehensum manibus funem scādē, re, atq; alia complura. Veloceſ exercitatōneſ ſine robore, & ſine violentia ſunt, vt cursus, vt vmbraſtilis pugna, & acrochirismi, id eſt quae ſummis manibus apprehēſiſ fiunt certamina, & vel folle, vel parua ſpheſra ludere. Eſt vbi componitūr exercitatio ex robusta & veloci, vt ſi quis robustis exercitatōnibus vehemēter innixus, veloceſ quoq; motiones addiderit. Præterea per exercitationes quasdam, alijs lumbi potius q̄ manus, aut cruralaborat, alijs ſpina vel thorax, aut pulmo. Tam diu vero exercitationi indulgendū eſt, quo ad in tumorem corpus attollitur, & rubescit, & motus firmi, & equabiles & faciles ſunt, atq; ſudor vaporī vide tur commiscerit. Quiescēdū autem tum primum, quū ex prædictis aliquod mutabitur, veluti ſi detumescit corpus, ſi coloris pulchritudo mutatur, ſi motus remittitur, tum illico quiescere oportet. Sudoris quoq; ſi vel quantitas vel qualitas mutata eſt, vt ſi minor, vel frigidior eſt, ab exercitatione deſiſtere, mox circūfuso oleo fouere, ac deinde, vt ludimagiſtri ſolent, recreatoriā adhibere frictionē congruit.

De generib; frictionis. Cap.XVIII.

Rictionum, vehemens quidem, durum, lenis f vero, molle corpus reddit. quapropter ea quae temperato corpore laxiora ſunt, vehementer, quae vero magis compacta, leniter fricanda ſunt. At ſi quis mediocriter corpore, neq; leniter, neq; vehementer, fricari debet, ſed quoad fieri poterit, vtrumq; vitaſ re excessum. Porro multa eademq; vehemens frictio, corporis tumorem demittit, contra lenis & nō ita mul-

B. v

Præcep;

ta in tumorem attollit. Igitur tres frictionis differentiae  
a quantitate sumptae, tribus a qualitate acceptis com-  
plexæ, nouem coniugationes efficient, vt in subscripta  
figura videre est. Quid vna in quantitate, vt multa, tri-  
bus scdm qualitatē connexa, vehementi dico, & leni,  
& mediocri in vehemētia, tres pducit differētias. Rur-  
sus, pauca, iisdem tribus, tres alias. Quæ vero in qual-  
itate moderata est, illis iisdem tribus cōiugata, tres alio-  
as constituit, vti subscriptū est.

	Quantitas.		Qualitas.
I	Multa		Vehemens
II	Multa	et	Lenis
III	Multa		Mediocris
III.	Pauca		Vehemens
V	Pauca	et	Lenis
VI	Pauca		Mediocris
VII.	Mediocris		Vehemens
VIII	Mediocris	et	Lenis
IX	Mediocris		Mediocris

De Exclamatione.

Cap. XIX.

Ihil ad sanitatis tutelam conductit in exclama-  
tionibus concinna, aptaq; modulatio, grauios-  
rum vero sonorū frager ut maxime utilis est.  
Ita summo studio vsui accommodandus. Siquidē mul-  
tus aer hoc modo in corpus q; inspiratiōem attractus,  
& thoracem, & ventriculum, vniuersiq; corporis mea-  
tus dilatat, patefacitq; quod inter legendū habundan-  
tia humiditatū excernit, per sudorem quidem, si vali-  
dores, per occultam vero ex vniuersa mole euaporati-  
onem, si fuerint mitiores, facta enim attenuatiōe, mul-

Pau.Egine

tae superfluitates, ut mucci, sputa, pituita, screando ex cernuntur, expendunturque. Igitur quod præstantius re medium, ihs qui ob frigiditatem calfactione indigent, afferemus, quam respirandi functōem? Itaque saepe numero legere oportet, atque remisso vniuerso corpore, suffici carne, arteriam, cæterosque spirandi meatus in aptā raritatem dīducendo, per reliquas vocis grauitates modulari, id vero neque temere, neque inconsiderate facere, sed tum demum ad vocis exercitatōem accedere, si neque viciōsis, corruptisque humoribus refertum sit corpus neque magnae manifestaeque in stomacho apparent cruditates, ne per vniuersum corpus corrupti vapores impēs digerantur.

De lassitudine ob exercitatōem. Ca.XX.

Lcerosa lassitudo excrementorum tenuiū, acrī  
vumque plenitudine, constat. Tensiua autem nullum memoratu dignum excremētum corporibus infundī declarat, sed in musculis & nervis affectio quædam sit, per quam tendi videntur. Inflatiua vero, per quam videlicet partes veluti fractas, tumidasque sentimus, tunc potissimum accidere solet, quum musculi supra modum calfacti, auulserint ad se se ex circumfusis redundantijs quippiam. Est & alia affectio, quarta videlicet, quum musculi ultra quam expedit siccantur, ita vt si nudentur corpora, & squalida & collapsa videantur, & ad motiones pigras. Igitur ulcerosam fatigationem sanabis, excretā secernens, frictione multa, lenique liberaliter oleū infundēdo, quod nullā astringendi vim habeat. Scopus vero sanatōis intensiua est laxitas. Igitur tensum la-

Præcep:

xabis, frictione pauca simul & leni, ex oleo dulci trans  
quillitate & requie, balneis temperatis, & longa in aqua  
calidis mora. qua de re plurimū auxiliū feres, si bis aut  
ter sic laborantē laueris. Tertia lassitudo quam inflā  
matiuam diximus, tria habet curationis proposita, ex  
crementi vacuatōem, tensi remissionem, & ardoris re-  
frigerium. Itaq; multum oleum tepidum, frictiones le-  
nissimæ, atq; in aquis tēperatis multa, diuturnaq; mo-  
ra, huiusmodi fatigations sanat. item trāquillitas, ma-  
xime multa & assidua. Quarta affectio, prima quis-  
dem die, nulla eorum quæ diximus, mutatione indis-  
get, eo dumtaxat excepto, q; aqua non sit calida, sed q  
dēfare paulatim possit. Postero die recreatoria eget ex-  
ercitatōe. Exiliant vero illīco ex balneis p̄sertim quā  
frigidam aquā subierint, egressi aut̄ cibi subinde refi-  
ciantur.

De cute constypata

Cap. XXI.

Onstypatio fit aut ex obstructione, aut meatu-  
um densitate. Obstructionem quidem, crudo-  
rum & incoctorum humorū multitudo, crassi-  
tudoq; efficiunt. densitatē vero, vel frigus, vel astrin-  
gētia, vel exiccantia. Id aut̄ facile discerni ab lati vesti-  
bus, ex cutis albicante pallore, duricie densitate, & qd  
ab exercitatōe quis nō facile calefacit. Huius affectōis  
medela, calefactio est. ideoq; exercitationibus vtendū  
est, & balneis calidioribus. At in frigida natatōe, nō lo-  
ga sit mora, & neq; aq; ipa sit admodū frigida. Antea  
yo q; induant, vngēdi sunt ex aliq; modice calorifico,  
vt oleo dulci tenui. Porro cutis densitatē efficaciter sa-  
nat anethinum oleum, maxime si viride fuerit anethū,  
item oleū ex Populo nigra.

Pau.Egine.

De spontaneis laboribus. Cap.XXII.

Voniam ulcerosa lassitudo fit ob acrium ex  
cremētoꝝ viciū, id si paucum fuerit, sat erit  
recreatoria vti exercitatōe. Si vero maius, alti  
usq; talem neq; exercitari, neq; villo proſus modo mo  
ueri ſinemus, ſed tranquillitatem, ſomnūq; pſribentes,  
in abſtinētia tota die ſeruabimus. Mox ad vſperā vn  
gentes, balneoq; ex aqua modice calida lauantes, cibis  
exiguū & boni ſucci forbendū dabimus. Sed neq; vi  
nū ei subtrahemus, vtpote quod ſemicoclos (ſi quicq;  
aliud) concoq; humores. Quod ſi p ea quae diximus,  
malū quieuerit, ad priorē consuetudinē prone reducē  
dus eſt homo. Si vero poſtero quoq; die pmanet, vaſ  
lidiori pſidio occurrendū eſt malo. atq; ſi robustæ fue  
rint vires, duor̄ alterꝝ, aut ſanguinē mittere, aut pur  
gare cōuenit, ſed vtrum magis faciendū ſit, diſcernere  
oportet, at ſi imbecilles, ſanguis nequaq; mittēdus eſt,  
ſed moderate purgandū eſt. At vbi crudorū humorū  
multitudo moleſtauerit, tum neq; ſanguinē mittere,  
neq; purgare, neq; exercitari expedit, ac neq; moueri,  
neq; lauari. Seruandi itaq; tales in omni tranquillitate  
ſunt. Atq; edulia, & potiones, & medicamenta, que ex  
tenuandi, diuidendiꝝ vīm habeant, citra calefactōem  
manifestam exhibeant. Igit̄ pro cibo oxymel, ptisanæ  
paulū, nō nunq; mulsum quoq; dabimus. Quoniā ve  
ro omnibus hīs præcordia ſuſpedunt, inflanturq; (eo  
quod facile vētosum fit quicquid eis exhibetur) haud  
ab re fuerit cum alimentoſ piper quoq; miſcere. Satius  
etiam num fuerit diopſpolítico medicamento vti, atq; eo  
qd ex tribus piperibꝫ cōſtat. oxymelle ḡo haud aliud  
vilius eſt. Potōnis loco, apomelle (ſic em græci ex ab

Præcept.

Iutis ex aqua fauis, cremorem vocant) vtantur, præcipue acido, & vinis subacelcentibus. Cibis vero citra calfactōem attenuantibus, cuiusmodi sunt cappares, si vel ex oxymelle, vel ex aceto & oleo sumant. Tensura lassitudo, quam non induxit exercitatio, multitus dinem solidas partes extendentē, declarat. At constat si multis affuerit sanguis, venam separe, aut malleolum incidere, saluberrimū esse p̄sidit. Inflammatio q̄ sua sponte suguenit fatigatio, ne paucarē qdem horas rum dilatōem sustinet, nedum duorē, triumve dierē. nisi em̄ illico sanguinē detraxeris, febrim inducit p̄tinus vehementissimā. Satius aut̄ fuerit, nisi quid obstat his eadē die auferre. Primū qdem ita detrahemus, ut animi defectōem non incurrat homo. In secūda vero missione, ne animi qdem defectio timēda est. Quod si q̄s ita affectus sanguinē nō miserit, is nisi optima fortuna fauerit, haud quaq̄ seruabitur.

De vīctu senum.

Cap.XXX.

Enectus, frigida qdem est & sicca, corrigit̄ yō humectantibus, calfacentibusq; Igit̄ fricandi sunt, sed citra fatigatōem, ac infirmioribus tercibum dabimus. circa tertiā qdem horā, paulū panis cum attico melle. deinde ad septimā horam, factis fricationibus, & exercitatōibus p̄ senectutis rōne, ac adhibito lauacro, primū qdē quae aluū moueant, tum vel pisces, vel aues exhibebimus. In cena vero, ea q̄ optimos humores gignant, & q̄ non facile corrumpantur offerenda sunt. Neq; phibeo quomínus vinis ex melle conditis vtant̄. p̄sertim si quis senex, aut in renibus calculum, aut podagram futurā timet, ac petroselinon quoq; vino tum adiiciendū est. Quod si ob genitā in

Pau.Egine.

ventre pituitā, cogamur eligere quē eam diuidant, trā  
seundū subinde est ad humectantē victus rōnem, ex/  
hibitis ante alia alimenta fīcis maturis, atq; p hyemē  
caricis, nīsi in dextra p̄cordior; parte accidentis cuius/  
piam sensus obſtiterit. Cæterum quum in ſenili corpo  
re, & pituita, & ſerosa excremēta cumulenſ, neceſſe eſt  
quodidie & vrinā ciere, & absorpto ante cibos oleo, ali  
uum ſoluere. At conſtat q̄ omnia olera ante cibos ex  
oleo & garo edenda ſunt, oliuas quoq; ex muria, atq;  
pruna Damascena capere debent. Porro fortiori alii  
aſtrictioni p̄ſidium afferunt & mercurialis, & cnecus,  
atq; terebinthina resīna ponticæ nucis magnitudine.  
Interdū clyſter ex oleo ſup̄ſſam aluum commodiſſi  
me ſoluit.

De rugato, contractoq; corpe Ca.XXIII.

Vtis erugatōem facit erui farina viti albæ ad/  
iecta. Aliud, ſmegma continēter purgans.  
ſicus pingues cum bryonia cōtritas, & farinā  
erui contuſam, atq; ſepiæ teſtam, exīguo melle iſtilla  
to excipere oportet.

Vt ſuauis ſit corporis odor. Cap.XXV.

T ſuauem corpus odorem reddat. Cypariffi  
comamaridā contundens, ant piceę corticem,  
vnguento miſce. Necq; oblīuiscatur quis, maſ  
ne poſtq; fuerit iudutus, paulū aut caſiæ, aut ſauinæ  
degustare.

Ad habitū calefaciendū. Cap.XXVI.

D habitum vero calefaciendū, intrito calorifi  
co vtendū eſt, quod habeat calamínthā, amas  
racum, hysopum, lauri baccas, rorem marinū,

Præcept.

Sapidem pyriten, salem, fecem vini vstam, nitrum, pu-  
micem pro rōne singulorē. Item parum sinapios, &  
vul e timiniae, quam graci staphidagriā nominant,  
& grani gnidiā. A lauacro vero vtae calido acopo, bis-  
batq; vinum fuluum vetus, & potōem ex vino mulso,  
pipere, ruta, & similibus.

Ad coloris vitium.

Cap. XXVII.

Orporis viciatum colorem emendat vita ius-  
cunda, mansuetacq; cibis boni succi, cui radī-  
culam, porrūq; cū viridi cicere misce bimus.

Ac coloris quoq; pulchritudinē efficit, mali punici dul-  
cis succus absorptus. neq; ab re fuerit, oleū adiūcere, eli-  
xa in ipa bryoniae radice. Hec em̄ p̄fidia corpus politū  
reddūt. Scissuris illinēda sunt glutinātia, quae ex ab-  
stergentiū aliquo constent ut farina, itē narcisci & bry-  
onyæ radix atq; amarē amygdalæ tum fructus, tū ras-  
dix ex aqua cocta, haud inutiliter in balneis adhibent.

Ad liuores & fuscedines.

Cap. XXVIII.

Liuore tutos reddemus senes, si pellem. quo  
minus afficiatur, spissam, & habitū multo ca-  
lidiorem fecerimus. quod vt facilius assequa-  
mur, salem balneis adiūcere oportet. Liuidas vero par-  
tes, submersa spongia in elixæ brassicæ atq; absinthiū  
decocto souebimus.

Dentiū custodia.

Cap. XXIX.

Entes hoc modo incorrupti seruabunt. In pri-  
mū vitare oportet ciborē corruptōem, assidu-  
um vomitū, & cibos dentibus inutiles, vt fis-  
cos aridas, mel coctum, palmulas, & eos qui difficul-  
ter terunt, quicq; glutinosi sunt, atq; qui fractu adeo

Pau. Egine:

difficiles sunt, ut detes moueant, & qui ea doloris spe-  
cie dentes afficiunt, quā Hæmodiā græci vocat, nos tor-  
pedinem, haud temere appellauerimus. item frigidos  
& omnes putres. Nequaquam negligas post cænā dē-  
tes purgare.

Vt facile quis audiat.

Cap. XXX.

Vdiendi facilitatē p̄stat, in primis purgare me  
atū a sordibus. Quę si diutius retentae fuerint,  
linamentū madens ex dropaco (ita ēm̄ vocant  
genus vnguenti ex pice) in iþum demitte, atq̄ expre-  
sum extrahe. simul ēm̄ & meatus purgatur, & audiens  
dī vis restituīt. deinde erui magnitudine, eip̄ diem ad-  
hibita, obtura meatū. Postero die extrahens, vnge q̄ts  
tidie ex oleo amygdalino, aut nardino, aut chamaeme-  
lino, aut adipe gallinaceo, aut exiguo felle bubulo.  
Rursus, tractu tempis, ex fiscis cum sinapi tritis facto  
penicillo, adhibe horis duab̄, quo subinde extracto,  
oleū qđ in succo asphodeli radicis ferbuerit, infunde.

Ad caligatōem oculorū.

Cap. XXXI.

E caligatione oculi infestent, iþis in aqua frigi-  
da demersis modice suspicere oportet, quādo  
qđem videndi robur ita intendit. necq̄ s̄o cres-  
bra lectione fatigandi sunt, vitandū est vinū crassum  
& dulce, item cibi q̄ non facile ad ventriculū descēdūt,  
& qui concoctu difficiles sunt, atq̄ ex q̄bus humores  
lenti, crassisq; pueniunt. similiter eruca, porrus, & quæ  
cunq; acrem vaporem sursum mittunt. Nocet etiā, si  
diuturnus fuerit supinus decubitus, frigus, ventus ob-  
uiam veniens, fumus, puluis. Mirifice s̄o pdest, si per  
petuo mense quotidie huiuscemodi aqua oculis instil-  
letur, quæ qđem sic p̄paranda est. In vas fistile extrin-

C

Præcept.

secus piē illitū, fœniculū virentē, aquamq; pluuialem  
inijce, deinde extracto fœniculo, qd reliquū ē seruato.

De facietate. Cap. XXXII.

Axiū in cibatōe satietatis peccatū est. Nam  
m et si ventriculus probe concogt, venæ tamē ni-

mis repletæ, laborat, dilatant, rumpunt, obtu-  
rant, & flatu implet, atq; in totū, pessimos ex facietas  
et morbos constare, in confessō est. Porro vetriculi ple-  
nitudo, et si omnino tolerabiliōr est ea quæ venis acci-  
dit, eo q; non nunq; vel vomitu, vel deiectōe, id qd re-  
dūdat excernit, tamē ne hæc qdem admittēda est. At  
tamē si nimis ingessit aliq; illico vomere debet. Si em-  
pbe concoxerit, venæ plenitudinis periculū non euā-  
dent. maxime si q; iugiter p; intemperatiā se ingur-  
gitans, nulla vtat vacuatione, itaq; vomere debet, pri-  
usq; cibi corrumpant. Cui vero vomere non licet, solu-  
ta aliis plerumq; opem tulit. at si ne hanc qdem mo-  
riere concessum est, diutius dormire, & aquam calidā  
bibere debet, quum vero iam pbe concoxerit, maxi-  
me si qd excreuerit, tum & lauacro, & balneo vtat, &  
falsamentū edat, atq; potōem dilutam sumat. At si ne  
q; deiecit, neq; mature cōcoxit, ac totum quoq; corpus  
graue, & ad motiones ineptū, atq; somnolentū fuerit,  
mens etiam pter rōem pigrescat, venare plenitudo si-  
gnificat. Quibus vero pter hæc fatigatio quoq; accē-  
serit, eos quieti pmittere, donec ventriculus cōcoquat  
satius est, atq; sic deinde vacuare.

De ebrietate. Cap. XXXIII.

Brietate detentis, repentinus vomitus p; senta-  
neum auxiliū affert. Oportet yō abunde aquā  
bibere, & mulsum, atq; sic vomere, vt & plu-

Pau. Eginē.

ma p̄ficiant, & vellicatio fiat obtusior. Post vomitū ve  
to, & leniter ambulent, & vbertim vngan̄, dein reliq  
tempe, tam diu quiescant, sub tegmine dormientes, q  
ad soluatur temulentia.

Quibus alimēta corrūpunt. Cap. XXXIII.

Orruptis in vētriculo cibi, hi q̄ excremēta cor  
rupta deīciūt, rectissima via ad sanitatē tēdūt.  
Quibus vero nihil subducit, ex his q̄ leniter al  
lum mouent, irritandi sunt. Atq̄ sic affectis, vomitus  
ante cibū cōuenit, vel ex vini, vel musti potatōe. Nihil  
etiam vel fumosum, vel graue olens, exhibēdū est, aut  
in totū nullus cibus q̄ facile corrumpat, sed alimenta  
boni succi eligere oportet. Ideoq̄ p̄ tēporē interualla,  
moderate ventris purgationes, ex leuibus medicamē  
tis, huiuscemodi affectōe laboratibus cōferunt.

De venere.

Cap. XXXV.

C neq; venus vtilitate caret. vtpote q̄ plenitu  
dinē vacuat, corpus auctū, leue, virile, reddit.  
Et qđ ad animū ptinet, rōis vim impeditā sol  
uit, īgētes iras remittit, īcīrco melācholico aptissimū  
remediū est, si quicq; aliud. Reducit aut̄ ad modestiā,  
vel alio quoq; mō insaniētes. atq; morbis, quos pitui  
ta cōflauit, magnope cōducit, fastidiētibus, cibi appes  
tentia restituit. nōnullos a crebris quoq; somnijs libe  
rat. Porro veneri, natura calida & humida idonea ē.  
q̄ppe q̄ cæteris pnior est ad libidinē. Concubitū vero  
nō admittit, victus refrigerās arefaciēs q̄, ætas senes  
ctutis, tempus autūni. Itaq; calida & humida ad duc  
tio, atq; mediocritas & labor & ciborū adhibenda est.  
Vt em̄ labores, sic & cōcubitus (si modus seruetur) ut

C ii

Præcep.

Iis est. Nam & ad opus excitat, & facilitatē quandā ei  
q̄ sic consueuerit, p̄bet. In primis igit̄ venerē stimulat,  
si quicq; aliud, alimentoꝝ abūdātia. Ideoꝝ cibi q̄ plus  
rimū alunt, ad hanc rem sunt idonei, vt ex piscibus po-  
lypus (q̄ppe hoc animal maxime libidinē irritare credi-  
tur) & mollium genus. Olera aut̄, orminon, erysimon,  
eruca, rapa, atq; hæc velutim medicamenta sunt. Legumi-  
na vero, faba, cicer, cicera, siliqua, pisum. quia flatū ge-  
nerat, vñ ruta q̄a sp̄ritū discutit, delectq; venerē obtun-  
dit. Vras aut̄ magnope p̄bo. si qdem & humectant, et  
flatū corpus implent, sine qbus nullus fit in venerem  
impetus. Iḡiſ qui in venerē cōgressurus est, obserua-  
re debet, ne tum vel facetas, vel cruditas, vel fatigatio  
vel vomitio, infestet. item neq; purgatio, neq; repenti-  
nus alii fluor. q̄uis nōnunq; diuturno fluori, eo q̄ are-  
facit, sit medicamentū. Vehementē cōcupiscentiā, tā  
tum abest vt laudē, vt ei magis renitendū censeā, ma-  
xime qbus ex morbo puenire putat. Cōmodissimum  
itaq; fuerit, post exercitatiōes, & balneas, atq; cibū mo-  
dicū coire. Sic em̄ & robustiores erūt vires & frigoris  
vitabimus nocūmentū. Hora vero ad cōcubitum ap-  
tior est post cibum (vt diximus) & ante somnū. q̄ppe  
subsequens somnus laborem remittit. Adde qd̄ hoc  
tēpus ad sobolē p̄creandam aptissimū est, cū ob alias  
cās, tū q̄ fœmina dormiēs genitū melius retinet.

Qui coire non possunt. Cap. XXXVI.

Inquedine pudēda assidue illinienda sunt, ad-  
p̄ iūcere v̄o exigū radicis narcisci partē, aut gra-  
ni gnidij, aut pyretri, aut vuæ timiniæ, aut se-  
minis vrticæ oportet, aut anisi semen p̄pinare, aut p̄

Pau. Egine

per, aut satyron, aut erucæ ptem, aut cneci, aut omnia  
simul. Bulbos quoq; assos, rubros qdem paruosq;, cū  
sale & oleo aī cibū deuorare, aut scyllæ paq; marcidae.  
vti pterea cōpositis medicamētis ad hoc ppositū inuē  
tis, ac res quoq; lasciuas creberrime legere cōuenit.

De immodico concubitu. Cap. XXXVII.

Requens cōcubitus, corpus rarius, frigidius,  
**f** & imbecillus reddit. ergo cōstypantia videlicet,  
& calorifica, & humectantia, & robur affe  
rentia, adhibere oportet. Itaq; si quē immodica venus  
læsit, sub calido opculo getus dormiat, donec corporis  
impetus remittat, ac ipe sic ab imbecillitate leueſt.

De genitalis seminis abundantia. XXXVIII.

Vnt nōnulli q cumulato multo calidoq; geni  
ſ tali semine, in venerem ruunt. quod quim eie  
cerint, imbecillū efficit corpus, ac stomachus  
quoq; resoluit, extenuat, & arescit. Si vero a coitu ab  
ſtinuerint, accedit & capit is grauitas, & nauſea, deinceps  
de p ſomnū excernētes, ipm eodē mō afficitur. Qui  
bus, nihil vñ seminis abundantia, pueniat, exhibendū  
est, sed & cibos & medicamenta ipm deſtruētia affu  
mere, & lumbos a balneo, ex oleo rosaceo, & melino,  
& omphacino, vngere debent, adiecta eis cera. vt cras  
fiorareddant. Mifcent quoq; succi refrigerātes, vt ſem  
peruiui, ſolani, vmbilici veneris. & pſillij, atq; hæc qdē  
estate, reliq; ſo tempibus, tum alia, tum lactucæ ſuc  
cus, & lini ſemen ex aqua coctum. nam & hoc refrige  
rantē ſuccū p̄bet. ſimiliter plumbi lamina lumbis ſup  
poſita, ſeminis p ſomnū, p fusionem cohabet. Idem effi  
ciunt herbe frigidæ ſubstratae, adiecta ruta, & tenellis

C iii

**Præcept.**

amerine surculis, ac lini quoq; semen, & ruta semen  
datū in cibū. Cauendū yō est ne dum lūbi tam studio  
se refrigerant, renes afficiant iniuria.

**De infrigidatis. Ca.XXXIX.**

Vi immodice frigoris incōmoda senserunt in  
loco calido decumbāt, vncit aut cyprio, aut iri  
no. deinde paulū iam calfactis aliqd piperis &  
myrrhae ex vino dulci odorato veteri dare oportet. aut  
succū cyrenaicū ex vino vel aceto, aut pyretrū, aut cas  
toriū ex aceto, ac cibis quoq; calidior exhibēdus est.

**De combustis. Cap.XL.**

Ombusti, in locis autē patētibus decūbere de  
bet, faciē, manus, crura, aqua frīgida rigare. Si  
tim yō aquae frīgide potatōe, p cōsuetudinē  
rōne cōpescere. At yō nō affatim, sed paulatim hēc fa  
cere oportet. Cibū exigū, & q facile conficiā, ac hu  
midū magis q̄ solidū assumere.

**De pituita in supiore ventre redundāte. Cap.XLI.**

I cuipiā occurras, q valentissima qdem alimē  
ta renuit, atq; nihil cibi assūmit, & si īferre co  
gas, nausea afficit, cupitq; forsitan solū q acīa  
sunt, & ne ijs qdem delectat, sed inflat, tenditurq; ven  
triculus, atq; nauseat, & a solis ructibus paulū releuat,  
interdū quoq; suscepta alimenta corrūpit, in acidā ma  
xime corruptōem. nō te lateat summā curatōis in ex  
purgatōe ventriculi a pituita cōsistere. Evidēm noui  
quendā ita affectū, epota radicula ex oxymelle, incre  
dibilem crassā pituitā multitudinē vomuisse, atq; sic  
pfecta sanitati subinde restitutum.

**Ut facile quis vomat. Cap.XLII.**

Pau. Egne.

Voniam difficulter vomentes, plurimā solent  
cruciare incōmoda, opera p̄cium fuerit doce  
re q̄uo qs facile vomat, ut & pituita vacueſ, &  
caput leuius reddatur, & ne incrudescat id quo audis  
us se qs ingurgitauerit, ne ve ledat, q̄ vīnū intempera  
te potauerit. At neq; acerba, necq; arida offerenda sunt,  
sed quæ partim dulcoris, humiditatisq;, partim vero  
acrimoniæ modū habeat. E qbus, p̄batissima sunt radī  
cula, eruca, salsamētum vetus, origanū viride, paulum  
ceparum & porrī. Vomitū quoq; p̄mouent legumina  
vt ptisana melle condita, & faba elixata, itē carnēs piñ  
gues. Oportet & o non iuscula solum, ver̄ totam quo  
q; ipsar̄ molem deuorare. Igīt vomitus non diu nrā  
ducatōi immoreſ, omniaq; p̄ elixatōem molliora fiāt.  
Atq; deligenda sunt vīna dulciora, vt pote q̄ magis su  
pnatare cōsueuerūt, sitq; potio tepida, ac amygdalas q̄  
q; in melle submersas edere, & placentaſ gustare con  
uenit. Item peponis & cucumeris ſemen maceratū, tri  
tumq; mellis loco ſumere, idē facit cucumeris radix  
cum melle trīta. Si & o validiora petis, narcisi bulbo  
ex aqua cocto, vīnū infice. Neq; non vomitū p̄uocat  
ārinū vnguentū, si q̄s illitis ex eo dīgitis arriteret. Id quo  
q; ad vomitū p̄uinet, ut nō p̄termittas post vomitōem  
abluere os & faciē, vel ex oxycrato, vel ex aqua, ſic ei  
& dentibus opē feres, atq; capitiſ grauitatē leuabis,  
Quæ ſanis aluum ſoluant, & quæ vīnam  
moueant.

Cap. XLIII.

Eteres ſatis eſſe putabant ad bonā valitudinē  
tiuendā, ſi quoddie & alii onera, & vīna, cō  
mode & ſine rephenſione, p̄ alimentor̄, poti  
onisq; multitudinē, deſcerent, atq; pcedente re ex ſen

Præcep:

centia, laudabant. Sin minus, vrinā qdem mouere stu  
debant, elixantes ex aqua scandicem, apium, asparagū,  
petroselinon, anisum, calamintham, origanū, absinthi  
um, graminis, carduiq; radicem, cytisum, capillum ve  
neris, adiectoq; vino, subinde potui dabat. Hæc em  
vrinā, sanguinē expurgat, quod haud paruum existit  
mat p̄sidium. Aluum yō soluebant, iubentes iam ad  
sommū conuersos, resinam terebinthinā, q̄ oliuæ ma  
gnitudinē equaret, deuorare. Qd̄ si magis citare volue  
rimus, paulū radicis ponticæ (q̄ vulgo reubarba) vo  
catur) miscebimus. Idonea quoq; ad vētris solutōnem  
sunt oua sorbilia, atq; ex olerib; beta, malua, itē limacis  
fuscum. atq; sæpe id auxiliū satis est. Validiora vero  
sunt, mercurialis cū sale ex aqua cocta & comesta, atq;  
ius eius epotū, item sambuci folia, & polypodiū radix  
duar; drachmar; pondere, salsa mento inspersa, vel ex  
ptifana etiam absorpta. Seri quoq; lactis tres, quattu  
orve hæminæ cum sale aut melle. Et veteris gallinacei  
ius, aut p se, aut cū durabis drachmis cneci, idem facit  
Nonnunq; aloë triū cicerar; magnitudine post cænam  
assumit. Optimū vero est post mediocrē cænā epithym  
um ex vino potare. Si q̄s aut̄ fortiore eget vacuatōe,  
sub yna aurora epithymī drachmā ex oximelle bibat.

De clysteribus.

Cap. XLIII.

Vnt nōnulli aluo astricta, quorū stomachus  
ob imbecillitatē, nō sustinet ea q̄ ventrem sub  
ducunt. ij clysteribus soluendi sunt. Itaq; retē  
tam in intestino pituitā purgabimus, coquentes ficus  
aridas, betā, nitrū, agrestis cucumeris radicem, cū mel  
le, atq; oleo, vel chamēmelino, vel anethino. Sivero sic  
citas infestauerit, decoctū ex althea & feno græco, &

Pau. Eginē.

Chamomelis iniūciemus, adiūcientes oleū, & paulū melis. Interdū etiā oleū p se, duorū acetabulorū quātitate īiectū, desideratū p̄sidium attulit, hoc tamē non assū due faciendū est, ne ob crebrā irritatōem, natura spon tanæ secretōis opus, tradat obliuionī.

De glandib⁹

Cap. XLV.

E penumero glādibus utimur, stercoris educē di gratia, ac in his quoq; qbus id quod p clyste rē īiectū est nō educit. Formantur aut̄ glādes ex sale aslo, & melle & nitro. Thymus etiā cocto melli adiūcē, siunt interdū ex resina terebinthina, adiecto ni tro. item ex nō ita multo grano gnidio. At quia vellis cant, nō sine oleo adhibeant. Præterea addito vel pyre tro, vel pipere, paraliticis opem ferūt. atq; ijs q a frigo reinflant. Item centauriū, pici, cæratoq; mixtū, pudendis resolutis p̄sentaneū fit remediū. Infantibus y/o sa lis granū iponimus. Nō nunq; sicū q̄q; adiecto nitro.

De apophlegmatismis caput vacuātib⁹, & de ijs q̄ p nares purgāt, & de vnguētis. Ca. XLVI.

Vmores ex capite p sputa vacuamus. id si lessiter facere pposuerimus, piper adiūcimus mastichē. Si y/o validiore querimus vacuatōem, aut pyretrū, aut vuā timiniā mandere iubemus. Ane mones etiā cuiusuis radix mansa, pituitā euocat. item cortex radicis capparis. atq; serosa qdem excrementa p ea q̄ diximus, excernunt. Crassiorē y/o pituitā purgar, sinapi ex oximelle gargarizatū. aut sapa in qua de coctū sit vel origanū, vel hysopū, cui eqdem sinapi cū oxymelle miscere soleo. Ut y/o a muccis purgeſ ceteris, excitabimus ipm, acribus medicamentis irritan-

D

Præcept.

tes, quoq; nonnulla sternutamentū mouent. Igīt p na-  
res purgat, & anagallidis, & cuiusvis anemones, atq;  
betae succus. Item foliorū cucumeris agrestis succus,  
aut p seipm, aut extiure, succove betē naribus infusus.  
Vbi yō crudi humores in thoracis, pulmonis, capitis  
ve g̃ibūs cōtinēt, nihil p̃ficit sternutamentū. Vn-  
guentū oris h̃moi est. Saponē ex betae succo diluēs, pa-  
latū & columellā vnge. est ēm efficax auxiliū, & p na-  
res quoq; purgandi ṽm habet. Euphorbio etiā narib;  
illito, s̃epenumero vsus sum. Itē melāthio, a q & Archi-  
genes, vbi nares obstructae sunt, opē petit. Priori Crit-  
to ṽst ex aceto ad morbū regiū.

Quæ menstrua ducant. Cap. XLVII.

Væcūq; vrinā citant, eadē quoq; mēses duce-  
re possunt. huiuscemodi est radicis brassicę de-  
coctū potui datū, p̃slicę radix, ruta, chrysanthē-  
mon, dictamū, eruca semē. Sūt nōnulla q ad os vteri  
adhibita, mēses euocāt. ut ruta cū melle illita, porri suc-  
cus, alliū tritū, myrrha ex vino diluta, leporis coagulū.

Quæ sudorē mouent. Ca. XLVIII.

Vdorem mouēt, chamēmelon aridū, tūsum q  
adiecto oleo, atq; valide p̃fricata supficie, seſe-  
li, pyretq; cachrye, anetū simiſr oleo excepta  
nitq; nō admodū tenue cū oleo, salis flos ex oleo, succ<sup>9</sup>  
cyrenaicus ex aqua dilutus, si corpus ex eo fricēt, bība  
turq; ciceris māgnitudine. item calamintę, & ex mul-  
so potui data, & extrinsecus p̃frictōes corpori admota.

De aere. Cap. XLIX.

Ere exacte puro, vtpote q neq; stagnore, neq;  
paludū, neq; barathri. cuiuspiā pestilētē aurā  
eructantis, vaporibus inficit, haud alias meli-

Pau.Egine.

or est. Cōtra, malus est, quē cloaca aliqua magna vrbē purgās, pturbat, & nebulosus. item q̄ in valle vndiq̄ editis mōtibus cōtentus, nullā suscipit aurā. Igit̄ q̄ sic infectus est aer, oēm ætate, oēm q̄ tempaturā similiꝝ le dit, optimus yō oībus pdest. At in qualitate, vt calore frigore, ariditate, humiditate, aer mutatus, hāudquaꝝ similiꝝ omnes afficit. Quippe tempato corpori, tēpatus, distempatis yō, q̄ cōtrariā habuerit temperaturā, aer vtilis est.

De aquis.

Cap.L.

o Portet quoq̄ aquaꝝ & vicia nō igno rare. q̄ppe q̄ magnū vsum pr̄ cæteris rebo, oībus p̄bent ad vniuersam fere vīctus rōnem. Scire itaq̄ licet optimā aquā esse, q̄ nullā neq; gustati, neq; olfacti de se p̄bet qualitatē, sed & bibēti iucundissima, & aspiciēti purissima videt. q̄ si a p̄cordijs quoq; celeriter descēdat, nullā aliā hac meliore ūrere oportet. Quē ve ro longa in p̄cordijs facta mora, stomachū lēdit, atq; in flatū grauēq; reddit, vitiola putāda ē. Neq; em̄ calescit, neq; frigescit facile h̄moi aqua. ac elixata quoq; in ea, tardissime, egreḡ coquunt. Itaq; op̄a p̄cium fuerit ex perimēto eā discernere. Igit̄ q̄ p̄ signa īpam noscere voluerit, ex ijs q̄ dicturi sumus iudicet. Sane q̄ ad aglonē & solē occiduū fluit, tarde trāsmittit & incostilis, atq; difficulter calescit, frigescitq;. Quē vero ad ortum, aut p̄ meatum aliquem, aut p̄ terram decurrit, & citissime calescit, frigescitq;, hæc de se optimæ aquæ spem præ bet. Neḡ non bona est, quē estate frigidior, hyeme vero calidior est. Sunt qui aquas in statera probant, quippe qui putant leuiores esse meliores, id si cum ijs q̄ dis

D ii

Præcept.

ximus non discordat, laudamus, si vero non alio signo fulciaet, haud satis facit ad perfectam bonitatis cōiectus ram. Porro pluuialē aquā Hippocrates inquit esse leuissimam, dulcissimā, liquisissimā, & tenuissimā, qm̄ sol levissimum, tenuissimumque trahit. idque non solū ex alijs aq̄s, verē etiā ex mari & corpibus, ideoque nulla oīm velociter putrescit, ut pote quod ex diuersis qualitatibus constat. Ne mox yō existimet aquā facile putrescentē esse pessimā, q̄ppe alteratōis promptitudo, yō tuti potius quod viciō tristitia est. Igitur quod habet optimas aquarē notas, si facile coepit, bibētibus, & raucedinē, & tuſsim, & vocis gravitate affert. Pluuialis aqua, quod aestiuia est, & cū tonis tru, melior est quam pcellosa. At quod a glacie & nive defluunt, oīm pessima. siquidem per aquas cōcretōem tenuiores partes omnes exprimunt. Si yō vel limosa vel putris fuerit aqua, aut mala qualitate affecta, satius erit ipsam per decoctōem corrigerē, ac sic subinde bibere. Succurrim⁹ etiā aquarē vicijs, vinū miscentes, astringēti quidem dulces, alijs yō acerbū. Necque non pdest quasdā aquas pco lare ut limosam, ut salam, idque cū polenta. Aqua vehementer frigida post cibū bibenda est, sed non affatim. Sunt quod contra aquarē vicia, cibos, potēsque, inuenient, atque alijs quidem ius ciceris ppinant, aut ipsamet edunt, alijs caucalidē (id est pedē pulli) cū pisciculo aliquo cocto, & fœniculū simili. Nonnulli prius betā, cucurbitamque sale conditam cū vino diluto edunt.

De lauacris.

Cap. LI.

Vum aquarē frigidarē lauacris laudamus, non ijs que quomodolibet degunt, sed illis dumtaxat quod exacte viuunt, & laboribus, cibisque quoad fieri

Pau,Egline;

ripotest,cōmodissime vtunē,conferre dicimus.Igitur  
vbi populares vehemētiore egent refrigerio,saterit na-  
tare interdū,tpe estiuo,mō bene corporati,& iuuenes  
sint,ac frictōibus p̄calfacti.Id yō obseruādum est,ut  
neq; ob venerē,neq; ob aliā causam sint fatigati,itē ne  
cq; cruditas,neq; vomitus,neq; alui fluor,neq; vigiliæ  
infestent,siqdem simp̄r frigido lauacro vti,haudqua  
q; tutum est.Calidū yō vt optimū est,ita & tutissimū.  
Solut̄ em̄ fatigatōnem,discutit plenitudinē,calfacit,  
mitigat,mollit,flatus diffundit,somnū allicit,bñ cor-  
porat̄ reddit.Est yō cōmodissimū cuiq;,& viro et mu-  
lieri,& puerο,& seni,& priuatis.

De lauacris naturalib⁹.

Cap.LII.

Væ p se,naturaliterq; pueniūt thermæ,aliæ q  
dem nitri,aliæ salis,aliæ aluminiis,aliæ sulphu  
ris,aliæ bituminis,aliæ æris,aliæ ferri naturam  
imitant̄.Nonnullæ composita ex eis vim obtinent.  
Igit̄ in totū omnes,p se,sponteq; puenientes thermæ,  
exiccadī,calfaciendiq; vim habēt.& frigidis,humidis  
& p̄cipue psunt.Verum q nitri,salisq; mixtura con-  
stant,capiti & thoraci & fluxionibus affecto auxiliant  
& stomacho quē humor infestat,& aqua inter cutem  
laborantibus,tumoribus ex morbo puenientibus,&  
pituitosis. Quæ aluminiis vim habēt,sanguinē reiç̄  
ntibus,stomacho vomituriēti,mulieribus q inordi-  
natæ purgant̄,& quæ frequētes abortus faciūt. Sul-  
phuris yō naturā imitātes,neruos mollificat,calfacit  
untq; ,fatigatōes solant̄,stomachū yō effœminat̄,sub  
uertitq;. At q bituminis mixtura cōstant,caput re-  
plent,sensoria ledunt,calfaciūt yō atcq; mollificat̄ si qs  
diu immoret. Quæ yō æris vim retinent,ori,tonsils

D iii

Præcep.

lis, viræ, oculis, vtilest sunt. At ferri natura habentes,  
& stomacho, & spleni cōueniūt. Ingrediendū yō in  
aquā sine tumultu est, ut iōpius vis sensim accedēs, faci-  
lius in corpus demergatur.

Quæ victus ratio quolibet anni tempore  
sit vtilis.

Ca.LIII.

P Er pulchre fuerit, etiam anni tpa in victus rōne  
considerare. Hyeme qdem, & fortiori exercita-  
tione, & pleniore cibo vtendū est. p̄cipue si tē-  
pestas aquilonia fuerit. Si vero australis, similiter exerci-  
tari oportet, sed cibo, potōicq; aliqd demere. atq; in to-  
tum p tempus humidū, omnino aridū reddere corpus.  
p frigidū vero, calidius. ac tum carnes esse, oleraq; cali-  
diora, atq; vinū bibere meracius. Aduentante vere,  
alius qdem p vomitū, alius p vētrem vacuet, alius se-  
ctavaena sanguinē mittat, put cuiuscq; fuerit, vel cōsue-  
tudo, vel animi promptitudo. Estate cōfert quies,  
exercitatio remissior, atq; cibus exiguis, q quidem ex  
frigidiore genere deligēdus est. tum yō potōi adiūcere.  
atq; qcquid refrigerare, humectareq; possit, adhibere  
oportet. Per autumnū maiori cautela opus est. qppē  
q vsquequaq; & inæqualis, & inordinatus est, multi-  
formesq; inducit morbos. Itaq; ne circa refrigeratōem  
qd pecceſt, cauendū est. a venere quoq; & frigida poti-  
one abstinendū. Neq; yō aeris q̄ se credat, vel p matu-  
tinum frigus, vel per ardorem meridianū. Pomis im-  
pleri noxiūm est, non ob facietatē tantū, verūetiā quo-  
niam viciōsi humores inde nascunt, atq; flatum quoq;  
excitant. siq;dem oīm fructū optimi ficus, vuæq; &  
flatum pariunt, & alimenta corrūpunt, nisi ante alios.

Pau. Egine:

cibos assument. passumpti vero, neq; inflant, neq; cor  
rumpunt. Quum frigescere coepit aer, corpus p fri  
goris rōne calfacere oportet. atq; oīa facere ut quū hy  
ems iam pcesserit. Nec ab re fuerit revoluto eqnoctio  
vacuare corpus ex aliquo eorū q diximus, ne redundā  
tia qdam p hyemē retenta, molestia inferat.

Victus in negocio degentū. Cap. LIII

Vi in negocio vivit, siue in priore vita exercita  
q re cōsuevit, siue nunc quoq; exercitāt, cōside  
rare debet an facile huīusmodi consuetudis  
nē ita ferat, ut neq; subinde egrotet, neq; spirādi diffi  
culty moleste. Quippe hīoi corporis natura, ac eius  
quoq; qd ex longis interuallis egrotat, haud quaq; in  
aliā consuetudinē mutāda est. At si iungiter aliq; egro  
tare videſ, atq; id qdem ob plenitudinē, id tibi pvnuer  
sam salubrē educatōem ppone, ut moderata semp sit  
ei humorū quātitās. Si vero ob humorū vicia, elabōrā  
dum est, ut qd optimi fiant humorē. Igī q plenitudis  
nem cumulauerūt eos qdem balneū ingressos, illlico  
& frictōibus vti, & paulū moueri iubebimus. Qui ḥo  
prius ea fecerint, hīc eadē paulū augere, atq; cibū  
exiguū, eūdemq; imbecillae materiā, īgerere cōsu  
lemus. At ḥo q viciōsorū humorū aceruo grauant, plu  
ra habent curatōis, pposita, q non sit vna viciōsorū hu  
morū spēs. alij em̄ frigidorem pituitosamq; magis, alij  
calidiorē biliosioreq; alij atræ bilis potius multitudo  
nem acceruāt. Itaq; tales, & cibos, & potionēs, q colle  
ctū humorē suapte nature generare solēt vitare debēt.  
Omībus ḥo cōe p̄sidium est alui ductio.

Quē victus rō viatoribus sit obseruāda. Cap. LV.

D iiiij

Præcep.

Abores itineris facile tolerabit obesus, si lenius  
1 ter incedat. atque per estatem quidem fascia, cuius la-  
titudo sex, septem dígitos, lóngitudo vero que-  
que cubitos èquet, lúbos ad ilia usque inuoluat. ac bacul<sup>o</sup>  
quocum nō nihil p̄sidij viatoribus p̄bet, quū em̄ p̄ decli-  
uem descendere viam oportet, corpus sese cōtinere nō  
valens, ac si conto cuipiā niteret, sustinet. In arduū yō  
tendētes, facilius eius auxilio in acclivē, corporis moti-  
onem p̄ficiunt. Porro ab itinere q̄escenti, & vncio, et  
estiuore ciborū alīq̄s, & potio moderata hoc tempe cō-  
ueniūt, & post prandiuū an arreptū iter q̄escere. q̄ si mi-  
grare q̄s cogat, sitiatisque tenuē polentā ex aqua cū paucis  
co sale bibat. Ardores yō & solis incendiū, vitare des-  
bet. Neque nudū soli corpus exponere, ne ab itinere are-  
factum induret. ita em̄ neque fatigabit, neque villa dictarē  
affectionū ipm infestabit. Per frigidā vero hyemen  
iter arripere volēs, prius vacuatus. vnciusque, alimētorū  
q̄ hyeme sumēda p̄cepimus, aliquod, atque exiguā poti-  
onem assumat. longiori quoque fascia, non solū lúbos,  
sed spinā etiam & pectus, p̄be, apteq̄ inuoluat. Quū  
yō q̄escit, fueritque sub hinc creatōe frigusvehemēs  
tum neque vngi debet, neque cibū, neque potōem, neque si il-  
lic p̄mansurus est, alia quāpiā refectōem cape. Cæterū  
post longa itinera, aliosque labores vehementiores, q̄que  
nō fatigatus alīq̄s est, curari tñ exēplo fatigatorū de-  
bet, ut videlicet facilius futuras iniurias deuitet.

Nauigantū victus. Cap.LVI.

Omitio q̄ nauigatibus accidit, in principio que-  
dem, neque facile, neque utiliter arceat, q̄ppe que-  
magna ex parte iuuare solet. At post vomitū, ex-  
igutum eundemque boni alimēti cibū offerre oportet, atque

Pau. Eginē.

lente aut arida, aut elixa, cui paulū pulegiū adiectū sit, vti, aut panem ex vino diluto, odoratoq; maceratū sumere. Sit & o potatio exigua, atq; ea vel vīni diluti, odoratiq;, aut acetī mulsi. Porro lētes coqre oportet dos nec mollescāt, tum terere atq; siccare, deinde in vas fistile reponere. Diuturniore autem, frequētioreq; fasto vomitu, cibos vehementer rep̄ssiuos adhibere, exiguam potōem dare, vt acetū mulsum in quo maceratū sit thymū, aut pulegiū, aquam, quoq; cū farinę flore, item vīnū odoratū dilutū cum polline. Ad grases & o in nauibus odores, mala cydonia, aut thymū, aut pulegiū olfacere, ac ne aspiciendū quodem quoad fieri potest mare est, donec cōsueuerit q; in nauib; versari. Aquis vero q; potui dant, intendendū est, ut neq; turbidæ, neq; graue olentes, neq; salsæ sint.

De carnium purgatiōe. Cap.LVII.

I obesum nimis est corpus, eliquare, purgare q; ipsum oportet. Ergo cū calida temperatura, extenuādī vīm obtineat, eam crassis corpībus ut ad mediocritatē redeāt, inducemus. Didicisti & o qd & vehementes exercitatōes, & victus tenuis, medicamenta extenuātia, & animi sollicitudines, vniuersam corporis temperaturā aridiorē, ac ob eam rem corpus ipsum tenuius efficiūt. Igī tenuis victus noi⁹ ē. Medicamenta & o ad hoc ppositū efficaciora, sunt ruta semē maxime agrestis cū accinis & aristolochia rotunda, & tenue centauriū, & gentiana, & poliū, ac ea quoq; q; vehementer vrinā cīent, ut petroselinon. q; ppē omnia hæc siue singulatim p se, siue cū alijs, efficaciter hūores extenuare, vacuareq; possunt. Adustasq; quoq; viperarū sales vehementer extenuant, item theriaca dissipandi

D v

Præcep.

attenuandiq; vim habet, simill' oleum, in quo cocta sit radix cucumeris silvestris, illitum. Adde altheæ, gëtianæ, panacis, & aristolochiæ radicē, item polii atq; centauriū. A lauacro nō illico cibū offerre oportet, sed ut p̄dormiat p̄cipere, estoq; lauacrū ex aqua q̄ distrahēdi vim habeat, maxime si spōte scaturientē habuerimus, qualem Mytilenę videre est. Sin minus, salis flos aquę marinæ misceaf, ceterę vino tenui, albocq; v tendū est.

Arida yō frictio (id est q̄ aspis pannis sine vñctōne atq; sine lotōne sit) vehemēter extenuat. Minus etiam alimētoꝝ q̄ p̄ exercitatōis rōne offerendū est. Præterea corpulenti diu sub sole ȳsari debent, nihil potare, semel dumtaxat cibū sumere, aspa frictōe ex sale, nitroq; vt. q̄ppe in balneis, nitri plurimū, attenuat, non ita multo yō (vt vegetius nutritiā) corpus excitat. Attenuat p̄terea medicamentū qđ habet piperis & petro selini duplū, asari & anisi dīmidiū, id & vrinā, & alui q̄ p̄ sedimina vñtiliter ducit.

Qūo nutriēdi sunt graciles. Cap.LVIII.

Vm vero extenuatos nutrire voluerimus, vi-  
cnum crassum, edulia valentissima, exercitatiō-  
nes lentas, frictōem mediocrē, & ut simplicē dī-  
cam, oia p̄dīctis cōtraria facere oportet. picare q̄q; eos  
tribus quattuorve dīebus nō mediocre p̄sidiū est. Qđ  
si cīnus aliquis lauet, ante lauacrū līnteo confricari  
expedit, donec totū corpus rubescat, tum frictōe vehe-  
menti qđem, nō tñ multa, cutem obstruere, atq; sic dē-  
sam, duramq; efficere. Cæterę q̄ nō alunt, pallentq;. ijs  
fram inducere, animūq; irritare p̄dest.

De ptium attenuataꝝ curatōe. Cap.LIX.

Pau.Egine.

Artes plerūq; extenuant, aut ob diuturnū ip  
p sāz ociū, aut ob confractiū diligandī mo  
dū. Ideoq; firmandæ sunt p̄tis vires, cōuenient  
dusq; sanguis plurimus, tum frictōibus modicis, tum  
idoneis motibus, ac asp̄sione quoq; aquæ mediocri  
ter calide. Quæ qdem rātisq; facienda sunt, dū rubescat,  
attollaturq; desinendū x̄o anteq; remittat. P̄icare x̄o  
ut dictū est, p̄tem cōuenit, atq; si frigidiorē eam sense  
ris, linteis, ac calorifico aliquo medicamento p̄fricare.  
Eqdēm tapisiam, interdū ex melle, interdū cū cērato, il  
linere solitus sum.

Quæ sint optimi tēperamēti notæ. Ca.LX.

Emperatissimus homo est, cuius corpus oīm  
extremor̄ exacte mediū obtinet, ut gracilitas  
tis, crassitudinis, molliciei, duricie, caloris, fri  
goris, humiditatis, ariditatis. atq; ut breuiter dicā, cū  
& naturales & aiales functōes irrephensibiles habue  
rit, mediū quoq; fuerit hirsuti glabriq; ac nigri & albi.  
Pilos x̄o habeat, in puericia qdem rufiores q̄ nigrio  
res, cōtra vero cum adoleuerit.

Distemperator̄ corporis notæ. Cap.LXI.

Orpora tempata calidiora, c̄tius dentiūt, ac si  
militer ad augmentū pueniūt, atq; tāgentibus  
quoq; calidiora apparēt. Haud ita multa sunt  
pinguedine, colore rubicundo, pilis nigris, modice hi  
spida, latis venis. Quod si parum musculosus quis  
fuerit, videaturque pinguis, crassusque, ac venas quo  
que latas habuerit, non natura, sed consuetudine pīn  
guis effectus est. Frigidoris temperaturæ signa, si  
frigidum tangentibus videatur corpus, & glabrum,  
& pingue. Horum color, vna cum capillis rufis, ac lis

Præcep:

uidis quoque necessario, si multū excederit frigiditas.

Arida  $\hat{\text{yo}}$ , & durior est & gracilior que bona temperatura, atque subhirsuta. siqdem duricies ab arida temperatura separari non potest, gracilitas  $\hat{\text{yo}}$  non solū innatas, verū etiā acquisitas quel ex modica oriunt cōsuetudine, sequet tēperaturas. siccitatis preterea signū est, si ea que exiccādī vim habet, & difficulter mobile, & aridū, ac squalidū corpus efficiūt. Humida in cæteris qdem similis est bonae tēperaturę, sed mollior, corpulentior, que quoppe cum inseparabiliter eam comitet & mollices, & crassitudo, quod non solū de innata tēperatura, verē de ea quoque, quel ex parua quadam consuetudine cōstituta est, intelligit. Cæterę ppriū humiditatis signū est, grauari corpus ab humidioribus. Calida & sicca, extremae distemperatiæ est, eius capilli in iuuētute & facile augent, & nigri & multi sunt. at tractu trapis, caluescunt homoi naturæ, venæ latæ sunt, simili& arteriæ, que magnæ sunt, & vehemēter pulsant, totū corpus, robustū, firmū, musculosum, pinguedinis expers, cutis  $\hat{\text{yo}}$  & durior & nigrior appetet. Quibus frigida humidaque fuerit temperatura, ijs & thorax, & vniuersum corpus strictum est ac glabré, cutis lenis, albaque, capilli subrufi, maxime in iuuētute, neque caluent in senectute, sunt  $\hat{\text{yo}}$  timidi, pusillanimes, somnolēti, venis latētibus, crassi, pingues, musculos habent imbecillos infirmosque. atque blesi quoque magna ex prete sunt. Quod si plurimū frigiditas humiditasque augeat, erit color, vna cū pilis rufus. liuidi  $\hat{\text{yo}}$  eradēt si supra modū excedat. Cæterę frigida, humidaque tempatura, mollior ac corpulentior est que optima. quæ si plurimū intendat, facile morbis quel ex putredine pueniūt afficiat. Qui vero pauc

Pau. Egine.

Io humidiiores, multo vero calidiores sunt, ij ut paulo  
molliores sunt tempatis, ac carnibus magis abundant,  
ita multo hispidiores, calidioresq; euadunt. Si aut frigida  
ditas vna cum ariditate æqualiter auget, paræ musculosum  
erit corpus, ac imbecillius quoq; & glabriæ, tangètib; ve  
ro frigidius apparebit, neq; pinguedine carèt hmoi cor  
pora. Licet em tenuia sint, pinguedo tñ p carnes dispila  
conspicit. Color vero capilloæ, frigiditatis modū ac po  
portionem imitatur. Quod vero ad animi mores pertinet,  
pusillanimes, timidos, & tristes facit huiuscmodi tem  
peratura. Atq; ut summatim dicā, in conjugatis tempa  
turis, vincētis sp̄ q̄litatis signa vincere consueuerūt.

De capitis formatione. Cap.LXII.

Arium quidem caput, vitiōse cōstructōis cere  
bri proprium est in dictiū, magnū vero non necessaria  
rio bona cerebri compositurā significat, si enim  
ob insitae potētiae robur optimā materiā formātis eue  
niat, bonū signū est. si vero ob solā materiā multitudi  
nē, non bonū. Itaque distinguenda sunt hæc, tum ex ipsa  
capitis figura, tum ex his q̄ ab eo oriuntur. A figura quidē  
si cōcinnna est, quippe hoc semper bonū est signū. Ab ipsisve  
ro q̄ orūnt ab ipso, si optime constituta sunt, si omnis  
neruosa substātia bene coaluit, & valida est, atq; si acut  
te videt oculi. In pyramidis vero spēm fastigiata capis  
ta, deficiētem in fronte, vel occipite habet eminētiā,   
aut plus q̄ deceat auctam. Igis ut paruitatē, ita has q̄q;  
vitupamis figuræ, quare nonnullæ, quis raro, bonæ  
sunt, quum formās videlicet potestas valida fuerit.

Temperaturæ cerebri notæ. Ca.LXIII.

Emperatū cerebri, mediocritatē seruat animalitū  
operationū, & excrementorū, ac minime ab omni

Præcept.

bus que extrinsecus occurrit ledit. Horum capilli, qd infantia qdē, subrufi sunt. in puericia subflavi. in adolescētia & o flavi. atq; medijs sunt inter exacte crispis ac simplices, neq; caluescūt facile. Si & o calidius tempore fuerit, omnia q circa caput sunt, & calidiora, & rubicūdiora apparēt, neq; latent oculorū venae, capilli illi co post nativitatē ex capite pdeunt, multo qdem calidioribus, nigri, robusti, crisi, non multo & o, primum qdem, subflavi, deinde nigrant, pcedente & o ætate, caluent q sic affecti sunt. atq; si integras sanitas est, ex extremēta eis pauca sunt, capita replēt a calorificis edulis, odoribusq; atq; ab ijs q extrinsecus occurrit, brevibus somnis atq; ijs haudquaq; profundis h̄moi tēperaturæ cōtentæ sunt. Frigidioris q cōuenit cerebri note, ex extremēta plura per pproios meatus, capilli recti, rufi, stabiles, & facile a refrigeratibus causis leduntur, destillatōe, grauedineq; assidue capiunt, oculorū venae visum effugiūt, atq; somnolētores quodammodo sunt.

Qui sicciori sunt cerebro, h̄moi notis dephēdūtur, meatus nulla sugfluitate redūtant, sensus habet exacte liquidos, vigilaces sunt, capillos robustissimos haud multo postq; geniti sunt, pducūt, atq; eos crispis magis, sed celeriter caluent. Humidioris cerebri, capilli simplices sunt, & haudquaq; caluiciū admittūt, sensus turbulent, ex extremētoꝝ multitudo, somnus plixus atq; profundus. Si & o calidū & siccū fuerit, sugfluitatis bus carēt, sensibus vigēt, vigilatissimi sunt, facileq; caluescūt, & primus qdem capilloꝝ ortus celerrimus est & bene coalescēs, nigros habet capillos, & si q; caput tetigerit, ipm calidū iudicabit, atq; ad vigoris usq; ætam rubicūdi sunt. Quod si calori humiditas quoq;

Pau.Egine,

accedat, neq; multū vtraq; mediocritatem superet, ijs & coloris gratia, & calor inest, & oculoꝝ venæ magne extremita plura mediocriter cōcocta, capilli recti, sub flavi, neq; caluēt facile, caput a calorificis humectanti busq; lœsum, facile & impleſ & grauat, vigillare diu ne q̄unt, dormiētes ꝙo imaginibus p̄ insomnia infestantur, visus eis turbidus, ac ne sensus qđem vicio carēt.

Frigidæ aut̄ simul & aridæ cerebri tempaturæ frigidæ & decoloratū caput reddūt, neq; oculoꝝ venæ prominēt, & a refrigeratibꝫ causis facile lœdunt huiusmodi tempaturæ. Iccirco inēqualiꝫ sani sunt, sensus eis in suuētute qđem, sinceri, illæsicꝫ sunt, etatis ꝙo successione celeriter marcescūt. atq; (ut summatim dicā) oīa q̄ circa caput sunt, festinā minant̄ senectutē. Cæte rū post nativitatē vix eis capilli oriunt̄, male coalescūt, & rufi sunt. Frigidæ & humidæ cerebri tempaturæ somnolētos, soporatosq; efficiūt, sensus hebetes supfluitatibus redūdātes. tales & facile a frigore afficiunt̄, & caput plenitudinī obnoxii hñt. atq; destillatōe, grauedineq; facile corripiunt̄, sed haud quaq; caluescūt.

Quibus notis ventriculi temperatura de  
præhendatur. Cap.LXIII.

Entriculi, natura quidē aridioris, indicia sunt:

v Si celeriter sitibundi fiant, & exiguis eis sufficiat potus, ac multo grauentur, & fluctuationibꝫ

infestentur, cum scilicet supernatauerit id quod redundat. atq; edulīs delectentur aridioribus. Huius midioris, si neq; sitibundi sunt, ac redundantem quoq; humorē sine molestia tolerat, atq; alimētis gaudet huiusmidioribus. Calidior natura vētriculus, meliꝫ cōco-

Præcept.

quæ q̄ appetat,maxime dura & quæ surapte natura dif-  
ficulter consiciunt̄.gaudet multis tum alimētis,tū po-  
tibus,& neq̄ frigida nocent ei,si modice iþpis vtatur.

Frigidus natura ventriculus,idoneus qđem ad ap-  
petendū,sed ad cōcoquendū ineptus,p̄cipue q̄ nō faci-  
le cōcoquunt̄,aut q̄ frigida sunt alimēta,nam facile a-  
cescūt in ipo.gaudet ȳo frigidis,sed ab immodico eos  
rum v̄su leditur.Quæ ȳo morbi rōem habēt,ventricu-  
li intēperatiæ,hoc ab innatis differunt,q̄ cōtraria,nō si-  
milia appetunt ut naturales.Igit̄ si p̄be concoqt ven-  
triculus,tempatus,si ȳo nō concoqt,intempatus est.  
Item si fumosum ructat,immodicus,igneusq; est eius  
calor,si ȳo acidū,ecōtrario,atq; q̄ cibos coctu diffici-  
les cōficiunt̄,immodico sunt calore.ideoq; eos q̄ facile  
cōcoquunt̄,ut pisces mollioris carnis,ac alios h̄moi,  
corrumpūt.Carnes ȳo bubulas facile cōcoquunt̄.Rur-  
sus q̄ has qđem cōficere neq̄unt,pisces ȳo cōcoquunt̄,  
cōsiderare oportet,num ob humorē aliūde affluentē  
hoc accidat,q̄ppe pituitosi,acidū,biliosi,fumosum &  
graue olens,atq; alias quasdam extraneas qualitates  
ructant.Nausea aut̄ vtrisq; cōiter accidit.Ver̄ si vitios  
si humores ventriculū implētes,in eius cōcauitate na-  
tauerint,vomitū eñciunt̄.si ȳo in orificij iþpius tunicis  
cōtinent̄,inani ad vomitū nausea frustra cruciant.

Pulmonis signa.

Cap.LXV.

On solū ventriculus sitibūdos & nō sitiētes ef-  
ficit,atq; frigidæ calidæ ve potōnis appetētes.  
ver̄ etiā ea q̄ in thorace continent̄ viscera,cor-  
pulmo,iecur,cū itaq; biberint tales,nō illico sedat eos  
rum suiis,atq; frigida,exiguaq; potio magis q̄ multa et  
calida,eorū sitim solat,ac frigidus aer inspiratus refri-

Pau.Egine;

gerat eos, cū nihil iuuet ob vētriculū sūtiētes. Sic q̄ ecō  
trario affecti sunt, a frigida inspiratōe sensiblē moles  
stantē (q̄ potissima frigidī pulmonis nota est) ac pituitā  
quoq; cū tussi screātes expuūt. Vt aut̄ aridi pulmones  
rarissime excremētis, pituitac̄ abūdāt, ita hūidi maxi-  
me excremētosi sunt, & obscurā raucaq; vocē reddūt,  
p̄sertim si q̄sve lvehemēti, vel acutius loq̄ studuerit.

Cordis signa.

Ca.LXVI.

Altidioris cordis signa sunt, respiratōnis ma-  
gnitudo, pulsus velox & dēsus, audacia, atq;  
furiosa ferocitas, thorax hirsutus, maxime se-  
cūdū pectus, & ea q̄ p̄cordijs vicina sunt, atq; magna  
expte totū corpus calidū, nisi magnope renitāt hepar.  
Sane thoracis amplitudo caloris signū est, nisi in hac  
re cerebr̄ ei vehemēter obstiterit. Cor frigidius, pul-  
sus reddit tempatis minores, tales suapte natura timi-  
di, pusillanimesq; sunt, p̄cipue si glabri fuerit eis pes-  
tus. Aridius cor, pulsus efficit duros, & iram, lentā  
qdem sed ferā, & q̄ nō facile pacat, atq; vniuersum q̄  
corpus aridius, nisi resistat iecur. Humidioris cor-  
dis signa, pulsus molles, & mores ad irā qdem pronis,  
sed q̄ facile sedari possit, atq; totū corpus humidius, ni-  
si iecur obstiterit. Calidi & siccī cordis, pulsus & du-  
ri & magni & veloces & frequētes sunt, atque respirati-  
ones magnae, veloces, frequentes. ac hirsutissimū est  
eis pectus, simili & p̄cordia. sunt in tractādis negotiis  
prompti, furiosi, audaces, moribus tyrānicis, velo-  
ces ad irā, & nō facile placant. Si ḡo cū calore vice-  
rit humiditas, tales minus hirsutis sunt q̄ supiores, ex-  
pediti ad negotia. neq; ḡo sunt aīo, sed ad irā dūtaxat  
peliues. Pulsus magni, molles, celeres, & frequentes

E

Præcep.

sunt. Humidioris & frigidioris, pulsus molles, mores pusillanimes, timidi, & segnes sunt, pectus glaber, neuti<sup>q</sup> suriūt, ac ne ad irā qdem pni sunt. Frigidū & siccum cor, pulsus efficit duriores & paruos. nō oīm minime irascunt, sed cū irati fuerint retinēt irā, atq; glabrum est eis pectus magis omnibus alijs.

Quibus indicijs iecoris tempatura deprehendatur. Cap. LXVII.

Epatis calidi signa. Venae latitudo, flauæ bis hæsis abūdantia, atq; p vigoris ætate atræ. Calidior est illis sanguis, atq; eadē rōne totū corp<sup>n</sup> nisi cor obſtiterit, ventrē & pcordia hñt hirsuta. Frigidioris, venæ angustæ, multū pituitæ, sanguis frigidior, atq; vniuersi quoq; corporis habitus, nisi a cordis influxu caleſcat, vēter & pcordia pilis nuda. Aridioris, sanguis crassior & minus abūdās, venæ siccæ, atq; vniuersum quoq; corpus, nisi cor obſtiterit. Calidi & siccii simul indicia, pcordiū hirsutissimū, sanguis & crassior & minus abūdans, amara bilis plurima, atq; p vi- gorem atra, venarū & latitudo & duricies, atq; vniuersum corpus calidū & siccū. Sane calor a corde pcedēs frigiditatē a iecinore ortam vincere pōt, quēadmodū & frigiditas calorē. Siccitatē & oīo nō potest cor humidius ad contrariū ducere. Igī manifestū est, q; si in vnu conuenerint vtriusq; principij tempaturæ, scdm illas exqsite afficiet vniuersum corpus. At calidū & humidū hepar, pcordia minus hirsuta facit q; calidū & sic- cum, plurimū & oīo sanguinis generat, venas latas, habi- tū calidū & humidū efficit, nisi cor renitāt, q; si plurim-

Pau. Egine.

mus a naturali mō fuerit vtriusq; qualitatis excessus, a  
morbis q ex putredine ac vitiosis humoribus fiunt, fa-  
cile corripiunt sic affecti, idq; magis, si plurimū humi-  
ditas, calor & o parē increuerit. Præterea viciolis quoq;  
humoribꝫ abūdant. Iecur humidius, frigidiusq; gla-  
brum habet p cordiū, sanguinē pītuitā naturā imitan-  
tem efficit, venas angustas, atq; totū quoq; corpus si-  
militer afficit, nisi a corde ad cōtrariam naturā traducat.

Frigidū vero & siccū, parē sanguinis, & venas strī-  
etas facit, ac corpus etiā frigidius, p cordia nuda, nisi  
& hic quoq; cor dominetur.

De testiculorꝫ tempatura Cap. LXVIII.

Esticulorꝫ calida tempatura, ad libidinē pna-  
tis, & masculorꝫ generatrix, & fœcunda, & ce-  
leriter genitales ptes hispidas facit, ac vicinas  
q; attingit ptes. Frigida & o ecōtrario. Humida  
qdē, humido, multoq; semine abūdat. Sicca & o exi-  
guū qdē, sed crassum semē pducit. Calida & sicca tē-  
peratura, mediocriter crassum semē genitale habet, &  
fœcūdissima est, ac celeriter ab initio ad cōcubitū exci-  
tat aīal, & citissime genitales ptes hirsutas reddit, ac vi-  
cinas q; supne qdē ad vmbilicū, inferne & o vsc; ad  
fœmora. qppē vehemēter in libidinē irruit huiuscemo-  
di temperatura, sed illico satiatut, & si coacta fuerit, lae-  
ditur. Si caliditas humiditati copuletur, hirsuti quis-  
dem tales, & abundant magis genitali semine, sed nō  
magis appetunt alijs, ac minus nocet eis frequens coi-  
tus, q; si plurimum increuerint calor & humor, non si-  
ne noxa a venere abstinent. Frigida & humida testi-  
culorum tempatura, adiacentes partes glabras reddit,  
& tarde coire incipiūt, necq; pni in venerem ruūt, aquo

E ij

Præcep.

sum & tenuis est eis semē genitale, & parvus fecundū, se-  
minarūq; generatiū. Frigida & sicca, in reliq; q;  
dem superioris similis est, sed crassum est ei semen geni-  
tale & perexiguum.

De omissis.

Ca.LXIX.

Ingulæ in nobis ptes peculiarē quandā & tem-  
peraturā & vim obtinēt, sed oīm notas pstrin-  
gere haud quaq; necessariū est, q̄ppe q̄ infinite  
fere sunt, & nos cōpendiū scribere statuimus. Porro il-  
las dūtaxat psequuti sumus, qbus reliquū quoq; cor-  
pus coafficit, reliquas & p has, via & rōne ppendere  
oportet, tum ab excremētis, tū ex reliq; & actōibus &  
casib;, i p̄parū tempaturas scrutātes. Itaq; supēst vt ad p̄-  
sidia qbus vniuersi corporis intēperies corrigi possit, no-  
stra conuertaf oratio.

Calidē corporis intēperatiæ medela. Cap.LXX.

Rgo cū in calidis distempantijs bilis redūdet,  
si p̄ inferiores subit ptes, nullū negocīū p̄bet,  
si & ad superiorem vētriculū a scēderit, post ex-  
ercitatōem, & ante cibū, ac epota aqua, vomitu ejicien-  
da est. Exercitatio eis vtilis est, nō velox, nō vehemēs,  
sed segnior atq; lenior. Nōnulli q̄ ita calēt, pr̄sus exer-  
citatōibus nō vtunē, sed deambulatōe atq; lauacro cō-  
ti sunt, q̄n etiam post cibū lauacris delectant. Quos  
cū calore simul siccitas infestat, i humidiōri egēr victi?  
rōne, tum ex humidis edulijs, tum lauacris, abstinere  
& a validis multisq; exercitatōib; debēt. quare p̄ est  
tem citius abluant, deinde a cibo iter, ac frigida q̄c  
potio eis pdest. Porro aridis tempaturis ifestissima ve-  
nus est. Abstinere & a fatigatōne, estu, curis, vigilijs  
debēt. Humidæ natura tempaturæ, p̄ ætatē puericig

Pau. Egine.

morbis corripiunt, q ex defluxione, vel plenitudine,  
vel putredine quoq; pueniunt. Igif & multa exercitatio  
& exacta in ventre cōcoctōe, atq; p vrinas etiā secretio  
ne, indigent. qd si bis terve ante cibū lauenit, idq; ex  
aquis suapte natura calidis, mirifice iuuant. at ne de  
fluxionib; infestent, puidendū est, & lauacris, & mul  
ta exercitatio, & cibo, & secretōe tum p vrinam, tū per  
aluum, ac nihil phibet interdū apophlegmatismis q  
q; ac purgatōibus vtī, alimētisq; boni succi, & vinū bi  
bere quo vrina moueat.

Frigidæ distēperantiaæ remedia. Cap.LXXI.

Rigidaræ distēperantiaæ tres sunt differētiae, q  
f rum q sicca est, pessima censem. qppe qd alijs  
senib; tractu tps euénit, id statim a principio  
tales molestat. Ergo humectare calfacereq; eos opor  
tet, modice exerceri, alimētis calidis, humidisq; vtī, vi  
na calidiora bibere, diutius dormire. Neq; negligere  
debemus, vt cōtracta quac; dīe in corpe excrementa,  
euacuent. Concubitus sicciores qdem oēs lēdit, ma  
xime si ariditati frigiditas quoq; iūga. Calidis yō &  
humidis dūtaxat tutus est. Ac vitiosē quoq; sunt tē  
peraturæ, q frigiditatē humiditatē copulat, qm̄ morbis  
creberrime capiunt, q ex defluxione, pueniunt. hos a la  
uacris abstinere oportet, frequēter exerceri, vīctū tenu  
em, & mediocriter calidiora vnguēta adhibere. Qui  
yō natura frigidiores qdem sunt, modū yō siccitatis,  
humiditatisq; nō excedunt. horū & excitare & roborare  
calorē cōuenit, & qd ad humiditatē, siccitatēq; p̄tinet,  
in vniuersa vīctus rōne mediū obseruare.

Aride distēperatiaæ in vētriculo veluti exēplo mox  
aliaq; q̄ distēperantiaæ medela. Ca.LXXII.

E iiij

Præcep:

Istemperantiarum siccariꝝ, alia est quando similiares partes, quæ solidæ sunt substantiæ, sicciores effectæ sunt. Hæc nullo medicamēto vinclit. Alia, substatię ex hūore cōpacte peculiaris affectus est, cū p̄pria humiditas q̄ p̄tes alit, p̄fus depdita est. Hæc in oībus aīalis ptibus, veluti sparsus ros continet sed sine cibo in ptibus reponi nō pōt, quapropter diffīcillima est huius cemodi affectōis medela. In paruisvero arterijs venis quę consistētes aridates, curare līceret. si humidos cibos exhibentes, singulas p̄tes peculiaris humiditate impleuerimus. Igit̄ vtile fuerit laborātem diu in aqua temperati lauacri ȳsari, mox a balneo aſiſ ninum lac, nouum, nup emulctū, cui paulū tepidi melis adiectū sit exhibere, deinde q̄escere sinere, ad secūdum vſcq̄ lauacri, tum vnguento aliquo modice p̄friſcare, dūmodo exhitū lac exacte confeclū esse, tum ex ructib⁹, tum ex ventriculi tumore, cōieceris. Porro inter primū atq; secūdū lauacri, quattuor qnq; ve horæ eqnoctiales intercedere debent, si tertio quoq; ipm lauare p̄posueris. Sín min⁹, plures. Atq; post singla lauera antea q̄ induat, oleo p̄fricād⁹ ē. Quinetiā post secūdum lauacri lac ei dabimus, si id qdem ei gratum est. Sín minus, ptisanā exacte coctam, aut alicā veluti ptisanā p̄paratam. deinde rursus iterposita requie, vel ad tertiu lauacri, vel ad coenā ducemus. Panis ita p̄pareſ, vt sit p̄be in fornace assatus, atq; purus. Obsoniū p̄bēat vel p̄ſces saxatiles, vel aſellū (quę graciōni ſcon vocat) ex iure albo. Atq; vt breuiter dicam, caput educatōis ē ut sit cib⁹ coctu facilis, boni alimēti, haud quaq; vifcosus, neq; ſupfluītati⁹ redūdans. Potio at esto vīnū aqſum, albū, puri, paulū aquæ ſuſtinens,

Pau, Egine.

modice stringēs. Hæc sunt maxime ariditatis p̄sidia.  
Modica & o siccitas, nō tam exq̄sita circa victū obseruatōe indiget, atq̄ pleniorē cibū admittit. Iḡe p̄posat nobis siccitas, priori qdem similis, sed cui modica frigiditas fuerit annexa, in hac calorificor̄ materia, p̄ frigiditatis mēsura mutare oportet, adiūciēdo eis que iam dicta sunt, ut lacti qdē, plus mellis, ac vinū minus. aq̄sum q̄ id qd̄ p̄posuim⁹, atq̄ edulcia etiā calidiora dabimus, nō solū natuīs tēpaturis, verū etiā recētiorib⁹ q̄litatib⁹. Prēterea nardino, mastichino & vnguento iungiter illinem⁹. Vbi & o multa frigiditas ariditati iungit, ea ut diffīcillima putat, ita maxie curatōi f̄sistit, q̄re vel eisdē ei medicamētis succurrere, vel mel coctū ab iecta spuma p̄ se exhibere, atq̄ vīna puetusta eligere conuenit. Necq̄ aliud salubrīus medicamētū inueni⁹ eo, q̄ assidue picatores vtunt̄, vētriculo illitū, atq̄ mox antea q̄ refrigerescat, auulsum, atq̄ dormire cū puello corpus lēto, ut iugiter supiore ventriculū attingat, efficaciter auxiliat. Ceterę si ariditatī mediocris calor cōiūctus est in hac, prima victus rō obseruāda est, ut videlicet q̄ ita afficiunt̄, mel pr̄sus non degustent, & vinū vetus minime īngerāt, sed esculēta tepida & lactea eis exhibere, atq̄ ventrē omphacino, melino & vngere oportet. Atq̄ nimis studiose tales infrigidare, tutū nō ē, qn̄ qdem febris qdammō naturā īmitat hæc affectio, cū calor excesserit. Rursus supponam⁹ calidā distēpes rantiā vincere, eiq̄ hūiditatē copulari. Hāc intēperiem aq̄ frigidæ potōe curabim⁹, atq̄ refrigeratia astrigētia & alimēta idonea sūt, sed q̄ ita sint austera, ut nō calfaciat. Hūidaitēperatia, si sola fuerit, siccātib⁹ edulīs, q̄ neq̄ calfaciat, neq̄ refrigeret mirifice iuuat, quā etiā

Præcep.

am corrigit solitæ potōis abstinentia. Si yō frigiditas ei accedit, optima p̄sidia sunt, acria omnia, adiectis astrin gētibus, q̄bus nulla manifesta sit refrigerādi vis. Exis gua quoq; potio, eaq; vinoq; vehementer calorificor, eis eximie medet. Ergo distēperantia, q̄ in qualita tibus sunt, hæc sunt remedia. Cæterq; cū s̄apenum ero ex humore, q̄ vel in ventriculi spacio cōtineat, vel in tunicis ipsius impactus est, distempantia p̄ueniat, op̄e p̄cium fuerit de ijs quoq; aliqua p̄stringere. Igit si pri ma affectio quempī infestat, expurgato p̄ vomitū hu more, facile congescit. Si yō ex alia quadā, aut alijs in fluit p̄tibus, tum exacta opus est īvestigatōe. nam cu rādīrō, efficiētis causē noīciā statim sequtur. Sane vniuersam curatōem ad m̄ttentē p̄tem dirigere oportet, suscipientē yō interea dūtaxat munitre, ut nō facile id quod influit, suscipiat, qd & astringētibus p̄fici. & ijs q̄ ad bonū habitū, vniuersum corpus p̄ducūt. Viciati yō humores q̄ ventriculi tunicis īmpingunt, medio criter purgātibus educēt̄ sunt. huiusmodi est aloë, & q̄ ex ip̄a componit̄ hieraamara. Viscosiorē yō p̄ituitā simul ventri īmpactā, primū incidere oportet, deinde expurgare, atq; si idoneus alijs est, sumpta radicula vomere. Sivero neq; viscous, neq; crassus fuerit hu mor, satis fuerit vel ptisanæ succo vel mulso vomitū mouere, aut absinthij succū ex mulso bibere. Cæter rum reliquar; p̄tium distēperatiē haud absimil' curantur, humores ad expeditos idoneosq; meatus ducēdo. quod si sensibili meatu ps caret, abūdantē vel saniem, vel humorē, vel spūm quoq; flatuosum in ip̄a cōtentū, in vaporē redigere, ac sic deinde euacuare oportet.

De cibor; facultatibus. Cap.LXXIII.

Pau. Eginē.

Onsequens est ut de ciborū facultatibꝫ sermō  
nem, q̄ salubrit̄ quoq; p̄ceptoꝫ p̄s est, p̄dīctis  
subnectamus, si prius q̄ p̄tūculatim ip̄os p̄seq̄  
mur, pauca q̄dam p̄mis̄erimus. q̄ppe oportet, si quicq;  
aliud, ciborū nosse facultates. Igit̄ cibī qbus extenu-  
andi vis est, meatus aperiunt, humores ob nimiū lento-  
rem adherētes abstergūt, crassos incidūt & attenuant.  
Qd̄ si diutius q̄s eis vtā, serolas, biliosasq; cumula-  
bit suffluitates, Atq; si adhuc abūndantius ingerantur,  
melancholicū sanguinē cōstituunt. quā ob rem assidu-  
us ip̄orū v̄sus fugiendus est, maxime qbus biliosa fu-  
erit natura. his vero dūtaxat cōgruunt, quibus pituita  
& crudus, & viscidos, atq; crassus humor cumulatus  
est. Qui ḷo cibi impinguādi vim obtinet, iij firmūp  
bent alimētum, atq; si in vētriculo iecoreq; p̄be conco-  
quant, bonū sanguinē generāt, sed lienem & iecur ob-  
struunt. Horū vero ip̄orū, aliū crassiores humores dūta-  
xat faciūt, ut lens, aliū viscosos, ut maluē. Aliū & crassos  
& viscidos, ut qbus testa, p̄ tegmine est. Igit̄ v̄ctus ex-  
tenuans ad bonā valetudinē tuendā, multo tutiorē eo  
q̄ crassitudinē inducit. At q̄a exigūt alimentū p̄bet, n̄i  
hil vel firmitudinis vel roboris, corpori p̄stat. Itacq; vbi in-  
digentia aliquē p̄ssit, cibus in quo plurimū alimenti ē,  
modice exhibendus est, sed p̄cipue illis citra noxā das-  
tur, q̄ exercitatōi opam dant, & q̄ quantū libuerit dor-  
miunt. Quicūc q̄ ḷo ante cibū exercitari nō possunt, ali-  
mēta q̄ crassos succos faciūt, fugere debēt. At neq; in  
ocio degētes huiuscemodi cibos admittāt. Porro ut p̄  
petuum ociū bonae valitudini maxime aduersatur, ita  
mediocris motus summo p̄sidio est. Mediæ ḷo ma-  
terie alimēta, oīm p̄stantissima sunt, ut pote q̄ medios

F

Præcept.

cris substātiæ sanguinē pducūt, atq; ut huiuscemodi  
edulcia corpib; nostris cōmodissima sunt, ita viciosū  
succū generatia, maxime noxia, semp̄q; fugiēda sunt.

Summope yō vitāda est alimētor; varietas, p̄cipue  
vbi cōtrariae fuerint eis facultates, nam q̄ sic ingerunt  
coctioni resistunt.

De olerib; Ca.LXXIII.

Lactuca manifeste refrigerat & humectat, atq;  
iccirco somnū quoq; allicit. Ut yō ex oleribus  
ipa maxime nutriēdi vim habet, ita optimi suc  
ci sanguinē facit. Intubus refrigerādi, humectādiq;  
vim obtinet, at lactuca infeſorē. Malua refrigerat q̄  
dem, sed obscure, magis yō humectat, atq; ob viscosi  
tate aluū ducit. Beta abstergendo aluū mouet, vñ si  
crebro edat, stomachū vellitat, atq; iecur, & lienem ob  
struit. Brassica, bis qdem cocta cōmestāq; ventrem  
cohabet, si yō semel, neq; admodū coquat, atq; ex oleo  
& garo aut sale edat, ducit potius aluū, quēadmodum  
ius eius purgādi potestate lentiū cremore p̄statiū est.  
At manifestius magisq; ventrē mollit marina brassica,  
nam & salsa & subamarulēta est, quā propter auroni q̄  
q; subducēdi aluū potestas est, eo q plurima sal sedine  
p̄cipiat. Brassica yō stomacho magis cōuenit, vt pote  
q̄ mediocrē obtinet astringēdi vim, ac lac q̄ & genita  
le semē pducit. Blitū & atriplex humore qdem ab  
dant, sed exigū alimētū p̄bent. Omnia aculeata ut  
cardu & fusus agrestis, atq; alia huiuscemodi, stomā  
cho idonea sunt, excepta cinara, q̄ & dura est & malis  
succī, ideoq; cocta cū oleo & garo & coriandro, exhibi  
bēda est. Apīū, hipposalinon, sion, smyrniū, vrinæ ci  
endæ facultatē hñt, sed smyrniū & magis odoratū

Pau.Egine.

acre est, & vrinā & menstrua mouet. Apia & o suauiora sunt, ideoq; stomacho aptiora. Erica calida est, & genitale semē pducit. vñ & libidinē excitat, atq; capie tis eā doloris spēm, quā cephalēa vocāt. Nasturciū, ocymū, sinapi, calida sunt & acria, & p̄cipue nasturciū, sunt & o coctu difficultia, stomacho inepta, & mali succi

Vrtica tenuib; cōstat p̄tibus, aluū ducit, atq; exiguū alimētū p̄bet. Gingidion simile scādici est, haud parē stringētis amarulētæq; q̄litatis hñs, stomacho ap̄tum, ut fastidiosis q̄q; idoneū sit ex aceto māsum, sed corpus parē alit. Quae & o siluestria olera vocant, ad vi ciosorē humorē gnatōem nihil reliq; faciūt. Capparis & appetētiā excitat, & iecoris lienisq; obstrūctōnes soluit, ac pītuitā educit. sumēda vero est in prima mēsa velex oxymelle, velex oleo & aceto.

De cymarum natura. Cap.LXXV.

Litor, lactuca, atriplicis, maluæ, betæ, plāta b qdem humida est. Cyma & o arida. Rapa, sinapis, radicula, nasturciū, pyretre, brassica, aliaq; calida, plantā qdem aridā hñt, cymā vero humidam.

Fruticosar, & o plantaç cymæ, & quæ in paludib; & quæ in ortis nascunt, item q̄ a bryonia decerpunt, stomacho qdem aptæ sunt, & vrinā mouēt, exiguū vero alimenū p̄bent. q̄ si p̄be coquant, magis q̄ que ab oleribus sumunt alunt, similiter de chamedaphnes cy ma sentiendū est.

De radicibus q̄ cibī rōem obtinēt. Ca,LXXVI.

Vnias quidem & rapa, si bis coquantur, haud b minus reliquis oleribus alūt, sed si iugiter assūmantur, crassum humorē conciliant. Bulbi astringunt, abstergunt, appetentiām excitāt, stoma-

**Præcept.**

cho robur addūt, & viscosos ex the  
humores edū  
cunt, q̄ si bis coquant̄ plus qdem alimēti p̄stāt, sed n̄  
hileducūt, nam qd' amar̄ in īpis est, ita ab̄īct̄. Præte  
rea si crebro q̄s eis vtaſ, genitale semen augent, & ve  
nerem impēdio excitant, flatus quoq̄ faciūt & tormi  
na. At ex garo & oleo sumpt̄, suauissimi sunt, & boni  
alimēti, atq̄ coctu faciles. Pastinac̄, dauci, siferis, ra  
dices, rapis minus alūt, sunt yō calidē odoratae, atq̄  
vrinā mouēt, abutentibus yō & coctu difficiles sunt,  
& viciatos humores parīt, p̄ cōi radicū rōne. Agre  
stis pastinaca a nōnullis daucus appellat̄, & maiore c̄  
sandæ vrinæ vim habet. Radicula attenuatoriae, cal  
factoriae, facultatis est, sed an̄ alios cibos ex oleo &  
garo ducēd̄ alii gratia sumēda est, post cibū aut̄ neq̄  
q̄. Cepa, alliū, porrus, ampelopraspon, eo q̄ acris fūt  
potētia, corpus calciant, atq̄ crassos in ip̄o humores  
attenuāt & incidunt, & bis qdem cocta paulū, incocta  
yō nihil alimēti p̄stant. At yō alliū opilatōes soluit, &  
discutiendi magis vim obtinet. Ampelopraspon aut̄ ut  
pote agrestia sicciora sunt. Porro in vniuersum oia  
cruda olera, coctis peioris succi sunt, magisq̄ sup̄fluo  
humore abūdant. Quæ yō vel muria, vel oxyhalme  
cōdita reponunt, stomacho aptiora sunt, & appeten  
tiam magis mouēt, ac crudos humores incidunt, sed  
coctu difficilia sunt, & si quis eis abut̄, malos succos  
producunt.

**De tuberibus. Cap.LXXVII.**

Vber succus etiā nullā notatu dignā qualitā  
tē præ se ferat, frigidus tñ est, crassusq̄. Fun  
gi & frigidi sunt, & pituitosi, & mali succi. Ex

Pau.Egine:

his boleti, innocētiores sunt, & manifestae qualitatis  
exptes si recte coquantur, deinde ammanitē ab ijs scđm  
locū obtinēt, ab alijs ḡo fungis abstinere oportet, q̄o  
pe cū multi ex iōs lētiferi sunt, ac iōi quoq; boleti, nisi  
geocti edant, p̄sens periculū s̄penumero minant.

De frumentaceis. Ca.I. XXVIII.

X eis quæ frumentacea appellantur. Chondrus  
mensis cōuenit, & viscosum humorē parit, at  
q̄ ablutus viciōsus est, eo q̄ facile crassus eva-  
dit, atq; incoctus p̄manet. Melior ḡo est succus iōi,  
si totus vti p̄fisana p̄be coquat. Alīca in reliq; qđe  
Chondro haud abſimilis est, sed magis aluum suppri-  
mit. Triticū elixū qđem coctu difficile est, & inflat.  
vbi vero cōcoctū est, valētissimā p̄bet alimonīā. At in  
panem redactū, inflandi vim, & coctōis difficultatē de-  
ponit, vt pote fermēto, saleq; p̄ticipans. Siligine<sup>9</sup> pa-  
nis, quē siligniten græci vocant, omni alio magis alit.  
Mox similaceus, sic em̄ semidaliten interptor. deīn cis-  
barius, græci syncomiston dicitur. Sordidus āt. i. furfus  
reus, minus qđem alit, sed magis p̄ vētrem descendit.  
Amylus panis exigūt alinētū p̄bet, quēadmodum et  
lotus. Hordea refrigerādi, abſtergēdīq; vīm obtinēt  
cū ḡo ad modū p̄fisana coquunt, humectat, fricta ḡo  
ut in polētis sit, desiccāt. Poleta p̄ estate āt balneum ex  
aqua potui data, siti medet. Hordeaceus panis imbecil-  
līor est & exigui alimēti. Maza coctu difficilis est, &  
magis hordeaceis panib; inflat, cui si mel quoq; accel-  
serit, aluu mouet. Bromus, calidus est, & exigui alis-  
mēti. Miliū, & panicū, frigida sunt & sicca, atq; pare-  
alunt, & vētrem cohibēt, in toū vero milliū p̄statiū ē

F ij

Præcept.

panico. Oryza coctu difficultis est, parv alit, & ventre astringit. Patisana sic coquit, vni eius pti, aquæ qnde cim, atq; pauli olei adiçce, ac post ebullitiōem acetū q; q;. Cū ḡo exacte iam cocta fuerit, salem tenuem. Sunt qui porq; quocq; atq; anetū addat. Cæteræ Bromus & Chondrus, haud aliter q; patisana pparantur.

De leguminibus.

Cap. LXXIX

X leguminibus, lens qdem mali succi est, & atram bilē parit, ventrē astringit, maxime bis cocta, decoctū ḡo ipius cū oleo & garo potui datū, aluū mouet. At qdā flatū parit vel satureia, vel pu legiū adiçciendū est. Fabæ lenes sunt, & inflat, ac ab sterget, ac ægyptia faba & calidior est nostra & supflu itates plures relinqt. Pisum molle qdē est, atq; non adeo inflat. Cicera inflant, abstergit, genitale semē augent, venerē simulat, calculū terit. Ac fricta flatū qdē amittit, sed difficulter cōcoquunt. Lupina sunt coctu difficultia, haud facile trāsmittunt, & succū crudū pariū. Fœnū græcū an cibū assumptū & calefacit & aluū soluit. Ciceræ faseliq;, si macerent donec radices pueniat, atq; ex garo an cibū sumant, ventrē subducit, atq; magis q; fœnū græcū alunt. Faselitū, q; & siliquæ appellant, si integri cū siliq;, viridesq; inge ranit, plures supfluitates cumulant.

De temporarijs fructibus Ca. LXXX.

V curbita refrigerat, humectatq; atq; aluū mouet, sed pauli alimēti ppet. Pepon, in totū & mali succi est, & frigidus humidusq; ac vomitōem mouet, q; si nō cōcoquat, cholera inducit, eius semen vrinā ciet, calculos renū cōterit, & in totū ve

Pau. Eginē.

hemēter abstergit. Melopepon, omnia q̄ de pepone dicta sunt, imbecilliora obtinet. Cucumis minus q̄ de pepone refrigerat humectatq; sed vehemētius vris nā ciet, & vix cōcoquīt, qd' etsi cōsequīt, malī tñ succi est. Atq; in summa oēs autūnales fruct⁹, refrigerat, & humectat, & sunt exigui alimēti, & mali succi.

Dearbor⁹ fructibus. Ca. LXXXI.

Icus & vuæ inter oēs fructus autūnales p̄cipu-  
f um honorem obtinēt, utpote quoq; succus, &  
minore vicio p̄cipiat, & magis alit. At sic⁹ vuis  
sunt succi multo melioris, atq; magis alit. aluum mos-  
uēt, vrinā crient, renes purgāt, maxime q̄ fuerint admo-  
dū maturæ. Similr & caricæ. flatū tñ & improbū san-  
guinē faciūt. atq; i cīrco, si in crebro vslí fuerint, pedicu-  
los parūt. Vuæ retētæ qdem nō cōcoquunt, & ma-  
lum succū reddūt, p̄ aluū vero deiectæ, moderatiores  
euadūt. Vuæ passæ calidiores sunt, stomachocq; ap-  
tiores, atq; reliq; vuis magis alunr, sed minus aluum  
soluit. Mora vehemēter humectant, mediocriterq;  
refrigerat, atq; in prima mēsa assumpta, ventrē molli-  
unt, haud quaq; stomacho aliena, sed parū alit. Ex-  
cerasis dulciora qdem, aluum citant, at stomacho no-  
xia sunt. Acerba vero ut stomachum magis solantur,  
ita minus molliunt aluum. Atq; eadē ratio tū in vuis  
& moris, tū in alijs multis obseruat. In totum vero,  
astringentia siue edantur, siue bibantur ante aliū cibū,  
aluū cohibent. Quibus vero venter ob imbecillitatem  
nihil deic̄it, ij aliquid quod molliēdi facultatē habeat,  
veluti olera, aut pisces, aut aliud huiuscmodi premit  
tere debent, deinde astringentia sumere, quae aluū ro-  
borantia, deorsum impellant, atq; ad secretionem ex-

F iiiij

Præcep.

citent. Nux pini, boni crassiqs succi est, atqe esui apta, sed nō facile cōcoquitur. Persica mali succi sunt, acē scūtqs, & facile corrumpuntur. ideoqs in primis sunt exhibēda, ut & ptinus deſciantur. necqe ppter morā in vetriculo corrumpantur. Præcoccia & rhodacina, & armenia, prolicis meliora sunt. necqe em acēscūt, necqe ser corrupuntur, ac sunt etiānum delectabiliora. Pomo rum, suauia quodem, reliqs sunt calidiora, & facile transmittuntur, precipue si vel alſentur, vel elixentur. Acida aut ut frigidiora sunt, ita humores in vetriculo magis incidunt. Aut austera, stomacho quodem, robur afferunt & ventrē cohibēt, sed maxime cydonia. Eiusdē potestatis sunt pira maiora atqe matura, sed plus alimēti probent. Mala punica refrigerat, aluntqs parum. Mel spila, sorbaqs, magis astringuntur. ideoqs fluenti aluo idonea sunt. Palmæ, non admodū pingues fuerint, stomacho quodem conueniunt, sed aluum suppressunt. atqe crassos viscososqs humores pariunt, & capitis dolorem inducunt. Ex oлиuis druppæ quodem, stomacho alienæ sunt, & crassi succi. Colymbades vero & quæ in muria seruatæ sunt, in prima mensa assumptæ, appetitiam augent, aluum citant, atqe id magis, si vel aceto, vel oxymelle condiantur. Nux iuglans, auellanis minus alimenti probet, sed stomacho magis conuenit. Nubes recētiores humidæ sunt, atqe aluum mouēt. aridæ & si in aqua maceratae ab interno putamíne mundentur, haud minorē viridibus habent efficaciā. Amygdalæ, incidenti attenuandiqs vim habent, vnde & visceræ & thoracē purgant, maxime vero amaræ. Pistacia haud dissimili sunt potestate, sed in leuanda iecinoris obſtructione, sunt prostantiora. Damascena ante cibū

Pau. Egine.

Sumpta, siue cruda, siue ex mulso cocta, alii solunt.

Syriaca haud facile cōcoquuntur, stomacho aliena sunt, & leuis alimenti. Siliquæ concoctioni renuntur, ventrem astringunt, & sunt mali succi. Sycomora, manifeste refrigerant humectantq;. Citrei mali externa pars acris est, quæ vero veluti carnis spēm prē se fert, licet esui sit idonea, vix tñ cōcōqtur, id yō qd in tus cōtineat, siue acidū, siue aqueū fuerit, vechemēter in frigidat. Glandes frumētaceis haud minus alūt, sed cōcoctū difficiles & crassi succi sunt, atq; tarde trāsmittunt. Castaneæ oī ex pte glādibus sunt meliores.

De aialib⁹, & p̄io de volatilib⁹. Ca. LXXXII.

Mbecillius alimētū p̄bēt aues q̄ q̄drupedes, i p̄sertim q̄ sues, sed cōcoctū facilius. maxime perdux, attagena, colubinus, pullus, gallinæ, phasianæ. At ex turdis, merulis, paruis passeribus, in quo ḡne pyrgitæ quoq; sunt, solidius alimētū est. idq; magis ex turture, palūbo, anate, sed multo duri⁹ & coctū difficilius, atq; fibris fere refertū, qd ex pauone accipit. Anseris yō & strūthochamelī caro, oīb⁹ q̄s diximus, plures reliquit supfluitates, difficilius cōcoqt, dē ptis alis, q̄ succi bonitate cæteris avibus haud inferiores sūt. Grues, fibris plenū durūq; alimētū p̄bent. In totū yō iuniores aues veterib⁹ sunt hūdiōres, coctū faciliōres, alimētū valētioris, atq; p̄ alii facilius deſciuntur. Si p̄ discriminē elixæ ab assis, & in sartagine frictis distinguunt. Itē q̄ in aridis locis, mōtiibusq; degūt, paſlūtris, & facilis cōcoquunt, & supfluitatib⁹ minus redundat.

De ouis. Ca. LXXXIII.

Alliñaræ, phasianarūq; oua, oīm optima sunt. g Anser⁹ yō & strūthocamelor⁹ inutilia. Multo

F. v

Præcept.

aūt p̄stantiora sunt recētia veterib⁹. atq; vt magis alūt  
tremētia, ita sorbilia melius descēdūt, ac gutturis aspi-  
tates leniūt. Reliqua oīa coctū difficilia sunt, & vix trāf-  
mittunt̄ exceptis suffocatis, q̄ qdē cruda ex garo, vi-  
no, & oleo diluta in diplomate modice inspissant̄, sic eī  
& boni succi, & coctū facilis reddunt̄. fricta aūt in sars-  
tagine omniū p̄ssima sunt.

De pedestribus animalibus. Ca. LXXXIIV:

X quadrupedibus, suillē carnes oīm aliorum  
e edulior⁹ valētissimi sunt ḡnīs. q̄ppe q̄ & sapo-  
re & odore familiarē quādā pprietatē ad hūas-  
ta corpora referūt. ut a nōnullis q̄iprudētes, carnes hūa-  
nas degustauerūt, dephēsum ē. alimētū v̄o qd ex iōpis  
cōtrahit̄, & glutinosum ē, & haud facile dissipat̄. Ovis  
la caro sup̄fluitatibus redūdat, maliq; succi ē. Capre  
nutrimētū p̄bēt acre & mali succi, p̄ssimū v̄o hirci. q̄p-  
pe q̄ nō solū mali succi ē, verūtia coctōi resistit. Bu-  
bula caro atrā bīlē parit̄. Lepores crassī succi sunt, sed  
in hoc a bob⁹ & ouib⁹ vincunt̄. Cerui durā coctuq;  
difficilē p̄bēt alimonīā. In summa v̄o recētiora oīa ve-  
terib⁹ hūidiora, molliora, & coctū faciliora sūt. Si r̄ cas-  
trata, ijs q̄bus integri adhuc testiculi sunt. atq; corpus  
lēta gracilibus De ptib⁹ aīaliū Ca. LXXXV

Xtremæ p̄tes neruosē sūt, ac pinguedinis, car-  
nisq; exptes. vñ & glutinosē sūt & alimēti exi-  
gui. atq; alūt mouēt, excipiūt aues, ppter abū-  
dantē ariditatē. Aures, rostraq; cartilaginosa sunt, &  
haud facile cōcoquunt̄. Lingua laxa, exāguis, & ex-  
īgiū alimēti ē. Glādulē suaves sunt, atq; laxē p̄cipue  
māmare, sed maxie suillē, dū videlicet lacte replent̄, ac  
ne minoris qdē alimēti sunt q̄l carnes Renes, testicu-

Pau.Egine.

licq, mali succi sunt, & coctu difficiles. Atq gallorū saginatoꝝ testes, & suaues sunt, & p̄bū alimētū corpori p̄bēt. Cōtra tauroꝝ, hircorū, & arietū, coctu difficiles & mali succi sunt. Cerebrū pituitosū, crassī succi, tardi trāsitus, coctu difficile, stomacho alienū, atq nāuseos sumē, vbi ꝑo p̄be cōcoctū ē, satis alimēti p̄bet, Spinalis medulla pīnguis ē & suauior cērebro, sed in reliqꝝ eisimilis. Cor, iecurq; crassī succi sunt, coctu difficilia, & tardi meatus. atq suillū hepar cæteris melius ē. Lienis malisucci est, & atrā bilem parit. Pulmo ut vtrisq laxior est, ita coctu facilior, sed pituitosus est, et minus alit. Ventriculus, vterus, intestina, dura sunt, vix cōcoquūt, atq pituitā gignūt. In vniuersum ꝑo siluestria aialia, cīcuribus, alimētū p̄bēt aridius, minus q̄ supfluitatibꝫ redūdās. Sanguis oīs difficulter cōcoqtur, p̄cipue si crassus, ac melācholicus ē, velutī busbulus. Leporino ꝑo sanguini utpote suauissimo, p̄cīpuus honor ē. hūc nōnulli cū ipo iecinore coqre consueuerūt, ac aliij cīr reliqꝝ q̄q̄ visceribꝫ. Sunt etiā q̄ iusuenis porcelli sanguinē edūt. Homerus vero, caprinū sanguinē nōnullos comedisse posteritati tradidit.

De lacte.

Cap.LXXXVI.

I Accōctū, alit qđē corpus, sed gingiuis, dentia, busq̄ nocet, quapropter postea q̄q̄ ingestū est, primum mulso, mox vino acerbo, os abluere oportet. Cæterum capiti dolorem affert, præcordia, ventriculum q̄q̄ inflat, atq̄ in renibus calculum generat. Igitur ut id quod dilutum magis est, minus quidē alit, plus vero citat aluum, ita econtrario, crassius, valētius quidem alimentum p̄bēt, sed non facile descendit. Porro caprinū lac mediocris est substantiꝝ,

Præcep.

ouillū crassioris. Præterea ptinus a partu tenuius est,  
tractu vero tpis, crassius, dexteriusq; efficitur.

Quid obseruādū sit lac potātib;. Ca.LXXXVII.

Vī lac potare voluerit, ab alijs cibis abstineret  
q; debet, qusq; cōcoquat, ac p̄ inferiora decedat.

Igit̄ p̄stat ip̄m recēs mulctū in matutino hibe  
re. dein ieūnare, atq; tū vehemētes labores vitare ace  
scit em si qs laborauerit, ac satius q̄q; est leniter deams  
bulare, atq; vīgilē congescere. Sane ita faciēti, primū q  
dem p̄ aluiū subit. ideoq; post deiectōem aliud bīben  
dū est, atq; si hoc quoq; ad secessum subierit aliud. In  
primis em̄ vtil'r purgat, nō ita multū qdem vniuersæ  
molis, sed ea dūtaxat q̄ in ventre cōtinēt, mox venas  
ingredit̄, atq; optime nutrīs haudquaq; deīscit. In bis  
liosis & fluxionibus, atq; vbi vētriculū eliquari timue  
rimus, coctū lac exhibēdū est, atq; sic ip̄m coqre oportet.  
In primis qdem sensim paulatimq;, ut & ps qdam  
absumat, & ps cōcoquat, deinde magis atq; magis co  
qre. Cauendū & ut neq; aduraet, neq; in caseū coagul  
et, idq; optime fiet, si leniter ip̄m coixerimus. Si miscē  
do id qd̄ abscesserit, vndiq; detraxerimus. Igit̄ ferula  
polita tenuiq; miscere oportet, & si quid in labijs aule  
feruet, id spongia purgare. hoc em̄ s̄apenumero relis  
quū lac corrūpit. Ergo coquendū est lac ut diximus,  
donec æquabil'r crassius, & crudo lacte dulcius euas  
dat. Præterea qd̄ in lacte tenuē, serosumq; est, cōsumi  
tur, si calculi marini ex igne candētes in ip̄m demittan  
tur, idq; aluo fluenti, maxime si biliosa fuerint exces  
menta exīmie pdest.

De lacte schisto.

Cap.LXXXVIII.

Pau. Egine.

Erum lactis a caseo discernit, si vehemeter ad  
multum fumi coquat, deinde exacte vel per linteum  
vel per panum coleat. Misceat serosę parti, vel mel  
lis, vel oximellis, vel salis modicū, atque aluum subducet  
dat, adultis quādē, ad sextarios duos, iunioribus yō  
haud min⁹ sextario. Quādē yō marinorū calculorū, aut fer  
ti ex igne cādantis demissione incrassatū est lac, dysen  
teria, & alui pfluvio haud mediocre p̄sidium est.

De caseo.

Cap. LXXXIX.

A seus omnis acris est, sitim excitās, coctū dif  
ficilis, mali succi, calculū gignens. Innocētior  
yō est, q̄ recēs est, laxus, mollis, suavis, & mo  
dico sale cōditus, q̄ yō aliter afficit pessimus est.

De piscibus.

Cap. XC.

Onstat oēs piscis, frigidiori humidiori q̄ tem  
peratura esse. At q̄ saxatiles vocāt, ceteris sunt  
meliores. q̄ppe coctū faciles sunt, boni succi,  
atq̄ modice humectat, nisi dura fuerit eis caro. Nō sa  
xatiliū aut, in pelago degētes, multo discriminē differe  
tūt ab ijs q̄ in limo nutriunt, aut qua flumina irruunt,  
sed oīm pessimi q̄ vel in stagnis, vel paludibus alunt.

At p̄ticulatim Capito qdem si in pelago deguerit,  
modice suavis est, sanguinē yō p̄bet & tenuiore & im  
becilliore. Huic haud absimilis lupus est. Ac in  
equore quoq̄ nullus yō satur, cæteris piscib⁹ & durior  
& fragilior, coctū facilis, mēsis idoneus, p̄dulcis, p̄n  
guedinis expers.

Quibus testa p̄ tegmine est. Ca. XCI.

Iscium genera q̄ testa integunt, oīno salsum,  
p̄ crudūq̄ humorē pariūt. Horū ostrea qdē, mol  
lissima carne sunt, & magis aluum ducūt. Chas

Præcept.

mæxo & Purpuræ & vngues & Spondyli & Buccina  
& Cochleæ, atq; hmoi alia dura, ac quæ crustata quoq;  
nominant, ut Grāmari, Paguri, Cācri, Locustæ, Squils  
lx, mensis qdem cōueniunt, sed coctu difficultia sunt,  
ac si sepe in aqua dulci elixenr, aluū astringit. Ius oīm  
q testis cōcludunt aluum ducit. hāc ob causam terres-  
tres quoq; cochleæ vētrem soluit. At xo duræ carnis  
& coctu difficultis sunt, q licet nutritat, malī tñ succi est,  
quapropter nōnulli ius cū garo & oleo cōdiūt, atq; sic  
vētrem subducit. Echini modice refrigerat, parz alit,  
atq; vrinam crient.

De mollibus.

Cap.XCII.

Olles pisces, vt polypi, sepiae, lolligines, duri-  
m sunt, coctoicq; renitunt, p̄sertim polypi, atq; sal-  
sum quodammō hnt humorē, si xo concocti  
one vincant, haud parz alimēti corpori p̄bent.

De cartilagineis. Ca.XCIII.

X genere cartilagineo, torpedines, pastinaca, e  
molli atq; pdulci carne cōstant, q & celeriter  
subit, & facile concoqtur, alitq;. Raiæ, leuiraiæ,  
squatinæ, & reliqua huiuscemodi genera, duriora, co-  
ctuq; difficultiora sunt, & plus alimēti p̄bent. Atq; in to-  
tū, dure carnis animalia haud facile concoquunt, sed  
& valens & solidū alimentū p̄bent.

De cetaceis.

Cap.XCIV.

Etacea. ut balena, vitulus marinus, libella, del-  
phini, & thunni p̄grandes, duræ & coctu diffi-  
cili sunt carnis, ac crassæ succi. sale aut condita  
moderatione redundunt, atq; alijs piscib; hūdiora. super  
fluitatib; magis abūdāt, & ad perturbādū, pniora sunt.  
Salsamētoz differetia, pisciū ex qbus cōstant sequun-

Pau.Egine.

tur discrimina. De vīni potētia. Cap.XCV.

Vī sanitati studet, quāta sit vīni potētia ignora  
re nō debet. Itaq; in yniuersum om̄e qdē vinū  
nutrit. Idq; magis sī rubidū, crassumq; est, sed  
hoc minus boni fricci ē, dulce & oī quis nutrit, stomacho  
cho tñ alienū est. Acerbū, stomacho qdē gratū, sed nō  
facile trāsmittit, ac minus alit, idq; multo minus si fue  
rit albū. fuluo nullū aliud melius ē. Vetus vinū re  
cēti calidius, siccusq; ē, atq; in summa, vīni potētia hēc  
est. In totū & oī vinū calorē nostrę excitat, vñ & coctio  
melior, & sanguis utilior fit. Cibū, vtpote facile pene  
trās in oēs ptes deducit. ob quā cām attenuatis qq; vi  
morbi, bonū habitū restituit, cibī appetētia erigit, pītui  
tā extenuat, bīlē p vīnas expurgat, colorē emēdat, ani  
mū hilariorē iūcūdūq; reddit, corporis rōbur auget. At  
q; hē sunt vīni modice epotī cōmoditates. Immodice  
& oī ingestū, cōtraria efficit, hinc temulētorē eversiōes,  
demētie, soporesq; pueniūt. qpropter cauēda ē immo  
derata vīni potatio, quis si ex lōgis tpm interuallis li  
beralr bibat, cōmoditate nō careat. qn̄quidem vīnas  
abūde mouet, ac sudores pīfundit. At mox assumptō  
mulso ipm euomere satius est, ut ne paruæ qdem nos  
xæ vestigū reliquat. Igit̄ potatōi opam daturus, alio  
cibo nō admodū se replere debet, atq; inter bibendū  
brassicā elixam edere. & bellaria, pīserit quæ ex amy  
gdalis cōstant, degustare. Hæc em̄ capítis dolorem le  
trant, neq; illā vomētibus molestiā afferūt. Ac mace  
rati q; absinthiā tremor aī potatōem sumptus, haud  
mediocriter auxiliat, vt ne aliud qdem inueniri possit  
ērapulæ magis inimicū. Quod si quēpiā mordeat vi  
num, frigidam aquam bibere debet, postero die absin

Præcept.

thiç tremorem sumere, ambulare, fricari, lauac̄e ingredi, atq; subinde exiguo cibō refici.

De melle & mulso.

Cap. XCVI.

El coctū magis alit q̄ aluū subducat, nō com̄tum, cōtra, ac frigidis humidisq; temperatūs cōuenit. Mulsū, biliosis nō admodū pdesse videt, q̄ppe quod īpis in bilem ytitur. Igit̄ h̄moi naturis oportet īpm magis aquosum exhibere, at qbus viscerā quoqmodo afficiunt, ijs alienum est. Cæterē hoc modo mulsum pparat, octuplū aqua melli adiicit, ac donec spumare desierit cogtur, spumā y o simul atq; orta est, iugiter auferre oportet.

De somno.

Ca. XCVII.

Vperest post oia q̄ de victus rōne diximus, vt de somno quoq; differamus. q̄ppe q̄ oīm vltis mus magna ex pte admittit. Igitur somnus, ut formula quadā loquamur, est animaliū viriū quies, ab vtili humore cerebr̄ madefaciēt, pueniens. Hunc q̄ recte capessit, multa cōsequit̄ cōmoda. Cibos eīm cōfit, humores digerit, dolores sedat, fatigatōes solat, rigidare relaxat, animi ægritudines obliuione delet, mensis insanīa corrigit. Tempus somno accōmodatisſis mū est post cibū, interdiu y o factus, haud oībus idoneus est, id eīm tempus quo dormiūt aliq, haud satis ē ut in eo cibi pfecte cōficiant̄, intercisa eīm aī suam horam concoctōe, p̄ meridiem exurgētes s̄a penumero acidum ructat̄, flatibus implet̄, nō nulli fluctuatōe q̄ q̄ molestan̄, nisi vel ex cōsuetudine, vel q̄a satis dormierūt huiuscemodi casus effugiant. Nocturno aut̄ somno haud alius melior est, si qdem nox suapte næura tum humore, tum trāquillitate somnū alliciēs, co

Pau. Egine.

ctionem pfectam efficit. Præterea post nocturnos somnos magna ex pte ad excremēta deſciēda festinamus Tempis aut̄ somno debiti terminus, ex alimentoꝝ pfecta concoctōne sumit, quā tum ex ructibus, tum ex ventris cōtractōe dephendemus. Post hanc excitatio nō inutilis est, ut pote quæ concoctōis excrementa ad secessum agit.

De vigilia.

Cap. XCVIII,

Igiliarum, quæ iam ægrotates aut ex dolore, aut febri, aut alio quoquis accidēte infestant, cu ratōem, in libro de febribus psequemur. In p sentia yō de his vigilijs dumtaxat dīcendū est, quę sanos interdū male afficiūt. Igī si vel ob mœsticiam, vel sollicitudinē, aut altā animi ægritudinē q̄s vigilauerit. In prīmis mœrorē, quoad fieri potest, fugabimus. de inde sonorꝝ suavitate, cogitatio abigēda est. id qđ nō nulli p lenes aquae sonos efficere molunt. q̄ em sic de mulcent, facile somnū subeunt. Ac balneū quoq; potissimū in vespa, cū bene concoxerit, ingrediant̄. cibū q̄ humectantē assumāt, ut lactucas, aliosq; huiuscemo di. Nigrī quoq; papaueris viridia folia obsonijs interdū adīciant, pisces coctū faciles edāt, vinū tenue, non antiquū, liberaliter bibāt. Cubile petituri rosaceo caput vagant, aut oleo in quo papaueris capita, aut mandragore decocta fuerint. Anethinum etiānum recens, somniferꝝ est. Nouimus nōnullos post fatigatōem subito quiesce, ac subinde dormiuisse. idq; ex modica etiam venere accidere solet. alij in frigidato capite vel peribus somno facile corripiunt. Qđ si ob cibi vel multitudinē vel maliciā, grauato stomacho, aliq; vigilare co

G

Præcept.

gant, nam & hoc accidisse comptū habemus, quemadmodū alij rursus p̄ter consuetudinē aut ieunātes, aut exigū cibū sumētes, dormire nequeūt, pp̄edere oportet, atq̄ causam auferre.

Desopore.

Cap. XCIX.

I vero rursus p̄fundī veterosiq̄ supueniant somni, ab assiduis lauacris, atq̄ refrigerāte vntione abstinentē oportet. Apophlegmatismis vero vti, atq̄ omnino victus rōem calidiorē, aridiorē & exigū alimentū exhibere. qñquidē h̄iuscmodi affectus, a frigidiore, humidiore & materia cerebꝫ irritante, magna ex pte accidit.

Dioclis epistola de bona valitudine tuēda Ca.C.

DIOCLES Antigono regi salutem.

Voniā omniū regū doctissimū &c. in grādeua iam ætate, vniuersæ philosophiæ, mathematis cæq; studio, clarissimū te video, haud alienā a regia maiestate fore putans, eam philosophiæ ptem q̄ salubrīa docet, monere te volui hoc meo cōmentario. lo, vñ hoībus morbi adueniāt, qbus notis dephendantur, atq; qbus p̄sidijs eis occurredū sit. Ut em in cœlo nunq̄ tēpestas orit, quā nō signa q̄dam p̄cedant, quis bus nautæ, cæteriq; haud imperiti homines, tutiores reddant, ita humanā naturam nullus vñq̄ afficit moribus, q non signo aliquo possit p̄ sagiri. Itaq; hæc nostra p̄cepta suscipe & ea p viribus obseruare, ne graueris.

Hominis corpusculū in quatuor ptes diuidimus. Caput, Thoracē, Ventrē, Vesicā. Igit̄ cum caput qd passurum est, hæc solent notæ præcedere. vertigo, cas-

Pau. Egine.

pitis dolor, superciliorum grauitas, aurium tinnitus,  
punctura temporum, oculorum in matutino lachry-  
mæ & caligatio, olfactus hebetatur, atq; dentium gîn-  
giuæ attolluntur. Cum aliquid tale præsenseris, caput  
purgare oportet, non quidem medicamēto, sed vel hy-  
sopi, vel origani capita trita, quæ in aulula fribuerint  
cum musto, aut decocti cyathos tres sumere, inde os  
in ieiuno abluere, atq; gargarizando humores a capite  
deducere. Hac capitîs affectionum curatione, nulla  
alia leuior est. Optimum quoq; præsidium fuerit. Si  
napi ex mulso calido dilutum in ieiuno sorbere, atque  
gargarizare, donec a capite pituita defluat. Sed calefa-  
ciendum prius caput tegumento est, ut eliquata pitui-  
ta, pronior ad effluxionem reddatur. Negligentibus  
vero hæc, quæ iam proposuimus signa, huiuscemodi  
affectiones superuenire solent. Lippitudines glauco-  
mata, aurii rupturæ, strumæ in ceruice, cerebri tabes,  
grauedo, angina noctu, teredones, vua, capillorum de-  
fluxus, vlera capitîs, dentium dolor. Si in thorace  
aliquid futurum est, his notis depræhenditur. Sudor  
vniversum corpus occupat, præcipue thoracem, lingua  
crassior fit. Spuunt vel salsa, vel amara, vel biliosa.  
Latera, scapulasq; dolor sine occasione infestat, vigi-  
liae, suffocaciones, sitis afficiunt. animus ex somno tri-  
stior redditur. pectus, brachiaque, refrigerantur, tres  
munt manus. Hos prudenter hunc in modum curare  
conuenit. Vomitu quoad melius fieri potest vtendū  
est, idq; post cœnam non crapulosam, sed sine medica-  
mēto. Viles vero sunt vomitus ante cibatōem q;s syr-  
maismos vocat. Igit̄ q; sic vomere voluerit, radiculas te-  
nues, nasturcium, erucam, sinapi, portulacā, māducet,

G ij

Præcept.

mox sumpta tepida aqua euomat. Hæc vero signa pat  
ui dependentibus, huiuscemodi solent supuenire mor-  
bi. Pleuritis, peripneumonia, melancholia, febres acu-  
te, phrenitis, lethargus, ardor cū singultu. Vbi aliquid  
vætre leslurz est, his notis pscire licet. In primis vete cō  
voluit, atq; in semetipò turbat, cibi potusq; amari vidē-  
tur, genuu grauitas, lumborum rigor ita ut flecti nō possit,  
totius corporis fatigatio, atq; sine occasiōe crux torpor,  
febriculae nō vehemētes. Cū hæc videris pscia, ven-  
trē remollire oportet, nō medicamētis, sed victu, tuti⁹  
em̄ est vtijs qbus nullus error accedere potest, ut sunt  
Beta ex mulso elixa, allia cocta, malua, Rumex, mer-  
curialis, & q̄cung; melle cōdita sunt. Hæc em̄ oīa aliū  
subducunt. At vbi signorū aliquod magis intēdit, cne  
ci liquamē oībus decoctis miscendū est, q̄ppe q̄ & gra-  
ta & tuta est. Leuis quoq; brassicę ex multa aqua coctę  
succus, quattuor fere hæminarū mensura, potui datus  
cū melle & sale haud inutilis ē. Atq; si q̄s ieūinus aquā  
potauerit, in qua vel cicer, vel eruū fuerit decoctū, idē  
consequēt. Qui vero pdcita signa neglexerit, hos mor-  
bos timent, vētris fluorē, dysenteriā. Intestinorū leuita-  
tē, voluūlū coxendicem, febriē tertianā, podagrā, apo-  
plexiam, hæmoroïdes, articulariū morbi. Vesice af-  
fectōes puident, si exiguo sumpto cibo q̄s impleri vi-  
det, si sīnt flatus, ructus, pallor toti⁹ corporis, somni gra-  
ues, vrināe līuidae difficulter effluentes, pudendorū tu-  
mores. Quibus notis apparētibus, occurrentū est q̄  
tutissime medicamentis odoratis vrinā cīentibus. Itaq;  
feniculi apij; radices in vino albo odorato macerare,  
atq; duos cyathos mane ieūino singulis diebus pp̄i-  
nare congruit, item pastinacæ, vel mirthæ, vel helenij

Pau.Egine.

aquam quotcunq; horæ habueris,nam omnia psumt.  
ciceræ quoq; maceratore aqua, similiter cū vino bibere  
non alienū est. Hæc aut signa negligēter ptereūtes hu  
iuscemodi morbos timeant,aqua inter cutē,lienis ma  
gnitudinē,iecinoris dolorē,calculū,renū affectōes,vri  
næ stillicidū,vétriculī plenitudinē. In omnibus x̄o  
iam ppositis signis,infantes qdem clementiori,adulti  
vero efficaciōri curatōe tractādi sunt. Nec vero an  
ni solsticia,in qbus omnia cōtingere solent,silentio p  
teribimus.sed qbus in quoq; alimentisvtendū sit pau  
cis pstringemus . SOLSTITIVM HYEMALE  
Igit a bruma vscj ad vernū equinoctiū,grauedines de  
stillatōesq; atq; humiditates in hominibus augent,ic  
circo calidiora alimenta īgerere oportet,diligentius  
merciusq; atq; ab origano bibere,ac veneri quoq; in  
dulgere.Numerant vscj ad equinoctiū dies nonagins  
ta. EQVINOCTIVM VERNVM Hoc tempe  
augeſ in hominibꝝ pituita,ac dulcis sanies sanguinis  
ad vergiliarꝝ vscj ortū,quare tum succosissima,acris  
q; adhibenda sunt,exercendū est corpus,ac venus tū  
innocua esse credit. Suntvero ad vergiliarꝝ exortū di  
es sex & quadragita. VERGILIARVM EXOR  
TVS.Hoc tempus auget in hominibus bilem amarā  
atq; sanies amaras ad æstiuū vscj solsticiū,tum dulcia  
quaæ alii dulcant adhibe.& concubitū quoad poteris  
fuge.Numerant ad solsticiū æstiuū dies qnq; & qua  
draginta. SOLSTICIVM ESTIVVM.Hoc tem  
pore crescit in hominibus atra bīlis ad equinoctiū vscj  
autumnale.Igit aqua frigida,atq; odoratis omnibus  
vti,ac concubitū fugere oportet,aut innocentius saltē  
ea quaæ de ipo pscripta sunt admittere,Sunt ad equis

G iiij

Præcept.

noctium autumnale dies tres & nonaginta. EQVI  
NOCTIVM AVTVMNALE. Hoc tempus pitu  
itæ abundantiam facit in hominibus, & tenues fluxio  
nes, donec vergiliæ occidant. Itaq; fluxiones sistere, at  
cq; acerrima, & maxie succosa ingerere, nequaq; vomi  
re, exercitari, atq; venerem fugere conuenit. Sunt ad  
vergiliarū occasum dies sex & quadraginta. VER  
GILIA RVM OCCASVS. Hoc tempore abundat  
in hominibus pituita ad brumam vscq;. quare acerbissi  
ma quæq; tum exhibenda sunt, vinum suave biben  
dum. Pinguibus vti, atq; exercitari congruum est. Nu  
merantur vscq; ad solsticium hyemale dies quinque &  
quadraginta

FINIS.

Argentorat. ex Aedibus Mathiæ  
Schurerij. xij. Maij.

ANN. M. D. XI.

CONRADO DVNTZENHE  
MIO II. DICTATORE  
ARGENTORAT:

REGNANTE IMP. CAES.  
MAXIMILIANO P. F.  
A V G.