

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Methodisch geordnete Aufgabensammlung

Bardey, Ernst

Leipzig, 1879

XXXVIII. Kubische Gleichungen

[urn:nbn:de:bsz:31-269430](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-269430)

49. Wie heißen die Wurzeln der kubischen Gleichung $x^3 - 3ax^2 + 3bx - c = 0$, wenn dieselbe zwei gleiche Wurzeln hat, und welcher Bedingung müssen in diesem Falle die Koeffizienten der Gleichung genügen?

50. Welche Wurzeln hat die kubische Gleichung $x^3 - ax^2 + bx - c = 0$, wenn man weiß, daß eine Wurzel gleich der Summe der beiden andern ist, und welcher Bedingung müssen in diesem Falle die Koeffizienten der Gleichung genügen?

51. Wie heißen die Wurzeln der kubischen Gleichung $x^3 - ax^2 + bx - c = 0$, wenn zwei Wurzeln reziprok sind, und welcher Bedingung müssen in diesem Falle die Koeffizienten der Gleichung genügen?

52. Wie heißen die Wurzeln der Gleichung des 4ten Grades $x^4 + 4ax^3 + 6bx^2 + 4cx + d = 0$, wenn die Summe zweier Wurzeln gleich der Summe der beiden andern ist, und welcher Bedingung müssen in diesem Falle die Koeffizienten der Gleichung genügen?

53. Welchen Bedingungen müssen die Koeffizienten der Gleichung des 4. Grades $x^4 + 4ax^3 + 6bx^2 + 4cx + d = 0$ genügen, wenn zwei Wurzeln die reziproken Werthe der beiden andern sind, und wie heißen in diesem Falle die Wurzeln?

XXXVIII.

Kubische Gleichungen.

Keine kubische Gleichungen, in welchen die Unbekannte nur in der dritten Potenz vorkommt, welche also von der Form $x^3 = a$ sind, kubische Gleichungen mit einer ausgezeichneten Wurzel, insonderheit solche mit einer Wurzel 0, und die symmetrischen kubischen Gleichungen von der Form $ax^3 + bx^2 + bx + a = 0$ sind schon oben im 25. Abschnitt behandelt worden. Die Auflösung dieser Arten von kubischen Gleichungen erforderte keine besonderen Hilfsmittel.

Auch die kubischen Gleichungen mit einer rationalen Wurzel lassen sich nach dem vorigen Abschnitt leicht lösen. Die folgenden Gleichungen haben wenigstens eine rationale Wurzel. Es sollen alle Wurzeln derselben angegeben werden.

$$1) x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$$

$$2) x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$$

$$3) x^3 + 8x^2 + 5x - 50 = 0$$

$$4) x^3 + 2x^2 - 23x + 6 = 0$$

$$5) x^3 - 4x^2 - 15x - 42 = 0$$

$$6) x^3 - 4x^2 + x - 4 = 0$$

$$7) x^3 - 5x^2 + 8x - 6 = 0$$

8) $x^3 - \frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + \frac{5}{8} = 0$

9) $x^3 - 2\frac{3}{4}x^2 + 2\frac{3}{4}x - 1 = 0$

10) $6x^3 - 29x^2 = 45 - 53x$

11) $70 + 71x = 47x^2 - 6x^3$

Gehört eine kubische Gleichung nicht unter die oben angegebenen Arten und hat sie keine rationale Wurzel, so sind andere Betrachtungen zur Auflösung nöthig. Man geht in diesem Falle immer von der reducirten kubischen Gleichung aus. Hat eine gegebene kubische Gleichung die reducirte Form nicht, so muß man derselben erst diese Form geben. Hat das erste Glied einen Coefficienten, so dividirt man die Gleichung durch denselben. Ob die Coefficienten sonst ganze Zahlen oder Brüche sind, ist gleichgültig. Man nimmt an, daß die kubische Gleichung auf die Form

$$x^3 = px + q$$

gebracht ist, wo p und q beliebige reelle Zahlen sind, ganze oder gebrochene, positive oder negative.

A. Cardanische Lösung.

Ist die kubische Gleichung

$$(1) \quad x^3 = px + q$$

gegeben, so ist die Cardanische Lösung

$$(2) \quad x = \sqrt[3]{\frac{q+r}{2}} + \sqrt[3]{\frac{q-r}{2}} \text{ für } r = \sqrt{q^2 - \frac{4}{27}p^3}$$

Um auf diesem Wege alle drei Wurzeln der gegebenen Gleichung zu finden, hat man, wenn die reellen Werthe der Kubitwurzeln

$$(3) \quad \sqrt[3]{\frac{q+r}{2}} = u \quad \sqrt[3]{\frac{q-r}{2}} = v$$

gesetzt werden,

$$(4) \quad x_1 = u + v, \quad x_2 = -\frac{u+v}{2} + \frac{u-v}{2}\sqrt{-3}, \quad x_3 = -\frac{u+v}{2} - \frac{u-v}{2}\sqrt{-3}$$

Ist r^2 , d. h. $q^2 - \frac{4}{27}p^3$ positiv, was immer der Fall ist, wenn p in der Gleichung (1) negativ ist, also in der Gleichung $x^3 + px \pm q = 0$, so hat die Gleichung eine reelle und zwei imaginäre Wurzeln*). — Ist $r^2 = 0$, so erhält man drei reelle Wurzeln, von denen zwei ein-

*) Die Cardanische Lösung hat den Uebelstand, daß sie die rationale Wurzel, wenn die Gleichung eine solche hat, nur selten in rationaler Form liefert. Damit dies geschieht, muß nach den Ermittlungen von E. Liebrecht die kubische Gleichung die Form $x^3 - 3mnx + m^3 + n^3$ haben, wo m und n beliebige rationale Größen sein können. Die Cardanische Formel liefert dann $x = m + n$.

ander gleich sind. Eine der gleichen Wurzeln muß dann dem absoluten Werthe nach halb so groß sein als die ungleiche, aber das entgegengesetzte Zeichen haben. — Ist r^2 negativ, also r selbst imaginär, so erscheinen alle drei Wurzeln nach der Cardanischen Lösung in imaginärer Form, obwohl gerade in diesem Falle alle drei Wurzeln reell sind. Diesen Fall nennt man den irreduciblen Fall, weil man bis jetzt kein Mittel gefunden hat, algebraisch die imaginäre Form auf eine reelle zu reduciren.

Die folgenden Gleichungen haben wenigstens eine rationale Wurzel und sind der Art, daß die Cardanische Lösung diese Wurzel auch in rationaler Form liefert. Es sollen alle drei Wurzeln mit Hilfe der Cardanischen Lösung aufgesucht werden.

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1) $x^3 = 3x + 2$ | 2) $x^3 = 36x + 91$ |
| 3) $x^3 = 9x - 28$ | 4) $x^3 + 9x + 26 = 0$ |
| 5) $x^3 - 18x = 35$ | 6) $x^3 - 72x - 280 = 0$ |

Die folgenden Gleichungen haben eine reelle rationale oder irrationale Wurzel. Die Cardanische Lösung liefert jedoch auch die rationale Wurzel in irrationaler Form. In diesem Falle müssen die Quadrat- und Kubikwurzeln ordentlich berechnet werden, da man sich oft lange vergeblich abmühen kann, die irrationale Form auf eine rationale zu bringen.

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 7) $x^3 = 2x + 3$ | 8) $x^3 = x - 7$ |
| 9) $x^3 + 5x - 4 = 0$ | 10) $x^3 = 4x + 15$ |
| 11) $x^3 + 7x - 8 = 0$ | 12) $x^3 = 26x + 60$ |

Die folgenden Gleichungen haben ebenfalls eine reelle rationale oder irrationale Wurzel, müssen aber erst mehr oder weniger umgeformt werden, um die Cardanische Lösung auf sie anwenden zu können.

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 13) $4x^3 - 5x - 6 = 0$ | 14) $7x^3 + 3x - 100 = 0$ |
| 15) $15x^3 + 13x^2 - 2 = 0$ | 16) $111x^3 = 5x^2 + 4$ |
| 17) $x^3 - 3x^2 + 4x - 4 = 0$ | 18) $5x^3 + 10x^2 + 7x - 2 = 0$ |
| 19) $3x^3 + 13x^2 + 11x - 14 = 0$ | |
| 20) $28x^3 - 126x^2 + 195x - 139 = 0$ | |

B. Die trigonometrische Lösung.

Die trigonometrische Lösung tritt ein im irreduciblen Fall, wenn also $q^2 - \frac{4}{27}p^3$ negativ ist. Ist die kubische Gleichung

$$(1) \quad x^3 = px + q$$

gegeben, so bestimmt man den Winkel φ aus

$$(2) \quad \sin 3\varphi = \frac{3q}{p\sqrt[3]{4p}}$$

was in diesem Falle immer möglich ist, da $q^2 - \frac{4}{27}p^3 < 0$, mithin $\frac{3q}{p\sqrt[3]{4p}} < 1$ ist. Ist φ gefunden, so sind die drei Wurzeln der gegebenen Gleichung

$$(3) \quad \begin{aligned} x_1 &= -\sqrt[3]{\frac{4}{3}p} \cdot \sin \varphi, & x_2 &= -\sqrt[3]{\frac{4}{3}p} \cdot \sin(60 - \varphi), \\ x_3 &= +\sqrt[3]{\frac{4}{3}p} \cdot \sin(60 + \varphi) \end{aligned}$$

Für die Gleichung $x^3 = px - q$ erhalten die drei Wurzeln die entgegengesetzten Zeichen. — Aus der Lösung ist zu ersehen, daß die Gleichung in diesem Falle drei reelle Wurzeln hat. — Der Fall $x^3 = -px \pm q$ gehört nicht hierher, gehört zur Cardanischen Lösung.

Folgende kubische Gleichungen haben drei reelle Wurzeln, theils rationale, theils irrationale. Die Wurzeln sollen nach der trigonometrischen Lösung aufgesucht werden. Ist die Gleichung nicht in der reducirten Form gegeben, so muß sie erst auf diese Form gebracht werden.

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1) $x^3 - 7x - 6 = 0$ | 2) $x^3 = 12x + 14$ |
| 3) $x^3 - 19x + 30 = 0$ | 4) $x^3 = 7x - 5$ |
| 5) $4x^3 - 13x + 6 = 0$ | 6) $30x^3 - 61x^2 + 36 = 0$ |
| 7) $8x^3 + 12x^2 - 4x - 1 = 0$ | 8) $2x^3 - 5x^2 - 13x + 30 = 0$ |
| 9) $27x^3 - 54x^2 + 25x + 1 = 0$ | |

C. Kubische Gleichungen mit verschiedener Lösung.

Um eine kubische Gleichung, deren Auflösung nicht nach dem 25. Abschnitt leicht in die Augen fällt, zu lösen, wird man erst untersuchen, ob sie eine rationale Wurzel hat, wo dann die Auflösung weiter keine Schwierigkeiten macht. Hat sie keine rationale Wurzel, so muß man sie auf die reducirte Form $x^3 = px + q$ bringen, wenn sie diese nicht schon hat. Darnach ist das Zeichen von $q^2 - \frac{4}{27}p^3$ zu bestimmen. Ist es +, so hat man die Cardanische Lösung anzuwenden; ist es —, die trigonometrische.

Um eine rationale Wurzel leichter aufzufinden, ist es meistens zweckmäßig, nach S. 301, 23 erst die Grenzen festzustellen, zwischen welchen die reelle Wurzel liegt. Hat die Gleichung $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ zwischen m und n eine reelle Wurzel, liegt aber zwischen m und n kein Faktor von c, so kann die Wurzel, welche zwischen m und n liegt, nur irrational sein. Durch Einsetzen von $+\infty, 10, 1, 0, -1, -10, -\infty$ für x, erkennt man auch leicht, ob die Gleichung nur eine reelle Wurzel hat, oder drei

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. $x^3 = 37x + 84$ | 2. $x^3 = 45x - 152$ |
| 3. $x^3 + 41x = 1000$ | 4. $x^3 - 61x + 180 = 0$ |
| 5. $x^3 = 30x - 20$ | 6. $x^3 = 90x + 341$ |

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 7. $x^3 = 31x - 19$ | 8. $x^3 = 75x - 250$ |
| 9. $x^3 + 10x - 13 = 0$ | 10. $x^3 = 126x + 559$ |
| 11. $x^3 = 144x + 728$ | 12. $x^3 - 126x + 1241 = 0$ |
| 13. $7x^3 = 9x + 5$ | 14. $9x^3 - 16x + 15 = 0$ |
| 15. $9x^3 - 73x - 60 = 0$ | 16. $17x^3 - 33x^2 + 11 = 0$ |
| 17. $6x^3 + 5x^2 - 2 = 0$ | 18. $10x^3 - 8x^2 + 5 = 0$ |
| 19. $x^3 + 9x^2 + 27x + 26 = 0$ | 20. $x^3 - 2x^2 - 11x + 12 = 0$ |
| 21. $x^3 - 8x^2 + 19x - 20 = 0$ | 22. $x^3 - 9x^2 - 2x + 101 = 0$ |
| 23. $8x^3 - 18x^2 + 17x - 6 = 0$ | |
| 24. $3x^3 + 18x^2 + 67x = 914$ | |
| 25. $10x^3 - 26x^2 + 13x + 10 = 0$ | |
| 26. $9x^3 - 45x^2 + 34x + 37 = 0$ | |
| 27. $2x^3 - 21x^2 + 74x - 85 = 0$ | |
| 28. $18x^3 - 36x^2 + 9x + 8 = 0$ | |
| 29. $12x^3 - 52x^2 + 23x + 42 = 0$ | |
| 30. $20x^3 - 90x^2 + 126x - 53 = 0$ | |
| 31. $4x^3 - 60x^2 + 309x + 500 = 0$ | |

XXXIX.

Gleichungen des vierten Grades.

Die Gleichungen des vierten Grades, welche sich als quadratische Gleichungen lösen lassen, sind schon im 25. Abschnitt in großer Anzahl vorgekommen. Ihre Auflösung hat keine Schwierigkeit.

Gleichungen des vierten Grades, welche eine rationale Wurzel haben, lassen nach Ausscheidung dieser Wurzel, die nach dem 37. Abschnitt leicht aufzufinden ist, noch eine kubische Gleichung übrig. Diese hat man dann weiter nach dem vorigen Abschnitt zu lösen, um auch die drei andern Wurzeln der Gleichung des vierten Grades zu erhalten. — Hat die Gleichung des vierten Grades zwei rationale Wurzeln, so scheidet man diese aus, und es bleibt nur noch eine quadratische Gleichung zu lösen übrig. — In beiden Fällen sind keine besonderen Betrachtungen nöthig; das im 37. und 38. Abschnitt Gesagte genügt vollständig zur Auflösung.

Die folgenden Gleichungen 1.—22. sind von der genannten Art. Sie haben mindestens entweder eine, oder zwei rationale Wurzeln.