

**Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Le Jardin De Hollande planté & garni de Fleurs, De Fruits,  
Et D'Orangeries**

**Du Vivier, Jean**

**Leide, 1714**

Chapitre V

[urn:nbn:de:bsz:31-333070](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-333070)

## CHAPITRE V.

*Des Maladies des Arbres.*

**L**es maladies des Arbres, qui ont été plantez sains, viennent toujours de leurs racines, & elles sont causées par quelque mechante qualité du terroir; c'est pourquoy il faut ou transplanter l'Arbre, ou corriger le défaut du terroir de la maniere que nous l'avons montré ci-dessus. Leurs maladies se manifestent par leurs feuilles qui deviennent jaunes, ou par leurs jets foibles & languissans, & principalement quand leurs cimes se sechent & meurent.

Si un Arbre ne porte point de fruit, comme ayant trop de nourriture, on peut lui en faire porter en le transplantant souvent, ou si l'on vient à diminuer sa force par quelque autre moyen: par exemple, en y faisant un trou & en y fourrant une cheville de chêne suivant l'ancienne coûtume; mais le meilleur est de l'émonder deux ou trois fois en été, par-où le bois vient à perdre beaucoup de sa seve, & par consequent à produire des branches plus menues, qui avec le temps peuvent donner du fruit.

De plus les Arbres, principalement ceux qui nous viennent de France & qui sont en-

tez dans ce pays, sont sujets au chancre & à la gangrene, qui rongent la branche & la font mourir. Le meilleur remede contre ceci, c'est de couper jusqu'au vif, dès qu'on commence à s'appercevoir de cela, ce qui est corrompu & enflammé, soit écorce ou bois, & ensuite de l'oindre avec de la cire ou de l'onguent à enter; auquel temps le mal s'arrêtera, & la branche se remettra.

### CHAPITRE VI.

#### *Des Insectes qui endommagent les Arbres.*

**O**utre ces maladies, des ennemis de dehors viennent encore attaquer les Arbres, tels que sont la mouche noire, le loup, & la chenille de plusieurs fortes; comme la chenille à nids, la chenille à cercles, &c.

Il faut ôter en hiver ou à l'entrée du printemps les nids pleins de petites chenilles, avant qu'elles commencent à en sortir.

On doit chercher avec beaucoup de soin les cercles de ces autres chenilles entortillez tout à l'entour du jeune bois, commençant depuis chaque grosse branche jusqu'aux plus petites, & regardant exactement à chacune autant qu'il est besoin.

Les plus nuisibles pourtant de ces Insectes sont le loup & la calandre, parce qu'ils se