Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Trächtigkeits- und Brüte-Kalender

<u>urn:nbn:de:bsz:31-336895</u>

Trächtigkeits- und Brüte-Kalender.

Die mittlere Trächtigfeitsperiode beträgt bei Pferdestuten 48½ Wochen oder 330 Tage (äußerste Grenze: 330 und 419 Tage); Eselstuten gewöhnlich etwas mehr als bei Pferdestuten; Kühen 40½ Wochen oder 285 Tage (äußerste Grenze: 240 und 321 Tage); Schafen und Ziegen sait 22 Wochen oder 154 Tage (äußerste Grenze: 146 und 158 Tage); Säuen über 17 Wochen oder 120 Tage (äußerste Grenze: 109 und 133 Tage); Hündinnen 9 Wochen oder 63—65 Tage; Kahen 8 Wochen oder 56—60 Tage; Hühner brüten 19—24, in der Regel 21 Tage; Truthühner (Buten) 26—29 Tage; Gänse 28—33 Tage; Enten 28—32 Tage; Tauben 18—19 Tage.

Unfang	Ende der Tragzeit bei				Aufang	Ende der Traggeit bei			
Datum	Pferden 340 Tage	Kühen 285 Tage	Schafen u. Ziegen 154 Tage	Schweinen 120 Tage	Datum	Pferden 340 Tage	Kühen 285 Tage	Schafen u. Ziegen 154 Tage	Schweinen 120 Tage
1. Jan. 6. " 11. " 16. " 21. " 26. " 31. " 5. Febr. 10. " 20. " 22. Mars 7. " 12. " 12. " 22. " 23. " 11. " 16. " 21. " 26. " 11. " 26. " 31. " 26. " 31. " 31. " 31. " 31. " 31. " 32. " 31. "	6. Des. 11. " 16. " 21. " 26. " 31. " 5. Yam. 10. " 15. " 20. " 25. " 14. " 19. " 24. " 11. " 26. " 11. " 21. " 26. " 31. " 21. " 26. " 31	12. Oft. 17. " 22. " 27. " 1. Nov. 6. " 11. " 26. " 21. " 26. " 11. " 26. " 31. " 5. Jan. 10. " 25. " 30. " 4. Febr. 9. " 14. " 15. " 24. " 16. " 25. " 30. " 25. " 30. " 4. Tebr. 9. " 14. " 15. " 26. " 31. " 5. Uprif 16. "	4. Suni 8. " 13. " 18. " 23. " 28. " 3. Suli 18. " 28. " 29. " 20. " 10. " 11. " 11. " 12. " 12. " 12. " 12. " 13. " 14. " 15. " 15. " 16. " 11. " 16. " 11. " 16. " 11. " 16. " 11. " 16. " 11. " 16. " 11. " 16. " 11. " 16. " 11. " 16. " 11. " 16. " 11. " 16. " 11. " 16. " 11. " 16. " 11. " 16. " 11. " 16. " 11. " 16. " 11. " 16. " 17. " 18. " 19.	80. April 5. Mai 10. " 15. " 20. " 25. " 80. " 21. " 22. " 14. " 29. " 14. " 29. " 14. " 29. " 19. " 24. " 29. " 19. " 21. " 21. " 22. " 27. " 21. " 22. " 27. " 21. " 22. " 27. " 21. " 22. " 27. " 21. " 22. " 27. " 21. " 22. " 27. " 21. " 22. " 27. " 21. " 22. " 27. " 21. " 22. " 27. " 21. " 22. " 27. " 22. " 27. " 27. " 27. " 27. "	5. Juli 10. " 15. " 20. " 25. " 30. " 4. Mug. 9. " 14. " 19. " 29. " 8. Sept. 8. " 18. " 28. " 28. " 18. " 28. " 28. " 28. " 28. " 18. " 29. " 20. " 21. " 22. " 27. " 22. " 27. " 21. " 27. " 21. " 21. " 21. " 22. " 27. " 31. "	9. Sumi 14. " 24. " 29. " 4. Suli 9. " 14. " 29. " 14. " 29. " 3. Sung. 3. " 22. " 23. " 22. " 27. " 12. " 17. " 22. " 27. " 1. Nov. 6. " 11. " 26. " 26. " 1. Des. 5. "	15. April 20. " 25. " 30. " 5. Whit 10. " 25. " 30. " 25. " 30. " 25. " 30. " 4. Suni 9. " 14. " 19. " 24. " 29. " 4. Suli 9. " 14. " 19. " 22. " 27. " 17. " 22. " 12. "	5. De3. 10. " 20. " 25. " 30. " 4. Son. 9. " 14. " 19. " 24. " 28. " 18. " 28. " 28. " 28. " 28. " 30. " 26. " 27. " 28. " 29. " 4. Wai 9. " 14. " 29. " 4. Wai 9. " 24. " 29. " 24. " 29. " 24. " 29. " 24. " 29. " 24. " 29. " 24. " 29. " 24. " 29. " 24. " 29. " 24. " 29. " 24. " 29. " 24. " 29. " 24. " 29. " 24. " 29. " 24. " 29. " 24. " 29. " 24. " 29. " 21. Simi	1. Nov. 6. " 11. " 16. " 21. " 26. " 11. " 26. " 11. " 26. " 31. " 5. 3au. 10. " 25. " 30. " 25. " 30. " 4. Gebr. 9. " 14. " 19. " 24. " 19. " 24. " 11. " 26. " 26. " 31. " 27. " 28. " 30. " 29. " 29. "

Brünstigkeit.

	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Biederfehr der Brünftigfeit			
Liergattung	Dauer der Brünftigfeit	bei Nichtbefruchtung	nach bem Werfen		
Pferde	24-36 Stunben 24-36 " 24-36 " 24-36 "	nad) 8—10 Tagen " 21—28 " " 14—21 " " 21—28 "	nach 2 Wochen " 4 " " 26 " " 5-6 "		

Angemeffene Sangzeit bei Aufzucht. Für Fertel 7-8 Bochen, Ziegen 8 Bochen, Kälber 10-12 Bochen, Pferde-Fohlen 15-18 Bochen, Efel 16 Bochen, Lämmer 16-18 Bochen.

Siling

Balla