

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Aerztlicher Jahresbericht. (1. Januar bis 31. Dezember 1900.)

[urn:nbn:de:bsz:31-348542](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-348542)

Ärztlicher Jahresbericht.

(1. Januar bis 31. Dezember 1900.)

Anstaltsärzte:

Medizinalrat W. Baehr, Chefarzt.
Dr. F. Krumm, Chirurg, Oberarzt, Spezialarzt
für Chirurgie.
Dr. Paul Würst, z. B. Assistenzarzt.

A. Die Krankenstation für Erwachsene.

Der Krankenstand am 1. Januar 1900 war: 79 Kranke (53 M. 26 W.); Zugang im Jahr 1900: 1304 (890 M. 414 W.); daher Summe der verpflegten Kranken: 1383 (943 M. 440 W.); Abgang: 1317 (898 M. 419 W.); es verblieben also am 1. Januar 1901: 66 Kranke (45 M. 21 W.).

B. Die Kinderstation.

Verbliebener Stand am 1. Januar 1900: 21 Kinder (14 Kn. 7 M.); Zugang im Jahr 1900: 309 (158 Kn. 151 M.); Summe der verpflegten Kinder: 330 (172 Kn. 158 M.); Abgang: 304 (161 Kn. 143 M.); es verblieben also am 1. Januar 1901: 26 Kinder (11 Kn. 15 M.).

Krankheitsformen.

Es litten an Krankheiten des Gehirns und Rückenmarks: 18 (9 M. 9 W.); der Nerven: 34 (15 M. 19 W.); der Ohren: 37 (20 M. 17 W.); der Augen: 284 (158 M. 126 W.); der Nase: 23 (14 M. 9 W.); der Atmungsorgane: 165 (111 M. 54 W.); der Zirkulationsorgane: 37 (16 M. 21 W.); der Verdauungsorgane 192 (121 M. 71 W.); der Schilddrüse: 18 (6 M. 12 W.); der Geschlechtsorgane: 78 (13 M. 65 W.); der Haut: 134 (105 M. 29 W.); der Bewegungsorgane: 92 (63 M. 29 W.); an Verletzungen: 252 (237 M. 15 W.); Entwicklungs-

krankheiten: 20 (10 M. 10 W.); Infektionskrankheiten und allgemeine Erkrankungen, und zwar: Scharlach 3 (3 W.); Rose: 5 (3 M. 2 W.); Diphtherie: 28 (13 M. 15 W.); Unterleibstypheus: 21 (11 M. 10 W.); Wechselfieber: 1 (1 M.); Katarthfieber: 56 (52 M. 3 W.); akutem Gelenkrheumatismus: 18 (16 M. 2 W.); Blutarmut: 4 (1 M. 3 W.); Leukämie: 2 (2 M.); Pyämie: 4 (3 M. 1 W.); tierische Parasiten: 4 (2 M. 2 W.); Rhachitis und Osteomalacie: 8 (4 M. 4 W.); bösartigen Neubildungen: 52 (17 M. 35 W.); chronischen Dyskrasien, einschließlich Tuberkulose und Strophulose: 140 (80 M. 60 W.); sonstigen Krankheiten: 12 (9 M. 3 W.).

Die Zahl der Todesfälle betrug: 89 (44 M. 45 W.).

Es wurden folgende Operationen ausgeführt:

a. durch den chir. Oberarzt Dr. F. Krumm:

Die Exstirpation von Atheromen und Dermoiden 11, von Angiomen und Cavernomen 7 (1 Plastik), von Naevus 3, von Aneurysma 1, von Papillomen 1, von Fibromen 3, von Hautcarcinomen 6.

Trepanationen bei Schädelfraktur 1, der Stirnhöhlen bei Empyem 2, Exstirpation eines Parotidsarkoms 1, von Rippen- carcinomen 3, Carcinomen der Nase 3, des Ohrs 4, der Wange 1, der Schläfe (mit Plastik) 2, Operation der Hasenscharte 1, von Zahnfisteln 1, von Parulis 8, Zahnextraktionen (Aus- räumung in Markose) 2.

Kropfexstirpationen und -Enucleationen 17 (1 Tracheotom.), Luftröhrenschnitte 18, Tonsillotomie 1, Resektion des Ober- kiefers (part.) 1, Operation von Retropharyngealabscessen 2.

Mehrfache Rippenresektionen wegen Caries 3, wegen Empyem 2, Pneumotomie bei Lungenabscess 1, Mammaamputa- tionen (mit Ausräumung der Achselhöhle) 5.

Probelaaparotomie 1, Gastrostomie (nach Marwedel) 1, Gastroenterostomien wegen Carcinom 2, Resektionen des Wurm- fortsatzes (im Intervall) 3, bei Perityphlitis gangränosa 4, bei akuter eitriger Perityphlitis 4; Laparotomie bei akuter allge- meiner Perforativperitonitis 3, bei Fleus 2 (1 Anus pr. nat.), bei chron. Darmstenose 1; Resektion des Dickdarms 1, des Dünndarms 1 (wegen Anus pr. nat.), Darmnaht wegen Kot- fistel 1; Cholecystostomien 2, Cholecystogastrostomien 1, die Exstirpation der Gallenblase 1; die Operation eines paraneph- ritischen Abscesses 1, eines subphrenischen Abscesses 1; die Sektio alta 2.

Die Resektion des Mastdarms (nach Kraske) 1; combi- niert mit iliacaler Kolostomie (nach Frank) 1; die Operation des Mastdarmprolapses 2, von Mastdarmpfisteln 6.

Die Radikaloperation von freien Leistenbrüchen wurde 3mal ausgeführt (1 Kocher, 2 Bassini), von Schenkelhernien 1mal. Die Herniotomie und Radikaloperation bei eingeklemmten Schenkelhernien 6mal (1 Netzresektion, 1 Anus pr. nat.), bei Leistenhernien 2mal; Herniolaparotomie 2, die Laxis eingeklemmter Hernien 2mal.

Operation der Phimose 3, der Hydrocele 2, die Kastration wegen Tumor 1, wegen Tuberkulose 5, die Excision der Vulva bei Carcinom 1, bei Kraurosis 1.

Amputationen des Oberarms 2, des Vorderarms 2, von Fingern und Fingerphalangen 18, des Oberschenkels 8, des Unterschenkels 3, des Mittelfußes 1.

Exarticulationen von Fingern und Zehen 13.

Resektionen des Ellbogengelenks 7, des Handgelenks 2, des Kniegelenks 6, des Hüftgelenks 6. Arthrotomieen des Kniegelenks 1, des Fußgelenks 1.

Resektionen von Fingern und Mittelhandknochen 6, von Zehen und Mittelfußknochen 4, der Elle, der Speiche 1, des Wadenbeins 3, des Darmbeins 2, des Steißbeins 1, der Synchondrosia sacroiliaca 1, Knochennaht bei Schlottergelenk des Ellbogens 1, blutige Reposition einer veralteten Ellbogenluxation 1.

Exstirpation des Talus 1, Sequestrotomieen 9, Osteotomieen 5, Tenotomieen 3, einfache und mehrfache Sehnennähte 5, Sehnentransplantation 1; Nervennähte 2; Operation der Syndaktylie 1, Exstirpation von Schleimbeuteln 11, Bartholin'schen Cysten 1, Unterbindungen wegen Stichverletzung der Arteria brachialis 1, der Arteria femoralis 1, Unterbindung der Vena Saphena 1; Fremdkörperextraktionen 8; Transplantationen nach Thiersch 11.

Exstirpationen tuberkulöser Lymphome des Halses 28, der Achselhöhle 4, von Leistenbubonen 3. — Auskratzungen bei Caries von Knochen und Gelenken 24, bei tuberkulösen Abscessen 32, bei Aktinomykose 4, bei Gumma 1. — Incisionen von Abscessen 31, von Furunkeln, Panaritien und Phlegmonen 52, von Karbunkel 3; Wundnähte 28; Radikaloperation des eingewachsenen Nagels 5, Gelenkpunktionen und Auswaschungen 1, Jodoformierung tuberkulöser Gelenke und Senkungsabscesse 10, Thermoauterisationen inoperabler Geschwülste und von Lupus 6.

Außerdem wurde ausgeführt das Redressement bei Klumpfuß 4mal, bei Plattfuß 5mal, bei Hüftgelenkscontractur 2mal, bei Kniegelenkscontractur 2mal. Gipsverbände wurden 33 gefertigt, Gipskorsette 2.

Einrichtung und Verband bei Fracturen des Oberarms 6, des Vorderarms 5, der Hand und Finger 10, des Oberschenkels 12, des Unterschenkels 10, des Fußes 5, des

Beckens 1, des Schlüsselbeins 1, der Kniescheibe 1, der Wirbelsäule 1. — Bei Luxationen des Unterkiefers 1, des Ellbogens 2, des Oberarms 1, der Hand 1, des Fußes 1. Die Reposition der angeborenen Hüftverrenkung nach Lorenz 3mal

b. Durch den Frauenarzt Dr. Verberich:

Gebärmutterauschabungen 9, Ausräumungen 1, Kolporrhaphieen 4, Vaginofixationen 1, Ventrofixationen 1, Alexandersche Operation 1, Naht eines Cervixrisses 1, Ovariectomien 2, die vaginale Excirpation eines Ovarialdermoides 1, einer Tubargravidität 1, die Totalexstirpation des Uterus vaginal 6, abdom. 1.

Markosen (meist Chloroform, selten Aether oder gemischt) wurden 480 ausgeführt, die lokale Anästhesierung nach Schleich 43mal, nach Oberst 27mal.

In der **Augenabteilung** (Dr. Gelpke) wurden im Jahre 1900 verpflegt und behandelt: 158 männliche und 126 weibliche Kranke, also zusammen 284 Kranke.

Davon litten an Krankheiten der Augenlider 20, der Tränenorgane 9, der Bindehaut 29, der Hornhaut 106, der Regenbogenhaut 9, der Aderhaut 3, der Netzhaut und des Sehnerven 19, der Linse 24, des Glaskörpers 2, der Augenmuskeln 11, an Neubildungen 1, an Verletzungen des Auges 39, an Refraktions- und Accomodationsanomalien 12.

Größere Operationen wurden ausgeführt: Staarextraktionen 31, Iridectomien 12, Sclerotomien 2, Discissionen 12, Magnetoperationen 3, bei großen Fremdkörperverletzungen 4, Tenotomien 5, Enucleationen (Exenterationen) des Augapfels 6, Lidplastik 6.

In der **Abteilung für Ohren-, Nase- und Halskrankheiten** (Dr. Kohnig) wurden behandelt: Männer 26, Frauen 28, Mädchen 23, Knaben 19.

Von den Männern litten an Ohr 8, Nase 8, Rachen 4, Kehlkopf 6; von den Frauen litten an Ohr 10, Nase 6, Rachen 5, Kehlkopf 7; von den Mädchen litten an Ohr 7, Nase 3, Rachen 6, Kehlkopf 3; von den Knaben litten an Ohr 10, Nase 4, Rachen 7, Kehlkopf 2.

Größere Operationen wurden ausgeführt: Aufmeißlungen des Warzenfortsatzes 12, Entfernung von adenoiden Wucherungen im Nasenrachenraum in 8, von Nasenpolypen in 3, von Wucherungen der Nasenschleimhaut in 6 Fällen. Eröffnung eines retropharyngealen Abscesses; Eröffnung der Oberkieferhöhle wegen Empyem; Entfernung von Cervicaldrüsen je in 1 Fall. Operation der Stirnhöhlenvereiterung (durch die Nase), sowie eines Gehirnabscesses (vom Ohr aus) je in 1 Fall.